




ภาคผนวก

ฐานข้อมูลเห็ดท้องถิ่นในพื้นที่สูง ของประเทศไทย

พ.ศ. 2555-2558


(ปรับปรุง 2558)



เนื้อหาเพิ่มเติมในปี 2558 เพื่อเตรียมจัดทำเป็นหนังสือแสดงความหลากหลายทางชีวภาพของเห็ดในพื้นที่สูง และแนวทางการนำไปใช้ประโยชน์ในอนาคต

ข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพ

- ความหลากหลายของชนิดเห็ด เห็ดกินได้ เห็ดสมุนไพร เห็ดพิษ และเห็ดกลุ่มที่ยังไม่ทราบการใช้ประโยชน์
- ความหลากหลายของสารทางพันธุกรรมเห็ด (genetic diversity)
- ความหลากหลายของสิ่งแวดล้อมที่เป็นแหล่งกำเนิดเห็ด



ภาพที่ 1 ตัวอย่างลำดับเบส (DNA Sequence) ของเห็ด: ITS, LSU, SSU

ผลการสำรวจเห็ดในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง 10 แห่ง

1. ปางมะโอ จ.เชียงใหม่ (>1,000msl/เบญจพรรณ, ดิบเขา)
2. โหล่งขอด จ.เชียงใหม่ (800-1,000msl/เบญจพรรณ, ดิบเขา)
3. ผาแตก จ.เชียงใหม่ (680msl/เบญจพรรณ)
4. ปางแดงโน จ.เชียงใหม่ (500-900msl/เต็งรัง, เบญจพรรณ)
5. ปางยาง จ.น่าน (700-1,000msl/เบญจพรรณ, ดิบเขา)
6. น้ำเค็ม จ.น่าน (264-1,171msl/เบญจพรรณ, ดิบเขา)
7. ห้วยเขย่ง จ.กาญจนบุรี (170msl/เบญจพรรณ)
8. คลองลาน จ.กำแพงเพชร (200-300/เบญจพรรณ)
9. น้ำแหว่ง จ.น่าน (293-1,342 m/เบญจพรรณ, ดิบเขา)
10. แม่สลอง จ.ตาก (200-1600 m/เบญจพรรณ, ดิบเขา)



ภาพที่ 2 ลักษณะป่าที่สำรวจ

เห็ดท้องถิ่นเป็นเห็ดที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ โดยส่วนใหญ่จะพบในป่าที่ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ มีทั้งชนิดที่กินได้และเป็นพิษ นอกจากนี้เห็ดท้องถิ่นยังเป็นต้นกำเนิดของเห็ดเศรษฐกิจอีกหลายชนิด ทั้งยังเป็นแหล่งกำเนิดสารสำคัญใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ทั้งในด้านการแพทย์ (เช่น สารต้านอนุมูลอิสระ และสาร

ด้านไวรัส) และด้านเกษตรกรรม (เช่น สารกำจัดเชื้อรา) นอกจากนี้เห็ดบางชนิดยังถูกนำไปใช้ทำสีย้อมผ้า และไม้อีกด้วย ซึ่งในพื้นที่สูงทางตอนเหนือของประเทศไทยจัดว่ามีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรป่าไม้ และความหลากหลายทางชีวภาพสูง อันเป็นแหล่งอาหารและรายได้ที่สำคัญของคนในชุมชนบนพื้นที่สูง ซึ่งในแต่ละชุมชนมีองค์ความรู้และภูมิปัญญาในการใช้ประโยชน์และการจัดการทรัพยากรที่แตกต่างไปกัน ดังนั้นในการวิจัยนี้จึงมุ่งเน้นที่จะรวบรวมภูมิปัญญาในการจัดการและการใช้ประโยชน์จากเห็ดท้องถิ่น รวมทั้งความหลากหลายของเห็ดในแต่ละชุมชน และศึกษาสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของเห็ดท้องถิ่นชนิดต่างๆ เพื่อใช้เพาะขยายพันธุ์เห็ดสำหรับการบริโภคในครัวเรือน ตลอดจนเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติของเห็ดแต่ละกลุ่ม และวิธีการเก็บเห็ดที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ อันจะสร้างจิตสำนึกหวงแหนในทรัพยากรท้องถิ่นและก่อให้เกิดการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบภูมิปัญญาในการจัดการและใช้ประโยชน์จากเห็ดท้องถิ่นในแต่ละชุมชน (2555-2556)

ภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับเห็ด	พื้นที่ดำเนินการ						
	เชียงใหม่				น่าน		กาญจนบุรี
	ปางมะโอ	โหล่งขอด	ปางแดงใน	ผาแตก	ปางยาง	น้ำเค็ม	ห้วยเขย่ง
1. ไม่กินเห็ดที่ไม่รู้จัก	1	1	1	1	1	1	1
2. ไม่เก็บเห็ดที่ไม่มีแมลงกิน	1	1	1		1	1	
3. หลีกเลี่ยงเห็ดที่มีรอยกัดแทะของเต่าหรือกระด่า	1						
4. ไม่กินเห็ดสีส้มสดฉ่ำ	1		1	1	1	1	1
5. ไม่กินเห็ดป่าสน	1						
6. ดินกลวง-กินได้, ดินตัน-กินไม่ได้	1	1	1	1	1	1	1
7. ใช้มือดู: ต่ำ-เป็นพิษ	1						
8. ใช้ข้าวสาร/ช้อนเงิน/ปูน/หอมแดง: ต่ำ-เป็นพิษ	1	1	1	1	1		1
9. ยึดถือพื้นที่ในการเก็บ (ความเชื่อ)			1				
10. ใช้ไม้หมีดคนข้าวกินแก้พิษ	1						
11. ใส่ขมิ้นลงไปแก้พิษขณะปรุง			1				
12. เห็ดออกมากหรือน้อยดูจากไฟไหม้ป่า			1		1	1	
13. เห็ดจิ้งกัใช้เคาะเข้าแก้วดข้อ	1		1		1	1	1
14. ความเชื่อเห็ดถอบต้องเผาป่า	1	1	1	1	1	1	
15. เห็ดร่างแห ดากแห้งแก้พิษ							1
16. ใช้หัวเตาหลืองตากแห้งฝนละลายน้ำให้ดื่มแก้พิษ							1
รวม	11	5	10	5	8	7	7

กลุ่มเห็ดกินได้

เห็ดกินได้ส่วนใหญ่มีสรรพคุณทางยาด้วย ศึกษาเพื่อการอนุรักษ์และเพาะขยายสายพันธุ์เห็ดท้องถิ่นเพื่อความมั่นคงอาหารและยาในอนาคต ตัวอย่างดังภาพ



เห็ดไข่เหือง



เห็ดไข่ขาว



เห็ดแดง



เห็ดขมิ้น



เห็ดข้าวตอก



เห็ดหูหนูดำ



เห็ดหูควาย



เห็ดหูหนูขาว



เห็ดลม



เห็ดปะการัง



เห็ดเผาะ



เห็ดโคน



เห็ดตับเต่า



เห็ดเป่าฮื้อ




เห็ดหอม



เห็ดผึ้ง



เห็ดขอน



เห็ดน้ำแป้ง

ภาพที่ 3 กลุ่มเห็ดกินได้


- เห็ดไข่เหือง ไข่ขาว เป็นเห็ดที่นิยมบริโภค ควรระวังอย่าเก็บระยะดอกอ่อนมารับประทาน เพราะอาจกลายเป็นเห็ดพิษ ที่อันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้
- เห็ดหูหนูดำและเห็ดหูหนูขาว มีหลากหลายสายพันธุ์ที่มีคุณสมบัติแตกต่างกัน เห็ดหูหนูขาวเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่น่าสนใจนำมาศึกษาเพาะเลี้ยงให้เป็นเห็ดเศรษฐกิจทดแทนการนำเข้า
- เห็ดโคนมีหลายชนิด น่าสนใจในการทำวิจัยเพื่อเพิ่มปริมาณผลผลิตในป่าให้มากขึ้นอย่างยั่งยืน เช่นเดียวกับป่าชุมชนดงมัน จ.ยโสธร ที่ประสบผลสำเร็จ ภายใต้โครงการปลูกป่าในใจคน (โครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่หนองอึ่ง) ซึ่งเริ่มจากการฟื้นฟูป่าในปี พ.ศ.2546 จนกระทั่งปี 2552-ปัจจุบัน มีผลผลิตเห็ดมากกว่า 5 ตัน/ปี ที่สามารถแปรรูปใส่กระป๋องขายภายใต้ชื่อ “วนาทิพย์ OTOP ชุมชนคนรักป่า” มีรายได้กว่า 3 ล้านบาท จากทั้งเห็ดโคน เห็ดไข่ เห็ดแดง เห็ดตับเต่า และเห็ดกินได้อื่นๆ
- เห็ดผึ้งหรือกลุ่มเห็ดตับเต่าหลายชนิดในภาคเหนือไม่เคยรับประทานเพราะไม่รู้จัก หากตรวจสอบอย่างละเอียด พบว่ารับประทานได้และมีสรรพคุณทางยาด้วย

กลุ่มเห็ดสมุนไพร

ตัวอย่างเห็ดหลากหลายชนิดที่ยังไม่ทราบการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ที่น่าสนใจซึ่งจัดเป็นเห็ดกินได้ เห็ดสมุนไพร หรือเห็ดพิษเมื่อเทียบกับเอกสารอ้างอิง และควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเชิงลึก ทั้งในด้านสรรพคุณเฉพาะตัว ตลอดจนวิธีการเพาะขยายพันธุ์เพื่อผลักดันให้กลายเป็นเห็ดเศรษฐกิจต่อไป



เห็ดหลินจือ



เห็ดจวักงู



เห็ดถั่งเช่า




เห็ดขี้ผึ้ง (หลินจือดำ)



เห็ดร่างแห



เห็ดรังนก



เห็ดจาวมะพร้าว



เห็ดแครง



เห็ดหูหนูขาว

ภาพที่ 4 กลุ่มเห็ดสมุนไพร


- เห็ดหลินจือ ช่วยปรับสมดุลในร่างกาย ยับยั้งและรักษามะเร็ง ภูมิแพ้ เป็นยาอายุวัฒนะสำคัญ เป็นที่นิยมมากในปัจจุบัน เห็ดแห้ง กก. ละ 1500-3000 สปอร์เห็ดราคาสูงกว่าหมันบาท
- เห็ดจวักงู ทาขาเด็กที่ไม่แข็งแรงให้แข็งแรงขึ้น (กล้ามเนื้ออ่อนแรง)
- เห็ดรังนก ระงับอาการเกี่ยวกับเยื่อตาขาว ตาแดง ตาบวม
- เห็ดจาวมะพร้าว บำรุงร่างกาย กระจายโลหิต ต้านการอักเสบ ทำลายผิวมะเร็ง ยับยั้งเนื้องอก
- เห็ดแครง ยับยั้งเนื้องอก ปรับสมดุลร่างกายให้สดชื่น
- เห็ดหูหนู บำรุงกำลัง ป้องกันและรักษาโรคผิวหนัง ช่วยปรับสมดุลในร่างกาย ยับยั้งเนื้องอก
- เห็ดขี้ผึ้ง รสชาติดี พบไม่บ่อยนัก ยังไม่ทราบสรรพคุณและคุณค่าทางอาหาร เป็นชนิดที่น่าสนใจศึกษาเพาะเลี้ยงเพื่อพัฒนาเป็นเห็ดเศรษฐกิจต่อไป
- กลุ่มเห็ดหังพบมากมายหลากหลายในพื้นที่ แต่ยังไม่ข้อมูลการนำไปใช้ประโยชน์ เมื่อเทียบกับเอกสารอ้างอิง พบว่าหลายชนิดมีสรรพคุณทางยาชั้นเลิศ และมีอีกมากมายที่ยังรอการศึกษาอยู่
- หูหนูขาว ยาบำรุงแสนอร่อย ช่วยปรับสมดุลในร่างกาย ลดไข้ ยับยั้งเนื้องอก เป็นเห็ดชนิดที่ยังเพาะเลี้ยงยาก ซึ่งต้องศึกษาต่อไป อย่างไรก็ตาม สามารถหาได้ง่ายในพื้นที่สูงทุกแห่ง ซึ่ง

น่าสนใจหากจะเพิ่มปริมาณด้วยวิธีเลียนแบบธรรมชาติ เช่น การตัดกิ่งนางพญาเสือโคร่งมา บ่มไว้ในสภาวะเหมาะสม

- เห็ดตีนแรด (จั่น) ยับยั้งเนื้องอก เสริมการไหลเวียนของร่างกาย ช่วยการกระจายโลหิต ลดไข้ เพาะเลี้ยงง่าย แต่บางคนไม่นิยมรับประทาน

กลุ่มเห็ดพิษ

หลายชนิดมีลักษณะคล้ายเห็ดกินได้ต้องเผยแพร่ให้ประชาชนรู้จักอย่างละเอียด เพื่อลดการเสียชีวิตเนื่องจากเห็ดพิษ และหาแนวทางลดการแพร่กระจาย แต่ก็ยังควรเก็บพันธุ์ไว้ในธรรมชาติเพื่อหาทางใช้ประโยชน์ด้านอื่นๆ ในอนาคต เห็ดพิษหลายชนิดเป็น mycorrhiza ช่วยให้ต้นไม้เจริญเติบโตได้ดี



ภาพที่ 5 ตัวอย่างเห็ดพิษในระยะดอกแก่และดอกอ่อน

- เห็ดพิษหลายชนิดรูปร่างลักษณะคล้ายกลุ่มเห็ดระโงก (ไข่ขาว ไข่เหลือง) มีพิษถึงตาย !! มักเก็บผิดบ่อยๆ โดยเฉพาะระยะดอกอ่อน (ไข่)



ก

ข

ภาพที่ 6 (ก) ตัวอย่างเห็ดพิษในกลุ่ม Amanita และ (ข) เห็ดกลุ่ม Agaric ที่คล้ายคลึงกัน

เห็ดพิษที่พบในพื้นที่มีมากมายหลากหลายชนิด ในอนาคตจำเป็นต้องให้ความรู้ประชาชน เพื่อให้ระมัดระวังในการเก็บพิษมากขึ้น วิธีลดการแพร่ขยายพันธุ์เห็ดพิษ ศึกษาและเผยแพร่ข้อมูลเห็ดพิษในพื้นที่ (โปสเตอร์ หนังสือ สื่อออนไลน์ ฯลฯ)

กลุ่มเห็ดที่ยังไม่มีรายงานการใช้ประโยชน์

เห็ดที่ยังไม่ทราบการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ ต้องนำศึกษาเปรียบเทียบกับข้อมูลอ้างอิงทั้งด้านอนุกรมวิธานและการใช้ประโยชน์ของเห็ดแต่ละชนิด หากเป็นเห็ดกินได้หรือเห็ดสมุนไพร จะต้องเผยแพร่ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบ บางชนิดที่น่าสนใจอาจนำมาทดสอบเพาะเลี้ยงหรือขยายพันธุ์ต่อไป



ภาพที่ 7 กลุ่มเห็ดที่ยังไม่มีรายงานการใช้ประโยชน์



ภาพที่ 8 กลุ่มเห็ดโบลิตัส



ตารางที่ 2 ชนิดเห็ดที่สำรวจพบเพิ่มเติมจากปี พ.ศ. 2555 ในพื้นที่ศึกษาเดิม (1-7) และชนิดเห็ดที่สำรวจพบในพื้นที่ศึกษาใหม่ในปี พ.ศ. 2556 อีก 3 แห่ง (8-10)

ลำดับ	ชนิดเห็ด	เพิ่มเติม ปี 2555	พื้นที่สำรวจ (10 แห่ง)									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Agaric 1	√				1						
2	Agaric 2*	√									1	
3	Agaric 3*	√									1	
4	Agaric sp.4	√					1					
5	Agaric sp.5	√					1					
6	Agaric sp.6	√					1					
7	Agaric sp.7	√							1			
8	Amanita hemibapha*											1
9	Amanita princeps*											1
10	Amanita sp.6 *	√	1									
11	Amanita sp.7 *	√				1						
12	Aphylophorales*	√										1
13	Astreus	√	1								1	
14	Austroboletus	√	1									
15	Bolete 1	√	1									
16	Bolete 2	√	1									
17	Bolete 3	√	1									
18	Bolete 4	√	1									
19	Bolete 5	√				1						
20	Boletellus	√				1						
21	Boletellus sp.1	√					1					
22	Boletus*	√							1			
23	Cantharellus sp.1*										1	
24	Coprinus					1						
25	Hexagonia	√								1		
26	Lactarius sp.1					1					1	
27	Lactarius sp.3*	√									1	
28	Lactarius sp.4*	√									1	
29	Lentinus gigantus*	√							1			
30	Lentinus ?	√	1									
31	Lentinus sp.5*	√										1
32	Lentinus sp.6*	√							1			
33	Lentinus sp.7*	√										1
34	Microporus sp.2									1		1
35	Phlebopus portentosus*		1									
36	Pleurotus ?	√	1									
37	Pulveroboletus	√					1					
38	Russula sp.1										1	1
39	Russula sp.4*										1	
40	Russula sp.5*										1	
41	Russula sp.6*										1	
42	Schizophyllum commune*								1			
43	Suillus sp.2*	√	1									
44	Termitomyces sp.1*					1				1		1
45	Termitomyces sp.3*									1	1	
46	Termitomyces sp.4*	√								1		
จำนวนชนิดเห็ดเพิ่มเติมปี 55			11	0	0	7	5	0	5	5	12	8
จำนวนตัวอย่างที่สำรวจปี 56			41	NS	NS	9	21	NS	5	5	12	8

* คือเห็ดที่ใช้เป็นอาหาร, # คือเห็ดสมุนไพร, @ คือเห็ดพิษ, และ คือเห็ดที่ยังไม่มีรายงานการใช้ประโยชน์

1=ปางมะโอ จ.เชียงใหม่ (>1,000 m/เบญจพรรณ, ดิบเขา)	6=น้ำเค็ม จ.น่าน (264-1,171/เบญจพรรณ, ดิบเขา)
2=โหล่งซอ จ.เชียงใหม่ (800-1,000 m/เบญจพรรณ, ดิบเขา)	7=ห้วยเขย่ง จ.กาญจนบุรี (170/เบญจพรรณ)
3=ผาแดง จ.เชียงใหม่ (680 m/ เบญจพรรณ)	8=คลองลาน จ.กำแพงเพชร (200-300/เบญจพรรณ)
4=ปางแดงใน จ.เชียงใหม่ (500-900/เต็งรัง, เบญจพรรณ)	9=น้ำแหว่ง จ.น่าน (293-1,342 m/เบญจพรรณ, ดิบเขา)
5=ปางยาง จ.น่าน (700-1,000/เบญจพรรณ, ดิบเขา)	10=แม่สลอง จ.ตาก (200-1600 m/เบญจพรรณ, ดิบเขา)

ตารางที่ 3 ความหลากหลายของเห็ดในพื้นที่สำรวจ 7 แห่ง (จังหวัดเชียงใหม่ น่านและกาญจนบุรี) ในปี 2557

ชนิดเห็ด	พื้นที่สำรวจ						
	1	2	3	4	5	6	7
<i>Agaricus</i>			1		1	1	1
<i>Amanita hemibapha</i> *	1						1
<i>Amanita princeps</i> *	1						
<i>Amanita verna</i> ^o	1						
<i>Amanita</i> sp.1 ^o	1	1			1		1
<i>Amanita</i> sp.2 ^o	1	1					1
<i>Amanita</i> sp.3 ^o	1		1				1
<i>Amanita</i> sp.4 ^o	1						1
<i>Amanita</i> sp.5 ^o	1						
<i>Ameuroderma</i> sp.*	1	1					
<i>Astreaus</i> *				1	1		1
<i>Auricularia</i> sp.1*	1	1				1	
<i>Auricularia</i> sp.2*	1		1			1	
<i>Auricularia</i> sp.3*	1						
<i>Boletellus ananus</i>					1		
<i>Boletellus emodensis</i>	1						
<i>Boletus cf aurieusinus</i>		1					
<i>Boletus chrysenteron</i>				1			
<i>Boletus</i> sp.1	1						
<i>Boletus</i> sp.2						1	
<i>Calvatia</i>	1						
<i>Calvinulopsis</i>						1	
<i>Cantharellus</i> sp.1*		1				1	
<i>Cantharellus</i> sp.2*						1	
<i>Chlorophyllum</i>	1						
<i>Clavaria</i>					1		
<i>Clitocybe</i>			1				
<i>Collybia</i>	1	1	1	1	1	1	1
<i>Coprinus</i>	1						
<i>Cariolus</i>	1	1					
<i>Craterellus</i> *		1				1	
<i>Crepidotus</i>						1	
<i>Cyathus</i>	1						1
<i>Dacryopinax</i> sp.1*						1	
<i>Entoloma</i>					1		
<i>Dictyophora</i> *					1		1
<i>Filoboletus</i>	1	1					
<i>Fitulina</i> *		1				1	
<i>Fomes</i>					1		
<i>Ganoderma applanatum</i>					1		
<i>Ganoderma lucidum</i> #						1	
<i>Heimioporus</i>	1						
<i>Hevelia</i> sp. ^o		1					
<i>Heridium</i> *					1		
<i>Hydnum</i>	1				1		
<i>Hygrocybe</i>					1	1	
<i>Laccaria laccata</i> *	1						
<i>Laccaria</i> sp.	1	1					
<i>Leccinum</i>	1						
<i>Lactarius</i> sp.1*	1					1	1
<i>Lactarius</i> sp.2*		1				1	
<i>Lentinus gigantus</i> *			1				
<i>Lentinus</i> sp.1*					1		
<i>Lentinus</i> sp.2*				1			

ชนิดเห็ด	พื้นที่สำรวจ						
	1	2	3	4	5	6	7
<i>Lentinus</i> sp.3*				1			
<i>Lentinus</i> sp.4*				1			
<i>Lenzites</i>	1						
<i>Leucocoprinus</i>	1	1					
<i>Lycoperdon</i>	1						
<i>Marasmius</i>	1	1			1		
<i>Marasmiellus</i>	1				1	1	
<i>Microporus</i> sp.1	1					1	
<i>Microporus</i> sp.2			1		1	1	
<i>Mycena</i>	1	1					
<i>Omphalina</i>					1		
<i>Oudemansia</i>		1	1		1	1	
<i>Phenelus</i>						1	
<i>Phlebopus portentosus</i> *			1				
<i>Pholiota</i>					1		
<i>Phylloporus</i>	1						
<i>Pisolithus</i>					1		
<i>Polyporus</i>			1		1	1	
<i>Psathyrella</i>	1						
<i>Psilocybe</i>						1	
<i>Ptarella</i>			1		1		
<i>Pycnoporus</i>	1			1	1	1	
<i>Ramaria</i> sp.1*	1						
<i>Ramaria</i> sp.2		1	1				
<i>Rhodophyllus</i> @		1					
<i>Rubinoletus</i>	1						
<i>Russula</i> sp.1*	1		1	1	1	1	1
<i>Russula</i> sp.2*	1		1	1	1		1
<i>Russula</i> sp.3*			1			1	1
<i>Russula</i> sp.4*			1			1	1
<i>Russula</i> sp.5*		1		1		1	
<i>Russula</i> sp.6*	1						
<i>Schizophyllum commune</i> #	1				1	1	
<i>Schizophyllum</i> sp.			1				
<i>Scleroderma</i>		1	1		1		
<i>Stereum</i> sp.1	1						
<i>Stereum</i> sp.2			1		1	1	
<i>Strobilomyces</i> sp.1	1				1		
<i>Strobilomyces</i> sp.2	1				1		
<i>Stropharia</i>		1			1		
<i>Stropharia</i>	1						
<i>Telephora</i>		1					
<i>Termitomyces</i> sp.1			1				
<i>Termitomyces</i> sp.2			1				
<i>Termitomyces</i> sp.3						1	
<i>Trametes</i> sp.1						1	
<i>Tremella</i> sp.1	1		1				
<i>Tremella</i> sp.2			1				
<i>Tricholoma</i>						1	
<i>Trogia</i> sp.1						1	
<i>Tylopilus virens</i>	1						
<i>Tylopilus</i> sp.1	1						
<i>Tylopilus</i> sp.2	1						
<i>Volvariella</i>			1				
รวม	51	24	24	10	33	34	14

* คือเห็ดที่รับประทานได้, ^o คือเห็ดสมุนไพร, [#] คือเห็ดพิษ, และ [@] คือเห็ดที่ยังไม่มีรายงานการใช้ประโยชน์

1=ป่ามดแดง จ.เชียงใหม่ (>1,000/เบญจพรรณ, ดิบเขา)

2=โหล่งตาด จ.เชียงใหม่ (800-1,000/เบญจพรรณ, ดิบเขา)

3=ผาแดง จ.เชียงใหม่ (680/เบญจพรรณ)

4=ป่าแดงโน จ.เชียงใหม่ (500-900/เต็งรัง, เบญจพรรณ)

5=ป่ายาง จ.น่าน (700-1,000/เบญจพรรณ, ดิบเขา)

6=น้ำเค็ม จ.น่าน (264-1,171/เบญจพรรณ, ดิบเขา)

7=ห้วยเขย่ง จ.กาญจนบุรี (170/เบญจพรรณ)

ตัวอย่างเห็ดในพื้นที่สูงที่น่าสนใจ มีดังนี้

Agaricales

AGARICACEAE

Clavatia holothurioides Rebreiv จาวมะพร้าว*Cyathus pallidus* Berk. & M.A. Curtis รังนก

AMANITACEAE

Amanita hemibapha (Berk. & Br.) Sacc. *hemibapha* ไข่เหือง*Amanita princeps* Cor. & Bas. ไข่ขาว*Amanita sychnopyramis* Corner & Bas

OMPHALOTACEAE

Lentinula sp. เห็ดหอม (พบครั้งแรกในประเทศไทย)

PLEUROTACEAE

Pleurotus cystidiosus O.K. Mill. เป้าฮื้อ*Pleurotus djamor* (Rumph. ex Fr.) Boedijn นางนวล มั่นออน*Pleurotus giganteus* (Berk.) Karun. & K.D. Hyde ตังผน ชาง บง

TRICHOLOMATACEAE

Macrocybe gigantea (Masse) Pegler & Lodge

Boletales

BOLETACEAE

Pulveroboletus sp.

SCLERODERMATAACEAE

Astreaus sp. เฝาะ ถอบ*Scleroderma verrucosum* (Bull.) Pers.*Scleroderma* sp.

Polyporales

POLYPORACEAE

Lentinus polychrous Lev. เห็ดลม เห็ดกระด้าง เห็ดขอน เห็ดบด

GANODERMATAACEAE

Amauroderma rugosum (Blume & T.Nees) Torrend*Ganoderma subresinosum* (Murrill) Humphrey เห็ดจีนเนื้อ (ก๊อตะยะ)

Gomphales

GOMPHACEAE

Ramaria maculatipes Marr & D.E. Stuntz เห็ดปะการัง

Russulales

RUSSULACEAE

Russula dissimulans Shaffer เห็ดถ่านใหญ่

Agaricales



วงศ์	AGARICACEAE	(Agaricales)
ชื่อวิทยาศาสตร์	<i>Clavatia holothurioides</i> Rebriev	
ชื่อพ้อง	-	
ชื่อไทย	จาวมะพร้าว	
ชื่อท้องถิ่น	จาวมะพร้าว	
หมายเลขตัวอย่าง	HL503-ปางมะโอ	

ลักษณะทาง สัณฐานวิทยา

หมวกเห็ด มีรูปร่างคล้ายจาวมะพร้าว ทรงกลมหรือเกือบกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 7-8 cm ผิวบางคล้ายกระดาษ สีขาวถึงน้ำตาลอ่อนอมชมพู ดอกแก่ผิวปริแตกออก มีฐานคล้ายก้านสีขาวอมชมพู ขนาดยาว 6 cm ความกว้างส่วนปลายประมาณ 1.2 cm และส่วนบน 3.7 cm **สปอร์** รูปร่างทรงรี ผิวมีหนามละเอียด



Clavatia holothurioides HL503

สรรพคุณ/การใช้ประโยชน์ กินได้เมื่อยังอ่อน

อ้างอิง

อนงค์ จันทรศรีกุล พูนพิไล สุวรรณฤทธิ์ และอุทัยวรรณ แสงวณิช. 2551. ความหลากหลายของเห็ดและราขนาดใหญ่ในประเทศไทย. สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 514 หน้า

Rebriev Y.A. (2014). *Clavatia holothurioides* a new species from Vietnam. *Mikol.*


Fitopatol. **47**(1): 21

สภาพนิเวศ พบในป่าดิบเขา เป็นดอกเดี่ยว

ลำดับเบส

Clavatia_holothurioides_HL503 ITS TATGCCTACGTCCGAGTTGATGAGATTCATTAAGT
CGTGTCCACTAATGGACAATCTAGCAGCTGAACAAGTAGAGAGCAGTCATCACAGTGTAGATAA
TTATCACACTAGTGACGGGACTGCAAACGGTTCGCTAATGTATTTTCAGGAGAGCTGACCTGTA
AGGCCCCGAAGCTCCCAGCTCCAAGCCCAATAGCTTACAAAAGCTATAAGGGTTGAGAATTTA

ATGACACTCAAACAGGCATGCTCCTCGGAATACCAAGGAGCGCAAGGTGCGTTCAAAGATTCTGA
 TGATTCACTGAATTCTGCAATTCACATTACTTATCGCATTTTCGCTGCGTTCTTCATCGATGCGAG
 AGCCAAGAGATCCGTTGCTGAAAGTTGTATATGATTGTTATAGGCACAGAGGCCCATTTGATCAC
 ATTCGACAACATACTATGTGGTATATGAATACATAGACTTGAAAGAGAGATCTGCAAGTCACTT
 TGAAGAAAGCTGTATGCTTTTCACTCAGCATTCTCACATCCGGAAGGGCTAATAGCCATCCG
 ATGATTGACTGCTCTCTACCCCCCAAGACTACAAAAGGTGCACAGGTGGATGAATAAAGTCAAG
 ACAAGCGTGCACATGCTCCTAAGAGCCAGCTACAACCCATCAAGAATATTCAATAATGATCCTT
 CCGCAGGTTACCTACGGAAA



แผนภูมิต้นไม้ ความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการของลำดับเบส ส่วน ITS ของ *Clavatia holothurioides* HL503 ทดสอบด้วยวิธี Neighbor-Joining, bootstrap support (1000 ซ้ำ)

ผลการเปรียบเทียบลำดับเบสกับ *Calvatia holothurioides* JQ734547 voucher LE 287408 ITS Length: 856: Score1221 bits(661) Identities 671/676(99%) Gaps 1/676(0%)

Query 22 GAGATTCATTAAGTCGTGTCCCAATAGGACAATCTAGCAGCTGAACAACTAGAGAGCAG 81
 |||||
 Sbjct 701 GAGGTTTCATTAAGTAGTGTCCCAATAGGACAAT-TAGCAGCTGAACAACTAGAGAGCAG 643

Query 82 TCATCACAGTGTAGATAATTATCACACTAGTGACGGGACTGCAAAACGGTTCGCTAATGT 141
 |||||
 Sbjct 642 TCATCACAGTGTAGATAATTATCACACTAGTGACGGGACTGCAAAACGGTTCGCTAATGT 583

Query 142 ATTTACAGGAGAGCTGACCTGTAAGGCCCCGCAAGCTCCAGCTCCAAGCCCCAATAGCTTA 201
 |||||
 Sbjct 582 ATTTACAGGAGAGCTGACCTNTAGGCCCCGCAAGCTCCAGCTCCAAGCCCCAATAGCTTA 523

Query 202 CAAAAGCTATAAGGGTTGAGAATTAAATGACACTCAAACAGGCATGCTCTCGGAATACC 261
 |||||
 Sbjct 522 CAAAAGCTATAAGGGTTGAGAATTAAATGACACTCAAACAGGCATGCTCTCGGAATACC 463

Query 262 AAGGAGCGCAAGGTGCGTTCAAAGATTCGATGATTCACTGAATTCGCAATTCACATTAC 321
 |||||
 Sbjct 462 AAGGAGCGCAAGGTGCGTTCAAAGATTCGATGATTCACTGAATTCGCAATTCACATTAC 403

Query 322 TTATCGCATTTGCTGCGTTCTTCATCGATGCGAGAGCCAAGAGATCCGTTGCTGAAAGT 381
 |||||
 Sbjct 402 TTATCGCATTTGCTGCGTTCTTCATCGATGCGAGAGCCAAGAGATCCGTTGCTGAAAGT 343

Query 382 TGTATATGATTGTTATAGGCACAGAGGCCATTGATCACATTCGACAACATACTATGTGG 441
 |||||
 Sbjct 342 TGTATATGATTGTTATAGGCACAGAGGCCATTGATCACATTCGACAACATACTATGTGG 283

Query 442 TATATGAATACATAGACTTGAAGAGAGATCTGCAAGTCACTTTGAAGAAAGCTGTATGC 501
 |||||
 Sbjct 282 TATATGAATACATAGACTTGAAGAGAGATCTGCAAGTCACTTTGAAGAAAGCTGTATGC 223

Query 502 TTTCACTCAGCATTCTCACATCCGGAAGGCTAATAGCCATCCGATGATTGACTGCT 561
 |||||
 Sbjct 222 TTTCACTCAGCATTCTCACATCCGGAAGGCTAATAGCCATCCGATGATTGACTGCT 163

Query 562 CTCTACCCCCAAGACTACAAAAGGTGCACAGGTGGATGAATAAGTCAAGACAAGCGTG 621

Sbjct 162 CTCTACCCCCAAGACTACAAAAGGTGCACAGGTGGATGAATAAGTCAAGACAAGCGTG 103
 Query 622 CACATGCTCCTAAGAGCCAGCTACAACCCATCAAGAATATTCAATAATGATCCTTCCGCA 681
 Sbjct 102 CACATGCTCCTAAGAGCCAGCTACAACCCATCAAGAATATTCAATAATGATCCTTCCGCA 43
 Query 682 GGTTACCTACGGAAA 697
 Sbjct 42 GGTTACCTACGGAAA 27



วงศ์	AGARICACEAE	(Agaricales)
ชื่อวิทยาศาสตร์	<i>Cyathus pallidus</i> Berk. & M.A. Curtis	
ชื่อพ้อง	-	
ชื่อไทย	รังนก	
ชื่อท้องถิ่น	-	
หมายเลขตัวอย่าง	HL60-ปางมะโอ, HL563-แม่สลอง	

ลักษณะทาง สัณฐานวิทยา

หมวกเห็ด เป็นรูปกรวย ขนาด กว้าง 1-1.5 cm สูง 1.5-2 cm เมื่ออ่อนปกคลุมด้วยเยื่อสีขาวบางๆ ซึ่งปริแตกออกเมื่อแก่ ผิวด้านนอกขนหยาบสีขาวหรือสีครีม ผิวด้านในมีร่องในแนวตั้ง เป็นมันเงา เรียบ สีครีมหรือสีน้ำตาลอ่อน **สปอร์** รูปร่างทรงรี ผิวเรียบ ผนังหนา



Cyathus sp. HL60

Cyathus pallidus HL563

สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ เป็นเห็ดสมุนไพร

อ้างอิง

อนงค์ จันทรศรีกุล, พูนพิไล สุวรรณฤทธิ์ และอุทัยวรรณ แสงวนิช. 2551. ความหลากหลายของเห็ดและราขนาดใหญ่ในประเทศไทย. สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 514 หน้า

อุทัยวรรณ แสงวนิช, พูนพิไล สุวรรณฤทธิ์, อัจฉรา พัยพานนท์, เจนนิเฟอร์ เหลืองสะอาด, อนงค์ จันทรศรีกุล และบารมี สกลรักษ์. 2556. บัญชีรายการทรัพยากรชีวภาพ เห็ด. สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน). กรุงเทพฯ. 374 หน้า


Kirk PM, Cannon PF, Minter DW, Stalpers JA. 2008. *Dictionary of the Fungi* (10th ed.). Wallingford, UK: CAB International. p.24.

สภาพนิเวศ พบในป่าเต็งรัง ป่าเบญจพรรณ และป่าดิบเขา มักขึ้นเป็นกลุ่มบนกิ่งไม้หรือขอนไม้ผุ

ลำดับเบส ดูใน HL563-แม่สลอง

Cyathus_pallidus_HL563 ITS_667b TTGATGCTGGTGTCTACTCGAGACACATGTGCTC
GCCAGCTGATGGGGGTTTCATTTTTATTACTTTTTTCCACCTGTGCACTATTGTAGATGTTGGAG
ATCGTATCTCAAGCGTAAGCTTGGTCTGGAGTTTGC GGCTTCATTAAGTTGAAGTCGGCATTC

TCTGTTGATCTTCACGTCTATTTTTACATATACTCTTAATAAGTTTAGAAGGACTTGATTGGGCT
 TTTAATGCCTATAAATCAATTATACAACCTTTCAGCAACGGATCTCTTGGCTCTCGCATCGATGAA
 GAACGCAGCGAATTGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAA
 CGCACCTTGCCTCTTTGGTATTCCGAAGAGCATGCCTGTTTGAGTGTCAATTAATTCTCAACT
 CATTTCAATTTGTTTATCAAGTGAAATGCATGTTGGATGTGGGGGTTTGCGGGCATTCAATTAAGTT
 GAAGTCGGCTCTCCTGAAATACATTAGCGGGAACCTTATGTTGGACCGCTTCTATTGGGTGTGAT
 AATTATCTACGCCTAGGAAGTGTGAGACAGTAACATACTTTATTGTGTATGGGTTCTGCTTCTAA
 TCGTCCATTCACTTGACAATTACTCTTGACATTTGACCTCAAATCAGGT



แผนภูมิต้นไม้ ความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการของลำดับเบส ส่วน ITS ของ *Cyathus pallidus* HL563 ทดสอบด้วยวิธี Neighbor-Joining, bootstrap support (1000 ซ้ำ)

ผลการเปรียบเทียบลำดับเบสกับ *Cyathus pallidus* DQ463356 voucher SWFC 21160 ITS Length: 667: **Score** 1232 bits(667) **Identities** 667/667(100%) **Gaps** 0/667(0%)

Query 1 TTGATGCTGGTGTCTACTCGAGACACATGTGCTCGCCAGCTGATGGGGTTCAttttt 60

|||||

Sbjct 1 TTGATGCTGGTGTCTACTCGAGACACATGTGCTCGCCAGCTGATGGGGTTCATTTT 60

Query 61 tattactttttCCACCTGTGCACTATTGTAGATGTTGGAGATCGTATCTCAAGCGTAAG 120

|||||

Sbjct 61 TATTACTTTTTCCACCTGTGCACTATTGTAGATGTTGGAGATCGTATCTCAAGCGTAAG 120

Query 121 CTTGGTCTGGAGTTTGCGGGCTTCATTAAGTTGAAGTCGGCATTCTCTGTTGATCTTCAC 180

|||||

Sbjct 121 CTTGGTCTGGAGTTTGCGGGCTTCATTAAGTTGAAGTCGGCATTCTCTGTTGATCTTCAC 180

Query 181 GTCTATTTTTACATATACTCTTAATAAGTTTAGAAGGACTTGATTGGGCTTTAATGCCT 240

|||||

Sbjct 181 GTCTATTTTTACATATACTCTTAATAAGTTTAGAAGGACTTGATTGGGCTTTAATGCCT 240

Query 241 ATAAATCAATTATACAACCTTTCAGCAACGGATCTCTTGGCTCTCGCATCGATGAAGAACG 300

|||||

Sbjct 241 ATAAATCAATTATACAACCTTTCAGCAACGGATCTCTTGGCTCTCGCATCGATGAAGAACG 300

Query 301 CAGCGAATTGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAAC 360

|||||

Sbjct 301 CAGCGAATTGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAAC 360

Query 361 GCACCTTGCCTCTTTGGTATTCCGAAGAGCATGCCTGTTTGAGTGTCAATAATTCTCA 420
 |||||

Sbjct 361 GCACCTTGCCTCTTTGGTATTCCGAAGAGCATGCCTGTTTGAGTGTCAATAATTCTCA 420

Query 421 ACTCATTTCAATTTGTTTATCAAGTGAAATGCATGTTGGATGTGGGGGTTTGCGGGCATTC 480
 |||||

Sbjct 421 ACTCATTTCAATTTGTTTATCAAGTGAAATGCATGTTGGATGTGGGGGTTTGCGGGCATTC 480

Query 481 ATTAAGTTGAAGTCGGCTCTCCTGAAATACATTAGCGGGAACCTTATGTTGGACCGCTTCT 540
 |||||

Sbjct 481 ATTAAGTTGAAGTCGGCTCTCCTGAAATACATTAGCGGGAACCTTATGTTGGACCGCTTCT 540

Query 541 ATTGGGTGTGATAATTATCTACGCCTAGGAAGTGTGAGACAGTAACATACTTTATTGTGT 600
 |||||

Sbjct 541 ATTGGGTGTGATAATTATCTACGCCTAGGAAGTGTGAGACAGTAACATACTTTATTGTGT 600

Query 601 ATGGGTTCTGCTTCTAATCGTCCATTCACTTGGACAATTACTCTTGACATTTGACCTCAA 660
 |||||

Sbjct 601 ATGGGTTCTGCTTCTAATCGTCCATTCACTTGGACAATTACTCTTGACATTTGACCTCAA 660

Query 661 ATCAGGT 667
 |||||

Sbjct 661 ATCAGGT 667



วงศ์	AMANITACEAE	(Agaricales)
ชื่อวิทยาศาสตร์	<i>Amanita hemibapha</i> (Berk. & Br.) Sacc. <i>hemibapha</i>	
ชื่อพ้อง	-	
ชื่อไทย	เห็ดระโงกเหลือง	
ชื่อท้องถิ่น	เห็ดไข่เหลือง	
หมายเลขตัวอย่าง	HL299-ปางมะโอ และ HL385-ป่าเมี่ยง, HL535-แม่สอง และ HL540-แม่สอง	

ลักษณะทาง สัณฐานวิทยา

เห็ดระยะดอกอ่อนมีรูปไข่มีเปลือกหุ้มสีขาว เมื่อเจริญขึ้นหมวกเห็ดจะฉีกผิวเปลือกแล้วบาน ออก มีรูปร่างคล้ายกระจกนูน (convex) ขนาด 5-15 cm ผิวหมวกเห็ดเรียบ เยื่อหุ้มครีบกลายเป็นวงแหวนสีส้ม ขอบหมวกเป็นริ้ว ครีบ มีสีเหลืองส้ม ถัดไม่ติดกับก้าน ก้าน ทรงกระบอกสีเหลือง มีเกล็ดสีส้มเป็นริ้วๆ มีวงแหวนสีส้มห่างจากครีบประมาณ 1-2 cm ขนาด กว้าง 1-2 cm ยาว 7-12 cm ภายในก้านกลวง ส่วนโคนก้านมีถ้วยหุ้มสีขาว สปอร์ รูปร่างเกือบกลม ผิวเรียบ ผนังบาง ขนาด $7.5-8 \times 6-7 \mu\text{m}$ พิมพ์สปอร์สีขาว



Amanita hemibapha HL540, ดอกบาน HL535, bar=1cm



Amanita hemibapha HL299-ปางมะโอ (ซ้าย) และ HL385-ป่าเมี่ยง (ขวา), bar=1cm

สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ เป็นอาหาร ใช้ลวก ต้ม หรือหนึ่ง กินกับน้ำพริก ใช้ปรุงแกง เช่น แกงเห็ด แหนมเห็ด หรืออาจนำมาผัดน้ำมันหอย

อ้างอิง


อนงค์ จันทรศรีกุล พูนพิไล สุวรรณฤทธิ์ และอุทัยวรรณ แสงวณิช. 2551. ความหลากหลายของเห็ดและราขนาดใหญ่ในประเทศไทย. สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 514 หน้า

สภาพนิเวศ พบในป่าเบญจพรรณและป่าดิบเขา เป็นดอกเดี่ยว หรือเป็นกลุ่ม

ลำดับเบส

*Amanita_hemibapha_HL299_ITS*_AGTAGGAGTATGGAAGTTGAAGTAAAAGTAGTAACAA
GGTTGCCGTAGGTGAACATGCGGAAGGATCATTATTGAAAAGAAATCTCTAGCAAGAGGCTGTT
GCTATTCCTGGGCAATAGTTAATGCGCACGCCTTTTGTCTATTTCTTCTCCCTGTGCACCACTTG
TAGACTTGTCTGTCTCAGACCCATAACCTTATGAAATGGATCTTTGTGTTCTAGTAATATATACA
ACTTTCAACAATGGATCTCTTGGCTCTTGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAA
TGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCATCTTGCCTCTTTGGTATTCCG
AAGAGCATGCCTGTTTGAGTGTCTTAATCTCTCTCAATTATTTCTTGAAGTAATTGGACATT
GGGAGTTATTGCTGACAGCTATTGAAGCTCAGCTCTCCTTAAATTCCTTGAAGGACGAAATGTT
GGTGTATGATAATTGTCTATGCCAAACAAGTAGTCTGGTGCGATCATAAAGCAGCCGTCGATGC
ATGTATAAATTACACAGGCC

*Amanita_hemibapha_HL540_ITS*_TTCATATCAATTACTCGGCGGCTGGGTTTTGAGCGCG
TGTGTGTAACAAGGTTACCGTAGGTGAACCTGTGGAAGGATCATTATTTGATTGAAATCTCTAG
CAAGGGGCTGTAGCTGGGCACTAGTCATGTACACGCTCTTTTGTCTATTTCTTCTCCCTGTGCA
CCATTGTAGACTTTTTCATGTCTATGTATCACAAAACCTTATGAATGGGCATCTATTATATATA
AAATAATACAACCTTTCAACAATGGATCTCTTGGCTCTCGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATG
CGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCATCTTGCCTCTT
TGGTATTCGAAGAGCATGCCTGTTTGAGTGTCTTAATCTCTCAAAAACACATTGTTTTTGATT
ATTGGGAGTCATTGCTGGCGGCTGTTGAAGCTCAGCTCTCCTTAAATTCCTTGAAGGACGAAAAT
GTTGCTTAGCGATAATCGGCGGAAGATGGAGGAAAAAGAAGTCACAACACATATCAATAAGCGG
TGAGCAGAGAAAAGCG



แผนภูมิต้นไม้ ความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการของลำดับเบส ส่วน ITS ของ *Amanita hemibapha* HL299 และ HL540 ทดสอบด้วยวิธี Maximum Likelihood, bootstrap support (1000 ซ้ำ)



วงศ์	AMANITACEAE	(Agaricales)
ชื่อวิทยาศาสตร์	<i>Amanita princeps</i> Cor. & Bas.	
ชื่อพ้อง	-	
ชื่อไทย	เห็ดระโงกขาว	
ชื่อท้องถิ่น	เห็ดไข่ขาว	
หมายเลขตัวอย่าง	HL362-ป่าเมี่ยง, HL536-แม่สลอง	

ลักษณะทาง สัณฐานวิทยา

เห็ดระยะดอกอ่อนมีรูปไข่มีเปลือกหุ้มสีขาว เมื่อเจริญขึ้นหมวกเห็ดจะดันผิวเปลือกแล้วบาน ออก มีรูปร่างคล้ายกระเจี๊ยบ (convex) ขนาด 5-15 cm ผิวหมวกเห็ดเรียบ เยื่อหุ้มครีบกลายเป็นวงแหวนสีขาว ขอบหมวกเป็นริ้ว ครีบ มีสีเหลืองส้ม ถี ไม่ติดกับก้าน ก้าน ทรงกระบอกสีขาว มีเกล็ดสีส้มเป็นริ้วๆ มีวงแหวนสีขาวห่างจากครีบประมาณ 1-2.5 cm ขนาด กว้าง 1-2 cm ยาว 10-20 cm ภายในก้านกลวง ส่วนโคนก้านมีถ้วยหุ้มสีขาว สปอร์ รูปร่างเกือบกลม ผิวเรียบ ผนังบาง ขนาด $9-11 \times 8-10 \mu\text{m}$ พิมพ์สปอร์สีขาว



Amanita princeps HL362



Amanita princeps HL536

สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ เป็นอาหาร ใช้ลวก ต้ม หรือนึ่ง กินกับน้ำพริก ใช้ปรุงแกง เช่น แกงเห็ด แหนมเห็ด หรืออาจนำมาผัดน้ำมันหอย

อ้างอิง

อนงค์ จันทรศรีกุล พูนพิไล สุวรรณฤทธิ์ และอุทัยวรรณ แสงวณิช. 2551. ความหลากหลายของเห็ดและราขนาดใหญ่ในประเทศไทย. สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 514 หน้า

สภาพนิเวศ พบในป่าเบญจพรรณและป่าดิบเขา เป็นดอกเดี่ยว หรือเป็นกลุ่ม

ลำดับเบส -

วงศ์	AMANITACEAE	(Agaricales)
ชื่อวิทยาศาสตร์	<i>Amanita sychnopyramis</i> Corner & Bas	
ชื่อพ้อง	-	
ชื่อไทย	-	
ชื่อท้องถิ่น	-	
หมายเลขตัวอย่าง	HL502-ปางมะโอ	

ลักษณะทาง สัณฐานวิทยา

มีรูปร่างคล้ายกระจุกนูน (convex) ถึงแบนเรียบ (plane) บริเวณจุดกลางหมวกเว้าต่ำลงเล็กน้อย เส้นผ่าศูนย์กลาง 8 cm ผิวหมวกเหนียวเล็กน้อย สีน้ำตาลอมเทา โดยมีลักษณะสีเข้มบริเวณตรงกลางและอ่อนลงเรื่อยๆ มีเกล็ดหรือเป็นปุ่มสีเทาอ่อนกระจายทั่วหมวกเห็น ขอบหมวกเป็นริ้ว มีสีขาว นุ่ม ครีบ บาง ไม่ติดกับก้าน สีขาว ก้าน ทรงกระบอกสีขาว มีลักษณะเป็นฐานขนาดเล็ก และเรียวยาว มีเกล็ดสีเทาเป็นริ้วๆ ขนาด กว้าง 0.5-1.1 cm ยาว 4-8 cm สปอร์ รูปร่างกลมหรือเกือบกลม ขนาด 6.3-8.1 μm



Amanita sychnopyramis HL502, bar=1cm

สรรพคุณ/การใช้ประโยชน์ เป็นเห็ดพิษ

อ้างอิง

อนงค์ จันทศรีกุล พูนพิไล สุวรรณฤทธิ์ และอุทัยวรรณ แสงวณิช. 2551. ความหลากหลายของเห็ดและราขนาดใหญ่ในประเทศไทย. สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 514 หน้า

สภาพนิเวศ พบในป่าเบญจพรรณและป่าดิบเขา เป็นดอกเดี่ยว หรือเป็นกลุ่ม

ลำดับเบส

*Amanita sychnopyramis*_HL502_ITS_AAGGTGGAGGGTTGGTGAAGTAAAAAGCGTAAC
AAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTATTGAAAGAAATCTCAGACAAGGGGGAAA

GGTGGTTGTAGCTGGCCCCCTAGGGGCATGTGCACACTGTCTCTTTTTCTCTTGTTTGTCTTCT
 TCATTTTTTCCACTTTGTGCACTGCTTGTAGGCAGCCTGGCAAAGAACACTTGTTTCAGGTTGTCT
 ATGATTTTTCTTTACATACACGAATTGATGTTGTACAGAGTGTAAATGAAAAAAGTTAATACAA
 CTTTCAACAATGGATCTCTTGGCTCTCGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAAT
 GTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCATCTTGCGCTCCTTGGTATTCCG
 AGGAGCATGCCTGTTTGAGTGTCAATAATTCTGTCAAAGCATGCACTTTAGTGTTGTGTGTTTT
 GGATTGTGGGAGTGTCTGCTGGCTTTGAGCCAGCTCTCCTTAAAAACATTAGCTTTGGAGGGAT
 GTGGTGAGTCACTTCTGCTTTTCCATTGGTGTGATAAACAAGCAAGATGTACACCAGGGTGCAA
 GAGTGACAGACCAATGGGTGGAGGATGGAGGAAAAAGACGTAACATCACATATCATCAAGACG
 GACGGATGCATT



วงศ์	AMANITACEAE	(Agaricales)
ชื่อวิทยาศาสตร์	<i>Amanita</i> sp.	
ชื่อพ้อง	-	
ชื่อไทย	-	
ชื่อท้องถิ่น	-	
หมายเลขตัวอย่าง	HL585-แม่สอง	

ลักษณะทาง สัณฐานวิทยา

หมวกเห็ด มีรูปร่างคล้ายกระเจี๊ยบ (convex) ขนาด 5-15 cm ผิวหมวกเห็ดมีเกล็ดสีน้ำตาล ขอบหมวกเป็นริ้ว **ครีบ** มีสีเหลืองส้ม ถัดมาติดกับก้าน **ก้าน** ทรงกระบอกสีขาว ขนาด กว้าง 1-2 cm ยาว 7-12 cm มีเกล็ดสีขาวทั่วทั้งก้าน มีวงแหวนสีขาวห่างจากครีบประมาณ 1-2 cm **สปอร์** รูปร่างเกือบกลม ผิวเรียบ ผนังบาง พิมพ์สปอร์สีขาว



Amanita sp. HL585 แม่สอง Close to *A. pantherina*

สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ เป็นเห็ดพิษ

อ้างอิง -

สภาพนิเวศ พบในป่าเบญจพรรณและป่าดิบเขา เป็นดอกเดี่ยว

ลำดับเบส -

วงศ์	OMPHALOTACEAE	(Agaricales)
ชื่อวิทยาศาสตร์	<i>Lentinula</i> sp.	
ชื่อพ้อง	-	
ชื่อไทย	เห็ดหอม	
ชื่อท้องถิ่น	เห็ดหอม	
หมายเลขตัวอย่าง	HL236-ปางมะโอ (a new record of Thailand)	

ลักษณะทาง สัณฐานวิทยา

หมวกเห็ด ดอกอ่อนมีเยื่อบางๆ ปิดครีบด้านใต้หมวก และเมื่อแก่จะมีรูปร่างคล้ายทรงร่ม (subumbonate) หรือกลางดอกขอบหมวกยกขึ้น (plano-convex) และเยื่อที่ปิดด้านใต้หมวกเห็ด จะหายไป มีขนาด 5-15 cm ผิวหมวกเห็ดมีเกล็ดสีน้ำตาล ขอบหมวกเป็นริ้ว **ครีบ** มีสีขาว เมื่อแก่มีสีน้ำตาลอ่อนบริเวณสันครีบ-ครีบถี่ ไม่ติดกับก้าน **ก้าน** ทรงกระบอกสีขาว มีลักษณะเป็นขนสีน้ำตาลอ่อนจนถึงน้ำตาลเข้มติดอยู่ 5 ใน 6 ส่วนของก้านดอกจากโคน มีขนาด กว้าง 1-2 cm ยาว 7-12 cm มีวงแหวนสีขาวห่างจากครีบประมาณ 1-2 cm **สปอร์** รูปไข่หรือทรงรี ผิวเรียบ ผนังบาง พิมพ์สปอร์ สีขาว



Lentinula sp. HL236-ปางมะโอ

สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ เป็นเห็ดกินได้ รสชาติอร่อย มีสรรพคุณทางยา

อ้างอิง

Pegler, D.N. 1983. The genus *Lentinula* (Tricholomataceae tribe Collybieae). *Sydowia*. 36:227-239

สภาพนิเวศ พบในกิ่งไม้ก่อกำแพงในป่าเบญจพรรณและป่าดิบเขา เป็นดอกเดี่ยว/กลุ่ม

วงศ์	PLEUROTACEAE	(Agaricales)
ชื่อวิทยาศาสตร์	<i>Pleurotus cystidiosus</i> O.K. Mill.	
ชื่อพ้อง (ตัวอย่าง)	<i>Antromycopsis broussonetiae</i> Pat. & Trab. <i>Antromycopsis macrocarpa</i> (Ellis & Everh.) Stalpers, Seifert & Samson <i>Pleurotus abalonus</i> Y.H. Han, K.M. Chen & S. Cheng <i>Pleurotus cystidiosus</i> subsp. <i>abalonus</i> (Y.H. Han, K.M. Chen & S. Cheng) O. Hilber	

ชื่อไทย	เป่าฮื้อ
ชื่อท้องถิ่น	เป่าฮื้อ
หมายเลขตัวอย่าง	HL351-ปางมะโอ, HL191-เพาะ HL351

ลักษณะทางสัณฐานวิทยา

หมวกเห็ด รูปพัด เมื่ออ่อนสีเทาดำ เปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลอ่อนเมื่อดอกบานเต็มที่ เนื้อหนากลางหมวกเว้าตื้น มีขนรวมกันคล้ายเป็นเกล็ดเล็กๆ เนื้อเห็ดดอกสดสีขาว เปราะ แต่มื่อแก่แล้วเหนียวขึ้น ความกว้างดอกเห็ดประมาณ 4-12 cm ครีบ ยาวเรียวยาวลงไปติดกับโคน สีขาวนวล ขอบเรียบ ก้าน ติดอยู่ด้านข้างหมวก ขนาด 2-8×2-3 cm สปอร์ รูปทรงรี ผนังบาง ผิวเรียบ ขนาด 4.5-8×10-13 μm นอกจากนี้เมื่อดอกเห็ดแก่จัดหรือเส้นใยที่เลี้ยงไว้ระยะหนึ่งในอาหาร PDA จะสร้างสปอร์อีกแบบหนึ่ง มีลักษณะคล้ายหยดหมึกสีดำ สปอร์ทรงรี มีหลายขนาดทั้งสิ้น ยาวปานกลาง และยาวปะปนกัน ผนังบาง สีน้ำตาลเข้ม ผิวเรียบ พิมพ์สปอร์สีขาว



Pleurotus cystidiosus HL351

สรรพคุณ/การใช้ประโยชน์ สามารถปรุงอาหารได้ทั้งต้ม ยำ ผัดหรือแกงก็ได้
 อ้างอิง อุทัยวรรณ แสงวณิช, พูนพิไล สุวรรณฤทธิ์, อัจฉรา พยัพพานนท์, เจนนีเฟอร์ เหลืองสอาด,
 อนงค์ จันทรศรีกุล และบารมี สกลรักษ์. 2556. บัญชีรายการทรัพยากรชีวภาพ เห็ด.

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน), กรุงเทพฯ. 374 หน้า

สภาพนิเวศ พบบนต้นตะขบในเชิงป่าดิบเขา เป็นดอกเดี่ยว

ลำดับเบส

Pleurotus_cystidiosus_HL351 ITS AATTCAACTTCCAAGCTCTCTAGCCTATCTCT
 TTTATGACAAACGAAGCGGAATGCAATTAATGTATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATGCA
 ATCTATGACCGCCCCGTGCGCCCCCGGTATTACAAGGGGCATTCTGTTTGAGTGTCATTAAC
 TTCTCAAATCTATAGAGCTTTTGTGATACAGATTTGGATTGTTGGGGGCTGCTGGCTTTTTAC
 CAAGTGGGCTCCTCTTAAATGCCTTAGCGGGACTTTATTGCCTCTTAACGGAGTGTGATTATTC
 TTTACGCTGGCCGTCATCCAACCCCAAACGCGTCCAGCGGTGGATGGATGTATCACAAGTAATA
 CCTCATATCATTAATCGGTGCCGCACGTAGGTGCAACGC



วงศ์	PLEUROTACEAE	(Agaricales)
ชื่อวิทยาศาสตร์	<i>Pleurotus djamor</i> (Rumph. ex Fr.) Boedijn	
ชื่อพ้อง (ตัวอย่าง)	<i>Agaricus djamor</i> Rumph. <i>Agaricus leptogramme</i> Berk. & Broome <i>Agaricus luteoalbus</i> Beeli <i>Lentinus djamor</i> var. <i>roseus</i> (Corner) Z.S. Bi & T.H. Li <i>Pleurotus djamor</i> var. <i>roseus</i> Corner <i>Pleurotus salmoneostramineus</i> Lj.N. Vassiljeva <i>Pocillaria djamor</i> (Rumph. ex Fr.) Kuntze	
ชื่อไทย	นางนวล	
ชื่อท้องถิ่น	มันออน	
หมายเลขตัวอย่าง	HL342-ปางมะโอ, HL529-ป่าเมี่ยง	

ลักษณะทาง สัณฐานวิทยา

หมวกเห็ด ระยะดอกอ่อนสีชมพูอ่อนแล้วเปลี่ยนเป็นสีครีมอมชมพู รูปพัดหรือกรวยตื้น (fan shaped to shallowly funnel shape) เป็นมันวาวเล็กน้อย ขอบเรียบงอเล็กน้อย เส้นผ่าศูนย์กลาง 1-8 cm ครีบ เรียวยาวลงไปติดกับโคน สีขาวอมชมพูถึงครีม แคบและเรียงถี่ ขอบเรียบ ก้าน ไม่มีหรือสั้นมาก สปอร์ รูปทรงรี ผนังบาง เรียบ ขนาด $6-8 \times 3-3.5 \mu\text{m}$ พิมพ์สปอร์สีขาว



Pleurotus djamor HL342-ปางมะโอ



Pleurotus djamor HL529-ป่าเมี่ยง

สรรพคุณ/การใช้ประโยชน์ นิยมนำมาปรุงเป็นแกงพื้นเมือง หรือผัดก๋อรร้อย

อ้างอิง

อนงค์ จันทรศรีกุล พูนพิไล สุวรรณฤทธิ์ และอุทัยวรรณ แสงวณิช. 2551. ความหลากหลายของเห็ดและราขนาดใหญ่ในประเทศไทย. สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 514 หน้า

สภาพนิเวศ พบในป่าดิบเขา เป็นดอกเดี่ยว

ลำดับเบส

Pleurotus_djamor_HL342 ITS GCATGGATAGTAAGTAGACGTCGCCACACACAGTAGGAC
GAGTATGGCAAAGTTTTATATATGGCGCCTGTAGATCACCTGGTGGAGGGATCAATAGTGAAA
GTACAAATCCCTCTGGAAGTATTTAGAGGTTGTCTAGGATACATAATGCACGCGTCTTTAGTTT
CCACATCATACCCCTATGCCCCTTTGATACAATTTGCTCTGGGTTATCTTTAGGGGTTTTCTTA
AAAGGAAGGCCCTTGGTTTCCCTCACACGACTTCTCTATTCTACCCACACCCCAAATGTATGT
TTTATTAATGAAGGGTTTATAATCACAAGGCCATGAGCCTTATAAACTTAATACAACTTTCAACA
ACGGATCTCTTGGCTCTCGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAATGTGAATTGC
AGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACCTTGCGCCCTTTGGTATTCCGAAGGGCATG
CTTGTTTGAGTGTCAATAATTCTCAAACCTTCTATGACTTTATTGTTGTAGCTGTTTGATTGCT
GGGGGTTGCTGGCGTCTTCTTTGAAGTCGGCTCCTCTTAAATGCATTAGCGGGACTTTGTTGCC
TCTGCGCATAGTGTGATAATTATCTACGCTAGACGCATGCAATTCTTATATTGTCCAGCTTTCTA
ATCGTCTCAAGGGACGAATTACTTGACAATATGACCTCAATTGCAGCTGGGGTCACCCACCC

Pleurotus_djamor_HL529 ITS ACAGGGATACTCCGCTTATTGATACGCCTTGTTACGTCTT
TTGCCTCCATCCTCCGCCTGGTGTGCGCTGAATTTCTTGCGTCTAGCGTAAATAATTATCACA
CTATGCGCAGAGGCAACAAAGTCCCGCTAATGCATTTAAGAGGAGCCGACTTCAAAGAAGATGC
CAGCAACCCCCAGCAATCCAAACAGCTACAACAATAAAGTCATAGAAGTTTGAGAATTTAATGA
CACTCAAACAGGCATGCCCTTCGGAATACCAAAGGGCGCAAGGTGCGTTCAAAGATTTCGATGAT
TCACTGAATTCTGCAATTCACATTACTTATCGCATTTTCGCTGCGTTCTTCATCGATGCGAGAGCC
AAGAGATCCGTTGTTGAAAGTTGTATTAAGTTTATAAGGCTCATGGCCTTGTTATTATAAACCAT
TCATTAATAAAACATACATTTGGTGTGTGGTATAGTATAGAAGTCGTGTTAAGGAAACCAAAGG
CCTTTCCAATTAACCAACCAAGGATGACCCAAACCTAATTTTATCAAAGTGCATCAGGG
TATTGAAGTGAACTAATGGAATCGGGAATATGGTCCCTAGCAACCATTATAAACTTTCTAAA
GATTTTGAAATTTCTTGATGTGCCTCCGAAGGTACGCGCCGACACCCTGGTACGCTCCTCTTG
TTATTGACTCTTCACGCGAGTAATGATAAGTCGTAGCACGGCGTATCACTACAAGAAGGAGCGA
GGAATA


วงศ์	PLEUROTACEAE	(Agaricales)
ชื่อวิทยาศาสตร์	<i>Pleurotus giganteus</i> (Berk.) Karun. & K.D. Hyde	
ชื่อพ้อง	<i>Lentinus giganteus</i> Berk. <i>Pocillaria gigantea</i> (Berk.) Kuntze, Revis. <i>Velolentinus giganteus</i> (Berk.) Overeem, <i>Panus giganteus</i> (Berk.) Corner, Beih	
ชื่อไทย	ตั่งฝน	
ชื่อท้องถิ่น	ซาง บง	
หมายเลขตัวอย่าง	HL5-บ้านเอืยก, HL350-ปางมะโอ (พะเยา)	

ลักษณะทาง สัณฐานวิทยา

หมวกเห็ด ระยะดอกอ่อนสีน้ำตาลอมเทา รูปไข่ถึงครึ่งวงกลม มีเกล็ดชัดเจนทั้งบนหมวกและก้าน เมื่อเติบโตขึ้นมีรูปทรงแบบกรวยตื้น (deeply shallow) ถึงกรวยลึก (funnel shape) บริเวณกลางหมวกมีเกล็ดเล็กน้อย ขอบงอลงแล้วเหยียดตรง เมื่อแก่มีก้านหักขาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 1-41 cm ครีบ เรียวลงไปติดกับก้าน สีขาวถึงครีม แคบและเรียวถี่เล็กน้อย ก้าน ทรงกระบอกสีขาว มีลักษณะเป็นฐานขนาดเล็ก และเรียวเล็กน้อย มีเกล็ดสีเทาเป็นริ้วๆ ขนาด กว้าง 0.5-3 cm ยาว 4-15 cm สปอร์ รูปทรงรี ผนังบาง ขนาด 6-9×4.5 µm พิมพ์สปอร์สีขาว



Pleurotus giganteus HL350



clamp connection

สปอร์ (spores)

สรรพคุณ/การใช้ประโยชน์ เป็นเห็ดที่มีรสชาติดี นิยมนำมาปรุงเป็นแกงพื้นเมืองใส่ผักตามฤดูกาล เช่น ยอดฟักทอง หรืออาจทำเป็นอาหารจานผัดก็อร่อย

อ้างอิง

วินัย กลิ่นหอม และ อุษา กลิ่นหอม. 2548. เห็ดเป็นยาแห่งป่าอีสาน. มุลนิธิสุขภาพไทย, กรุงเทพฯ. 156 หน้า.

อนงค์ จันทศรีกุล พูนพิไล สุวรรณฤทธิ์ และอุทัยวรรณ แสงวณิช. 2551. ความหลากหลายของเห็ดและราขนาดใหญ่ในประเทศไทย. สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 514 หน้า

Karunarathna, S.C.; Yang, Z.L.; Raspé, O.; Ko Ko, T.W.; Vellinga, E.C.; Zhao, R.L.; Bahkali, A.H.; Chukeatirote, E.; Degreaf J.; Callac P.; Hyde, K.D. 2011. *Lentinus giganteus* revisited following new collections in Thailand and Sri Lanka. 118:57-71.

สภาพนิเวศ พบในป่าดิบเขา เป็นดอกเดี่ยว

ลำดับเบส

*Pleurotus giganteus*_HL350_ITS_AAAAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGA
AGGATCATTAAATGAATTCACCTTTGAAGTTGTTGCTGGCCTCTAGGGGCATTTGTGCACGCTTC
ATTAGTCTTTCAAACCACCTGTGAACCTTTGATAGATTCTCTCTTCAAGTTTGGCGCTAAGTCC
GAATAGGGGTTTTGCCCTGTCGGCGGCTGACTTGGACGATTCTATATCTTACATACCCCTAAA
CGAATGTCTACGAATGTTATTGATTGGGCCATGTGCCTATAAATCTTAATACAACCTTTCAACAAC
GGATCTCTTGGCTCTCGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAATGTGAATTGCAG
AATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACCTTGCGCCCTTTGGTATTCCGAAGGGCATGCC
TGTTTGAGTGTCAATTAATTCTCAAACCTACAAAGTTTGGCCTTTGTTAGCGTTTGGATCGTTGG
GGGCTGCTGGCTTGTAACCGAGTCGGCTCCTCTTAAATGCATTAGCAGGACTTTGTTGCCTCTG
CATATGGTGTGATAATTATCTACGCCAAACGCATGCAATGATCATGAGTTCCAGCTCTCTAATC
GTCCTGTCAAAGGACAATTACTTGACCATTTGACCTCAAATCAGGTAGAACTACCCGCTGAAC
TAAGCATATCATTAG

*Pleurotus giganteus*_HL350_LSU_AACTTAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAACTAA
CAAGGATTCCCCTAGTAACTGCGAGTGAAGCGGGAAAAGCTCAAATTTAAATCTGGTGGTCTT
TGCCATCCGAGTTGTAATCTAGAGAAGTGTTATCCGCGCTGGACCGTGTACAAGTCCCCTGGA
ATGGGGCGTCATAGAGGGTGAGAATCCCGTCTTTGACACGGACTACCAGGGCTTTGTGATGCAC

TCTCAACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAATGGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTA
 AATATTGGCGAGAGACCGATAGCGAACAAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGAACTTTGGAAA
 GAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAACGCTTGAAGTCAGTCGCGTCAGCCAAG
 GATCAACCTTGCTTCTGTGAGGTGTACTTCTTGTTGATGGGTCAGCATCAGTTTTGGCTGCTG
 GACAAAGGTCAGAGAAATGTGGCACCTCCGGGTGTGTTATAGTCTCTGATCATATACAGTGGCT
 GGGACTGAGGAACTCAGCACGCCGAAAGGCCGGGTTTACCCACGTTCGTGCTTAGGATGCTG
 GCAAAATGGCTTTAATCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGCATGCGAGTG
 TTTGGGTGGAAAACCCGAGCGCGTAATGAAAGTGAAAGTTGGGATCTCTGTCATGGAGAGCACC
 GACGCCCATACCAGAAAGTTTACGGACGGATATGCGGTTGAGCATGTATGTTGGGACCCGAAAGA
 TGGTGAACATATGCCTGAATAGGGCGAAGCCAGAGGAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCT
 GACGTGCAAATCGATCGTCGAATTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGC
 TGGTTCCTGCCGAAGTTCCCCCTCAGGAAAA



วงศ์	TRICHOLOMATACEAE	(Agaricales)
ชื่อวิทยาศาสตร์	<i>Macrocybe gigantea</i> (Masse) Pegler & Lodge	
ชื่อพ้อง	<i>Tricholoma giganteum</i> Masse	
ชื่อไทย	ตีนแรด ตับเต่าขาว	
ชื่อท้องถิ่น	จั่น	
หมายเลขตัวอย่าง	HL293-ปางมะโอ (เพาะพันธุ์ มช.), HL395-ป่าเมี่ยง	

ลักษณะทาง สัณฐานวิทยา

หมวกเห็ด โค้งนูนคล้ายกระทะคว่ำ (conicoconvex) เมื่อเติบโตขึ้นมีลักษณะเป็นแบบกางแบน (expanding) ผิวเรียบ สีขาวนวลแล้วกลายเป็นสีครีมอมเหลืองหม่น เป็นมันวาว ขอบงอลง มักเป็นคลื่นเมื่อแก่หรือแห้ง เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.5-30 cm เส้นใยปรากฏ clamp connection ก้านทรงกระบอก (cylindrical) ส่วนใหญ่ยาวเรียว (elongate) ขนาด กว้าง 2-6 cm ยาว 4-13 cm สปอร์ รูปไข่ (ovoid) หรือทรงรี (short ellipsoid) สี ผิวเรียบ ผนังบาง ขนาด 5.7-7.5×4.0-5.3 μm พิมพ์สปอร์สีครีม



Macrocybe gigantea HL395 (ภาพ 1-2) HL293 (ภาพสุดท้าย)

สรรพคุณ/การใช้ประโยชน์ กินได้ นิยมนำมาแกงใส่ยอดมะขาม สรรพคุณทางยา เสริมการไหลเวียนของเหลวในร่างกาย ช่วยการกระจายโลหิต ลดไข้ และมีฤทธิ์ยับยั้งเนื้องอก

อ้างอิง

วินัย กลิ่นหอม และ อุษา กลิ่นหอม. 2548. เห็ดเป็นยาแห่งป่าอีสาน. มูลนิธิสุขภาพไทย กรุงเทพฯ. 156 หน้า.

อนงค์ จันทรศรีกุล พูนพิไล สุวรรณฤทธิ์ และอุทัยวรรณ แสงวณิช. 2551. ความหลากหลายของเห็ดและราขนาดใหญ่ในประเทศไทย. สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 514 หน้า

Pegler D.N., Lodge D.J and Nakasone K.K. 1998. The pantropical genus *Macrocybe* gen.nov. *Mycologia* 90 (1-6): 494-504.

สภาพนิเวศ พบเป็นกลุ่มในป่าเบญจพรรณ ป่าไผ่

ลำดับเบส

*Macrocybe gigantea*_HL293_ITS_GGTTGGGTTTCTACCTGAATTGAGGTCATATGATCAAA
GACAGTTAATTGTCCTGTTAGAAAGCTGAACCACACAATATCGTGCTAAGCCACGGCGTAGATA
ACTATCACACCAGGGGCTAAATCAACGATGGGTCCCACTAATGTATTTAGAAGAGCTGACTCT
TTGAACACAAAAAGCCAGCAACTCCCACCTCCCAACACTTTGAAACCAAAAAGTAACCAAAGGT

GAAAATTTTCATGACACTCAAACAGGGATGGTCCTCGGAATAACCAGGAGCGCAAGGGGCGGTCA
 AAGAATCCATGGATCACTGGATTCTGCAATTCACATTA ACTATCGCATTTCGCTGCGGTCCTCAT
 CGATGCGAGAAGCAAGAGATCCGGTGGTGAAAGGTGTAATATGATTTAAAAGCATCAAAGAAAT
 GCCTTAGAAAACATTCTTATACATAGAGTAAATGATATGAAAAGACTTAGACTTTGGAGAATAAA
 GGCCAAGATCACTCTCGACTCAGAACTCTACCCAAAGTCTACAACAAGTGCGCAAGTGGTGTAT
 AAAACAATAGTCAAGCGTGGACATGTGTCTATAGGGCTCGCAACA ACTTGACCAAGGTGATTCA
 CCAAAGAGCCCCCCCCAGGTTACCTACGGAAACCCGGGGACAACATATAACCCACAGGGGGG
 AAAAAAC





วงศ์	BOLETACEAE	(Boletales)
ชื่อวิทยาศาสตร์	<i>Pulveroboletus</i> sp.	
ชื่อพ้อง	-	
ชื่อไทย	-	
ชื่อท้องถิ่น	-	
หมายเลขตัวอย่าง	HL531-แม่สอง	

ลักษณะทาง สัณฐานวิทยา

หมวกเห็ด มีรูปร่างนูนแล้วแบน (convex then plane) ขนาด 3-8 cm ผิวหมวกเห็ดเรียบ สีสน้ำตาลปนแดง รู มีสีน้ำตาลปนเหลือง เมื่อชำเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินอมเขียว ขนาดปาก菇 1-3 รูต่อ mm ก้าน ทรงกระบอกสีน้ำตาลอ่อน ขนาด กว้าง 1.8-2 cm ยาว 4-7 cm สปอร์ รูปร่างทรงรียาว ผิวเรียบ ผนังบาง



Pulveroboletus sp. Close to retipes HL531, bar=1cm

สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ -

อ้างอิง -

อนงค์ จันทรศรีกุล พูนพิไล สุวรรณฤทธิ์ และอุทัยวรรณ แสงวนิช. 2551. ความหลากหลายของเห็ด และราขนาดใหญ่ในประเทศไทย. สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 514 หน้า

Yang W, Liu J, Zhang H. (2010). "Total synthesis of pulverolide: revision of its structure". *Tetrahedron Letters* 51 (37): 4874–76.

สภาพนิเวศ พบในป่าดิบเบญจพรรณ และป่าดิบเขา อยู่เป็นกลุ่มเป็นส่วนใหญ่

ลำดับเบส

*Pulveroboletus*_sp._close_to_retipes_HL531_ITS_GACCTCCCTGGGAGGTGACCCATCC
CTAGACACAAAGGGGGGTAGTTTAAATTAATTAAGAAATAATACACAACGGTTGAAGAAAAAT
ACCCCTTTCCACAAGGCCCTAATCCCGGTTATGCCCTATCCTCTTTTTTAATTGAATTCCCCCAA
ACCCCTTTGGGCCCATTTGTTTGTTCGAAAAAGGGGACTTTTTTTTTTTTCACATCACACCT

TATCGTATGTCCATAGAATGTATGGGAAAATGATATACAACTTTCAGCAACGGATCTCTTGGCT
 CTCGCATCGATGAAGAACGCAGCGAATTGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGATTTTCAGTGAAT
 CATCGAATCTTTGAACGCATCTTGCGCTCCTTGGTATTCCGAGGAGCATGCCTGTTTGAGTGTC
 ATCGAATTCTCAACCATGTGTCTTGATTGATCTCAAGGCGGCCATGGCTTGGAGTTGGGGGTTG
 CTGGCGGCGGTCTGGCTGTTGGGTGTCTTGAAATGTATTAGCAAAAAGGGGGGCGTGGATGTAT
 TGTGGCGTTCATGGCCTTGGAGGTGATAATGATCGTCGTGGCAACCATAGGCGGCGGGTGTCTC
 TCCTCTCCCCCCTTCGTGCTTCTAATCTGTAAGGACTAGGCAAGCTGAGGCTGGCTTACCTCG
 TATCAGTAATCAGAGCAGCCTGAGAAACGGCC



วงศ์	SCLERODERMATACEAE	(Boletales)
ชื่อวิทยาศาสตร์	<i>Astreus</i> sp.	
ชื่อพ้อง	-	
ชื่อไทย	เผาะ	
ชื่อท้องถิ่น	ถอบ	
หมายเลขตัวอย่าง	HL230, HL488-ปางมะโอ	

ลักษณะทาง สัณฐานวิทยา

ดอกเห็ด มีรูปทรงเกือบกลมหรือกลมแบน มีผนังสองชั้น ผนังชั้นนอกสีน้ำตาลเข้ม ระยะเหมาะสมจะแตกออกคล้ายแฉกดาว 3-9 แฉก ผนังชั้นใน กลมแบน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 2-5 cm สปอร์ รูปกลม ผิวเป็นปุ่มหนาม



Astreus sp. HL488

สรรพคุณ/การใช้ประโยชน์ นิยมนำมาต้ม หรือแกงใส่ยอดมะขาม หรือยอดมะเมี

อ้างอิง

อนงค์ จันทรศรีกุล พูนพิไล สุวรรณฤทธิ์ และอุทัยวรรณ แสงวณิช. 2551. ความหลากหลายของเห็ดและราขนาดใหญ่ในประเทศไทย. สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 514 หน้า
 อุทัยวรรณ แสงวณิช, พูนพิไล สุวรรณฤทธิ์, อัจฉรา พยัพพานนท์, เจนนีเฟอร์ เหลืองสอาด, อนงค์ จันทรศรีกุล และบาร์มี สกลรักษ์. 2556. บัญชีรายการทรัพยากรชีวภาพ เห็ด. สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน), กรุงเทพฯ. 374 หน้า

สภาพนิเวศ มักพบในป่าเต็งรัง เป็นดอกเดี่ยวหรือเป็นกลุ่ม

ลำดับเบส -

*Astreus*_sp._HL488_ITS_AAACCATTCCATAATTCCACAAGCCGTTTCCGACTGAGCGGAGG
 TAGATGGTGTGTCAGATTTTAGGCCACTCTAAGCATGCAAGCCTCTCTCAAACCCTACGTCTCGGA
 AGTGTCTGTACCGTAATCCAAACACCTGTGTGCACCCGTTGTAGGTCCTAGGACCTATGTTAT
 TCCTTTGTAAACCCTTGATGTATACAGAACGTTGTCCACAGAAATAAATAAATATGATAACTT
 TCAGCAACGGATCTCTTGCTCTCGCATCGATGAAGAACGCAGCGAATCGCGATAAGTAATGTG
 AATTGCAGATTTTCCGTGAATCATTGAATCTTTGAACGCACCTTGCCTCCTCGGTATTCCAAG

GAGCATGCCTGTTTGAGTGTGATTGAAATCTCAAAACCCTAGCTTCGCTCTGTCGGAGTCCGGT
 TTTGGACTTTGGGAGTGTGTCGGCGACCCTCTGCTTCGGGATGTCGGCTCTCCTCAAATGCATT
 AGCGGTGGGCTTGAGTCTTTGCATGGCACGGCCTGTTGACGTCGTAGTGATCGTCGCGGGCTG
 GAAGTGCTCGGCTCGGGATCGACTTGTCTCATGCTTCCAACCTCGGGGGGTCGGGTCGGGTCG
 GGTGGTGGAAGTTGGACGGGGTAGGAGCCCCCTCATATCATTAAATCGGTGCTGCATGAAGACA
 TGCC



วงศ์	SCLERODERMATACEAE	(Boletales)
ชื่อวิทยาศาสตร์	<i>Scleroderma verrucosum</i> (Bull.) Pers.	
ชื่อพ้อง	<i>Lycoperdon verrucosum</i> Bull.	
ชื่อไทย	-	
ชื่อท้องถิ่น	-	
หมายเลขตัวอย่าง	HL538-แม่สอง	

ลักษณะทาง สัณฐานวิทยา

หมวกเห็ด มีรูปร่างคล้ายลูกแพร์กลับด้าน ทรงกลมหรือเกือบกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1-5 cm เมื่อยังอ่อนผิวค่อนข้างเรียบ สีน้ำตาลแดง ดอกแกมีลักษณะผิวคล้ายผิวสัตว์เลื้อยคลาน มีรูเปิดสำหรับปล่อยสปอร์อยู่ตรงกลางด้านบนของดอกเห็ด มีฐานคล้ายก้าน สีเดียวกับหมวกเห็ด ขนาด **สปอร์** รูปร่างกลมหรือเกือบกลม ผิวเป็นหนาม แต่ไม่ขรุขระ หนามยาวประมาณ 2 μ m



Scleroderma verrucosum HL538

สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ -

อ้างอิง

อนงค์ จันทรศรีกุล พูนพิไล สุวรรณฤทธิ์ และอุทัยวรรณ แสงวณิช. 2551. ความหลากหลายของเห็ดและราขนาดใหญ่ในประเทศไทย. สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 514 หน้า

สภาพนิเวศ พบในป่าดิบเขา เป็นดอกเดี่ยว หรือเป็นกลุ่ม ดำรงชีวิตแบบมายคอร์ไรซาหรือแซบโพรบ

ลำดับเบส

Scleroderma_verrucosum_HL538 ITS_GGCAATTTCTCATGCTGCTCTGATTGCTGATATGTG
TGCGGCGTGCCGTTCTACAACCGGCGTCGCAAGTCTAGGGAAGCACGGGTCCATAGAGCGA
CGCACTTCCAGCCACGACGATCATTACGACGTGGAAGAGGCCGTGCCATGCGAGGCCCTTGCC
CACGGCTAATGCTTTTGAGGAGAGCGGACGTGGTTCGCCCGCAGACTCCCATAGTCCGAACCG
GGCTCCGACTAGGTCGATGCTCGGTTTCGAGGTTTCGATGACACTCAAACAGGCATGCTCCTCG
GAATACCGAGGAGCGCAAGGTGCGTTCAAAGATTTCGATGATTCACGGAAAATCTGCAATTCACA
TTACTTATCGCGATTGCTGCGTTCTTCATCGATGCGAGAGCCAAGAGATCCATCGCTGAAAGT
TGTATTGTAGGTTTTGCGGTCGCCGACGCGGGACCCTGAGGGTCGAGGCCGAGACACGACGAA
TACATTCTGTAGACATACGAGTTCGAAAGGAGACGTAGGGCCCCGAAAGACCTACGGCGAGTGC


ACAAGTGTGTTAAGAAGGTTGAAGCCCGGAAGGGTCGAAAGGGGCGACGAGCGAGGACGTGCA
CGCGCGCGAGGCCGGCGACAGTCCGACGCTCCCTCTCCCTTCCCCTCCTAGACGTTTCGATTTTCG
ATGATGATCCATCCGCAAGGTCACCTAGCGAAAGCCTGGTCCGACTTTTAGTTGCACCACTCCG
CCGCTTATTGTCATGACAAGGCATATCAATCAGCGCCAGACGGCCGGAAGTAGGTGG



วงศ์	SCLERODERMATACEAE	(Boletales)
ชื่อวิทยาศาสตร์	<i>Scleroderma</i> sp.	
ชื่อพ้อง	-	
ชื่อไทย	-	
ชื่อท้องถิ่น	-	
หมายเลขตัวอย่าง	HL466-ปางมะโอ	

ลักษณะทาง สัณฐานวิทยา

หมวกเห็ด มีรูปทรงกลมหรือเกือบกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 2-3 cm สีน้ำตาลแดง ดอกแฉะมีลักษณะผิวคล้ายผิวสัตว์เลื้อยคลาน มีฐานคล้ายก้านสีเดียวกับหมวกเห็ด สปอร์ รูปร่างกลมหรือเกือบกลม ผิวเป็นหนาม แต่ไม่ขรุขระ



Scleroderma sp. HL466

สรรพคุณ/การใช้ประโยชน์ -

อ้างอิง

อนงค์ จันทศรีกุล พูนพิไล สุวรรณฤทธิ์ และอุทัยวรรณ แสงวณิช. 2551. ความหลากหลายของเห็ดและราขนาดใหญ่ในประเทศไทย. สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 514 หน้า

สภาพนิเวศ พบในป่าดิบเขา เป็นดอกเดี่ยว

ลำดับเบส -

Polyporales



วงศ์	GANODERMATACEAE	(Polyporales)
ชื่อวิทยาศาสตร์	<i>Ganoderma subresinosum</i> (Murrill) Humphrey	
ชื่อพ้อง	<i>Amauroderma subresinosum</i> (Murrill) Corner, <i>Fomes subresinosus</i> Murrill, <i>Magoderna subresinosum</i> (Murrill) Steyaert <i>Polyporus mamelliporus</i> Beeli <i>Trachyderma subresinosum</i> (Murrill) Imazeki,	
ชื่อไทย	ชันเนื้อ	
ชื่อท้องถิ่น	กือตะยะ	
หมายเลขตัวอย่าง	HL548-แม่ฮ่อง	

ลักษณะทาง สัณฐานวิทยา

หมวกเห็ด มีรูปร่างเป็นแผ่นคล้ายหนัง ขนาด 5-15 cm ขอบหมวกที่ยังอ่อนอยู่เป็นสีขาว กลายเป็นสีน้ำตาลจนถึงสีดำเมื่อแก่ รู มีสีน้ำตาล สปอร์ รูปร่างเกือบกลม ผิวเรียบ ผนังบาง



Ganoderma subresinosum HL548

สรรพคุณ/การใช้ประโยชน์ เป็นเห็ดสมุนไพร และเป็นอาหารในท้องถิ่น บึง/ยางกิน

อ้างอิง -

Kew Mycology (2013). *Mycologia* 30(3): 332 (1938)

สภาพนิเวศ พบเป็นดอกเดี่ยว ในป่าดิบเขา

ลำดับเบส

Ganoderma_subresinosum_HL548_ITS_ok_AATGCATACTCCGTATTATTGATATGACATG
ATGCCTCCTACGCCACCATTAGAAGCTCGCCAAACGCTTCACGGTCGCGGCGTAGACAATTATC
ACACCGTAAGCCGATCCGCAAGGAACCAAGCTAATGCATTTAAGAGGAGCCGACCAGGCCGAC


AAGCCTCCAAGTCCAAATCTGCAAAACCCGCAAAGGTTTGTAGATTGAAGATTTTCATGACACTC
 AAACAGGCATGCTCCTCGGAATACCAAGGAGCGCAAGGTGCGTTCAAAGATTTCGATGATTCACT
 GAATTCTGCAATTCACATTACTTATCGCATTTTCGCTGCGTTCTTCATCGATGCGAGAGCCAAGA
 GATCCGTTGCTGAAAGTTGTATATAGATGCGTTACATCGCAATACACGTTCTTATACTTTATAGT
 GTTTGTAAATAACGCAGGCACAACCCGCTTCACGAGCCCGTAAAGGCCTCATTCCACTCATTGA
 AACCCACAGCAAGTGACAGGTGTAGAGTGGGTGAACAAGGCTGCTTAATCCCTTGAAGGACAA
 ATTACAACCCATTTTATATTGGCTATGGTTCCTTCCCCGGGTTTACTTTGGGGAACACACACAC
 GCCATTTCTTCCACTCTCAAGCGGCTAATGAAATTGCTAGGAAGGATCTTCAACATCAAGCAG
 ACAGGGGGTAGTAGCATGC



วงศ์	GEOGLOSSACEAE	(Geoglossales)
ชื่อวิทยาศาสตร์	<i>Geoglossum glutinosum</i> (Pers.) Hustad, A.N. Mill, Dentinger & P.F. Cannon	
ชื่อพ้อง	<i>Cibalocoryne glutinosa</i> (Pers.) S. Imai <i>Geoglossum glutinosum</i> Pers. <i>Geoglossum glutinosum</i> Pers. var. <i>glutinosum</i> <i>Geoglossum glutinosum</i> var. <i>lubricum</i> Pers. <i>Gloeoglossum glutinosum</i> (Pers.) E.J. Durand	
ชื่อไทย	ล้นพสุธา ล้นดิน	
ชื่อท้องถิ่น	-	
หมายเลขตัวอย่าง	HL573-แม่สอง	

ลักษณะทาง สัณฐานวิทยา

หมวกเห็ด เป็นรูปทรงกระบอก ขนาดส่วนฐาน กว้าง 0.23-0.31 cm ส่วนปลาย กว้าง 0.2-0.3 cm และมีความสูงประมาณ 3.23-4.46 cm สีดำ ผิวมัน สปอร์ รูปร่างทรงยาวรีคล้ายกระสวย ผิวเรียบ ผนังหนา มีผนังชั้น 2-3 ชั้น



Geoglossum glutinosum HL573

สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ -

อ้างอิง

Hustad, A.N. Mill, Dentinger & P.F. Cannon, *Persoonia*, Mol. Phyl. Evol. Fungi 31: 104 (2013)

Kirk PM, Cannon PF, Minter DW, Stalpers JA. 2008. *Dictionary of the Fungi* (10th ed.). Wallingford, UK: CAB International. p.24.

สภาพนิเวศ พบในป่าเต็งรัง ป่าเบญจพรรณ และป่าดิบเขา มักขึ้นเป็นกลุ่มบนกิ่งไม้หรือขอนไม้ผุ

ลำดับเบส

*Geoglossum glutinosum*_HL573_ITS_CGCGTGTCTTCTGCAGAACCGCTTATTGATATGCG
TTGTGACTAGTTATACCTCCAGCCTCCGACGATTGTTGATAAAAGGGATAGAGTCTACTACGCT
TGAGGTCATCGTGGCACC GCCATTGACTTTCAGGCATGCCCTGACCCGTAATAGGAGAGGGGGC

AATCACCCAACACCAAGCTGAGCTTGAGATTTTTACAATGACGCTCGAACAGGCATGCCCCTAG
 GAATGCCCAGGGGCGCAATGTGCGTTCAAAGATTTCGATGATTCACGGAATTCTGCAATTCACAT
 TACTTATCGCATTTTCGCTGCGTTCTTCATCGATGCAGGAACCAAGAGATCCGTTGTTGAAAGTT
 TTTAATGATTTAAACATTTAACTCAGACGACACCATTAAAAAAGATTTTAACTTGAGCTTCGGC
 AGGCACAGGGGGCCACCGAAGCAACAGTTTTAACTTGCGAGGTACACAAGGGGGTTGGAGGTT
 GGGCCAGGTTAGGACCCTAACTCAGTAATGATCCTTCTGCAGGTTACCTACAGAACGTCAAAA
 GTACTCAGAATTTCTGACAACCACGGATCAAGCAAGCGCAGATGTTTCGTCGAAATCATTAGAG
 GTCTCAATCAATGCGCTCACCACCTCTCCGGGGGACTCATTTCCAAGGATATGTTTAAAGGACC
 AACCGTATTGTCAGAAAGGAATGATACTTCCCCC



วงศ์	GANODERMATACEAE	(Polyporales)
ชื่อวิทยาศาสตร์	<i>Amauroderma rugosum</i> (Blume & T.Nees) Torrend	
ชื่อพ้อง	<i>Polyporus rugosus</i> Blume & T.Nees	
ชื่อไทย	-	
ชื่อท้องถิ่น	-	
หมายเลขตัวอย่าง	HL386, 409, 511-ป่าเมี่ยง, HL486-ปางมะโอ, HL549-แม่สอง, HL562-แม่สอง	

ลักษณะทาง สัณฐานวิทยา

หมวกเห็ด รูปไต สีน้ำตาลดำเข้ม ผิวหยาบย่นเป็นร่องรัศมี เห็นเป็นแถบเรียงซ้อนกันหลายชั้น ขนาด 3-6 cm × 3-16 cm ขอบหมวกเป็นริ้ว รู สีน้ำตาล ปากรูกลม ถี่ สีขาว เปลี่ยนเป็นสีแดงแล้วดำเมื่อช้ำ ก้าน ทรงกระบอกสีเดียวกับหมวก เนื้อแข็งเป็นเส้นหยาบสีน้ำตาล ขนาด 0.4-1.3 cm × 7-22 cm สปอร์ รูปร่างเกือบกลม ผิวเรียบ ผนังบาง



Amauroderma rugosum HL486



Amauroderma rugosum HL549 (ซ้าย) HL562 (ขวา)

สรรพคุณ/การใช้ประโยชน์ เป็นเห็ดสมุนไพร ต้านอนุมูลอิสระ และรักษาอาการอักเสบ

อ้างอิง

อนงค์ จันทรศรีกุล พูนพิไล สุวรรณฤทธิ์ และอุทัยวรรณ แสงวณิช. 2551. ความหลากหลายของเห็ดและราขนาดใหญ่ในประเทศไทย. สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 514 หน้า

Chan P.M., Gowri K., Tan Y.S., Vikineswary S., Umah Rani K. 2013. *Amauroderma rugosum* (Blume & T. Nees) Torrend: Nutritional Composition and Antioxidant and Potential Anti-Inflammatory Properties. Evidence-based Complementary & Alternative Medicine

Kirk PM, Cannon PF, Minter DW, Stalpers JA. 2008. *Dictionary of the Fungi* (10th ed.). Wallingford, UK: CAB International. p.24.

สภาพนิเวศ พบในป่าเต็งรัง ป่าเบญจพรรณ และป่าดิบเขา เป็นดอกเดี่ยว หรือเป็นกลุ่ม

ลำดับเบส

Amuaroderma_rugosum_HL486_ITS_ GGGCCGTTCTCATGCAGCACCGATTGATGAGATGA
GAAGCTGCCTCTAACGCCACCGTCAGACGCTCGCCAAACGCTTCACGGTCGCGGCGTTGACAAT
TATCACACCGACAGCCGATCCGCAAGGAACCAAGCTAATGCATTTAAGAGGAGCCGACTAATGA
GCCGACAAGCCTCCAAGTCCAAGCCTAACAAACCCGCAAAGGCTTTTAGGTTGAAGATTTTCATG
ACACTCAAACAGGCATGCTCCTCGGAATACCAAGGAGCGCAAGGTGCGTTCAAAGATTCGATGA
TTCCTGAATTCTGCAATTCACATTACTTATCGCATTTTCGCTGCGTTCTTCATCGATGCGAGAGC
CAAGAGATCCGTTGCTGAAAGTTGTATATAGATGCGTTACATCGCAATACACGTTCTATTACTTT
ACAAGGGTTTGTAAATAAACGCAGGCACAGACCGCTTCACGAGCCGTTAAACGACACGCTTCACG
ATATGAAACCCACAGTAAGTTCACAGGTGTAGAGTGGATGAGCAGGGCGTGACATGCCTCGGA
AGGCCAGCTACAACCCAGTCAAGACTCGATAATGATCCTTCCGAGGTTACCTACGAACACAT
TGTTACGACTTTTACTTCCAACACTCTCACTCGGCATGATGAAGTCGGCT

ลำดับเบส

Amuaroderma_rugosum_HL549_ITS_ CCGGGTTAGTCATGCTACTCGCTTATTGATATGAG
TTGCTACTTCTAACTCCTCCATCCTCCGCTCGCCAATGGTTTCACGGTCGCGGCGTTGACAATT
ATCACACCGACAGCCGATCCGCAAGGAACCAAGCTAATGCATTTAAGAGGAGCCGACTAATGAG
CCGACAAGCCTCCAAGTCCAAGCCTAACGAACCCGCAAAGGCTTTTAGGTTGAAGATTTTCATGA
CACTCAAACAGGCATGCTCCTCGGAATACCAAGGAGCGCAAGGTGCGTTCAAAGATTCGATGAT
TCACTGAATTCTGCAATTCACATTACTTATCGCATTTTCGCTGCGTTCTTCGTCGATGCGAGAACA
AGAGATCCGTTGCTGAAATTTGTATATAGATGCGTTACACCGCGTTACACGAGCTATAACTAGG
CAGGGCTTAGTAATAAACGCATTTCGAGACCGCAACACCAGTCTTCAAACGACTGGAGACATAA
TACTTAACCCGAGGATACAAACATGTGACAGGGGGAAAAAGTGATGGAACGAGGAAGCAAAAA
GAGATAGGCTGCGCGTGATGATAGAGGTTTCAGCTACAACCATCTTATCCACCGGAAAAAATG
TCTTCCGTTTTTCTCCATCCTACTCCGCTTGTTGATATGTATCGAGGCATCTCAATCAGCGAAG
GACGACGG

Amuaroderma_rugosum_HL562_ITS_ok_ GGGCTTGTTGTCATGCTGCACCGATTGATGAT
ATGAGATGCTGCGTGTTACGCCACCAGTCCGCCGCTCGCCAAACGCTTCACGGTCGCGGCGTTG
ACAATTATCACACCGACAGCCGATCCGCAAGGAACCAAGCTAATGCATTTAAGAGGAGCCGACT
AATGAGCCGACAAGCCTCCAAGTCCAAGCCTAACAAACCCGCAAAGGCTTTTAGGTTGAAGATT
TCATGACACTCAAACAGGCATGCTCCTCGGAATACCAAGGAGCGCAAGGTGCGTTCAAAGATTC
GATGATTCACTGAATTCTGCAATTCACATTACTTATCGCATTTTCGCTGCGTTCTTCATCGATGCG
AGAGCCAAGAGATCCGTTGCTGAAAGTTGTATATAGATGCGTTACATCGCAATACACGTTCTAT
TACTTTACAAGGGTTTGTAAATAAACGCAGGCACAGACCGCTTCACGAGCCGTTAAACGACACGC

TTCACGATATGAAACCCACAGTAAGTTCACAGGTGTAGAGTGGATGAGCAGGGCGTGACATGC
CTCGGAAGGCCAGCTACTACCCAGTCAAGACTCGATAATGATCCTTCCGCAGGTTACCTACGG
AAACATTGTTACGACTTTTACTTCACCATGCTACGTCGCATGATAGATATGGCAACGAGGGACA
TCCTCCTCCAGAGGACGGAGG



วงศ์	GANODERMATACEAE	(Polyporales)
ชื่อวิทยาศาสตร์	<i>Ganoderma subresinosum</i> (Murrill) Humphrey	
ชื่อพ้อง	<i>Amauroderma subresinosum</i> (Murrill) Corner, <i>Fomes subresinosus</i> Murrill, <i>Magoderna subresinosum</i> (Murrill) Steyaert <i>Polyporus mamelliporus</i> Beeli <i>Trachyderma subresinosum</i> (Murrill) Imazeki,	
ชื่อไทย	ชันเนื้อ	
ชื่อท้องถิ่น	-	
หมายเลขตัวอย่าง	HL433-ป่าเมี่ยง	

ลักษณะทาง สันฐานวิทยา

หมวกเห็ด มีรูปร่างเป็นแผ่นคล้ายหนัง ขนาด 5-15 cm ขอบหมวกที่ยังอ่อนอยู่เป็นสีขาว กลายเป็นสีน้ำตาลจนถึงสีดำเมื่อแก่ รู มีสีน้ำตาล สปอร์ รูปร่างเกือบกลม ผิวเรียบ ผนังบาง



Ganoderma subresinosum HL433, bar=1cm

สรรพคุณ/การใช้ประโยชน์ เป็นเห็ดสมุนไพร และเป็นอาหารในท้องถิ่น บึง/ยางกิน

อ้างอิง -

Kew Mycology (2013). *Mycologia* 30(3): 332 (1938)

สภาพนิเวศ พบเป็นดอกเดี่ยว ในป่าดิบเขา
ลำดับเบส คูโน HL548-แม่สอง



วงศ์	POLYPORACEAE	(Polyporales)
ชื่อวิทยาศาสตร์	<i>Lentinus polychrous</i> Lev.	
ชื่อพ้อง	-	
ชื่อไทย	เห็ดลม	
ชื่อท้องถิ่น	เห็ดลม เห็ดกระด้าง เห็ดขอน เห็ดบด	
หมายเลขตัวอย่าง	HL340-ปางมะโอ และ HL343-ปางแดงในพะเยาที่ปางมะโอ, HL327-แม่สอง และ HL586-แม่สอง	

ลักษณะทาง สัณฐานวิทยา

เป็นเห็ดกลุ่มเห็ดครีบ ดอกเป็นรูปกรวยขอบมนลงด้านล่าง ผิวด้านบนมีขนสีน้ำตาลปกคลุมทั่วทั้งหมวก ด้านล่างมีลักษณะเป็นครีบสีน้ำตาลอ่อนถึงน้ำตาลเทา เรียงติดลงไปตามก้านมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4-16 ซม. ก้านดอกเป็นทรงกระบอก แข็งเหนียวขนาด 0.5-2 ซม. ยาว 0.5-2 ซม.



Lentinus polychrous HL340, bar=1cm





Lentinus polychrous HL343-เพาะที่ปางมะโอ bar=1cm

สรรพคุณ/การใช้ประโยชน์ เป็นอาหาร ใช้ลวก ต้ม หรือนึ่ง กินกับน้ำพริก ใช้ปรุงแกง เช่น แกงเห็ด แกงแค



Lentinus polychrous Lev. HL327

อ้างอิง

อนงค์ จันทรศรีกุล พูนพิไล สุวรรณฤทธิ์ และอุทัยวรรณ แสงวณิช. 2551. ความหลากหลายของเห็ดและราขนาดใหญ่ในประเทศไทย. สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 514 หน้า
อัปสร และคณะ. 2553. พืชอาหารและสมุนไพรท้องถิ่นบนพื้นที่สูง. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน). 287 หน้า.

สภาพนิเวศ พบในป่าดิบแล้ง เป็นดอกเดี่ยว หรือเป็นกลุ่ม ในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นส่วนใหญ่

ลำดับเบส

*Lentinus_polychrous_HL343_ITS*_AGTCTGACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGG
ATCATTAATGAATTCACTCTTGAAGCTGTTGCTGGCCTCTAGGGGCATGTGCACGCTTCATCAG

TCCATTCAACCACCTGTGCACTTTTTGTAGATCATTGAAGTCATCTCTCAGGTCATTAGTGACTT
 GGATGTCGGGAGGTTCTTATACCTTCTGGCTGACTCTCAGTGATCTAATTTACACACCCTAATG
 TATGTTAATGAATGTCGTTTATCTTTGGGCCATGTGCCTATAAACCTAATACAACCTTTCAACAAC
 GGATCTCTTGGCTCTCGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAATGTGAATTGCAG
 AATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACCTTGCGCCCCTTGGTATTCCGAGGGGCATGCC
 TGTGTTGAGTGTCAATTAATTCTCAACCTATAAAGGCTTTTGTGAAGTCATTATAGGCTTGGATT
 GTTGGGGGCTGCTGGCTTGTGCGAGTCAGCTCTCCTTAAATGCATTAGCAGGACTCTATTGCCT
 CTGCGCATGGTGTGATAATTATCTACACCAGTTGCATGTAATACTATAATGTGTCCAGCTCTCTA
 ATCGTCTTCGGACAATTATTGAACATTGACCTCAAATCAGGTAGACTACCCCA




Gomphales



วงศ์	GOMPHACEAE	(Gomphales)
ชื่อวิทยาศาสตร์	<i>Ramaria maculatipes</i> Marr & D.E. Stuntz	
ชื่อพ้อง	-	
ชื่อไทย	ปะการัง	
ชื่อท้องถิ่น	-	
หมายเลขตัวอย่าง	HL513-ป่าเมี่ยง, HL480-ปางมะโอ	

ลักษณะทาง สัณฐานวิทยา

ดอกเห็ด ขนาด กว้าง 3-12 cm สูง 2-12 cm แตกแขนงรูปดอกกระหล่ำ (cauliflower-shape) หรือแตกกิ่งก้านคล้ายปะการัง เห็นเป็นพุ่ม สีครีมหรือขาวอมชมพู ก้าน ทรงกระบอกสีขาว อ้วนเรียวลงไปที่ส่วนโคน ขนาด 2-4 cm × 2-4 cm สปอร์ รูปทรงรีปลายมน ผิวขรุขระ



Ramaria maculatipes HL480

สรรพคุณ/การใช้ประโยชน์ เป็นเห็ดกินได้

อ้างอิง

- อนงค์ จันทรศรีกุล พูนพิไล สุวรรณฤทธิ์ และอุทัยวรรณ แสงวณิช. 2551. ความหลากหลายของเห็ดและราขนาดใหญ่ในประเทศไทย. สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 514 หน้า
- Barnhart K.S. 2009. Trial field key to species of *Ramaria* in the Pacific Northwest. North Idaho Mycological Association.
- Marr, C. D. & D. E. Stuntz. 1973. *Ramaria* of Western Washington. Bibliotheca Mycologia.

Petersen, R.H. & Catherine Scates (1988). Vernal Fruiting Taxa of *Ramaria* from the Pacific Northwest, Mycotaxon vol. XXXIII 101-144.

Exeter, R. L., Norvell, L. & Cázares, E. 2006. *Ramaria* of the Pacific Northwestern United States, U. S. Department of the Interior, Bureau of Land Management, Salem, Oregon,

สภาพนิเวศ พบในป่าเต็งรัง ป่าเบญจพรรณ และป่าดิบเขา เป็นกลุ่ม

ลำดับเบส

Ramaria_maculatipes_HL480 ITS AAAATCGTTACCAGGTTTTCTAGGTGAACCTTCGGA
AGGGTCCATATAGCCTGAATTAGGGGGAAGTTTCAAGCCGGCCCTTCGGCTCTTGAGAAGCCA
TGTCGGGGTTTTCTTCCCTTCTTCCAAATCCTGGGCCCTAAGGCGAAGTCCTTCCCTTTTGG
AACCGGTCAAAGTCCTTGAAGAAGGGTGAAGGCCGGGGCGCTTCTTTTTTTATCCTTTCC
ACCTGGTTGAAATCCTTTTTGAAGTTTCCAGGGGAAGTGAAGGGAAGTAATATACTTTCAAC
AACGGATCTCTTGGCTTTCGCATCGATGAAGGACGCCGCGAAAGTGCAGAACGTAATGTGAATT
GCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCATCTTGCCTCCTTGGTATTCCGAGGAGCA
TGCCTGTTTGAGTGTCTGAATCCTCTCGATTCCATCTCTTTTTCTTTGTTGAAAACGGGGGAG
GGTCGGATTTGGACGCTTGGGTGGTCTTCATCGCTCGTCTGCTAAATGCATTAGCTTGGCCTC
TCTGGGAGTCGGTCGGACACGGTGTGATAAATGATAAACAACCTTGTCTTCTAGGCCGTTGGAGG
AAGAAGTCGGCACACCAATCATCAATGGCGGAGGCCGGAGGAGGAGGAAGTCGCAACACGTA
TCAGCAAGCGGTGCTGCAGAGATATCGC

Russulales



วงศ์	RUSSULACEAE	(Russulales)
ชื่อวิทยาศาสตร์	<i>Russula dissimulans</i> Shaffer	
ชื่อพ้อง	-	
ชื่อไทย	เห็ดถ่านใหญ่	
ชื่อท้องถิ่น	เห็ดถ่านหลวง	
หมายเลขตัวอย่าง	HL545-แม่สอง	

ลักษณะทาง สัณฐานวิทยา

หมวกเห็ด รูปกระทะคว่ำ สีขาวหม่น ขนาด 10-12 cm ผิวเรียบ กลางหมวกเว้าตื้น เนื้อหนา สีขาว ขอบหมวกจะเป็นคลื่นบิดงอขึ้นเล็กน้อยหรือฉีกขาด เมื่อดอกเห็ดบานเต็มที่เปลี่ยนเป็นสีดำ **ครีบ** เป็นแผ่นหนา กว้าง 0.5 cm ยึดติดกับก้าน เรียงห่างกัน (ขอบหมวกยาว 1 cm มีครีบเพียง 5-6 ครีบ) มักมีรอยฉีกขาดเป็นแห่งๆ สีขาวนวล และเปลี่ยนเป็นสีดำเมื่อแก่เช่นกัน **ก้าน** ทรงกระบอก สีขาว ขนาด กว้าง 1-2 cm ยาว 5-6 cm ผิวเรียบ เนื้อภายในก้านสีขาว พิมพ์สปอร์สีขาว **สปอร์** รูปร่างค่อนข้างกลม มีหนามละเอียดโดยรอบและมีหนามใหญ่หนึ่งอัน ขนาด 7-8 x 6 μm



Russula dissimulans HL545

สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ เป็นอาหาร ใช้ลวก ต้ม หรือนึ่ง กินกับน้ำพริก ใช้ปรุงแกง เช่น แกงเห็ด

อ้างอิง

อนงค์ จันทรศรีกุล พูนพิไล สุวรรณฤทธิ์ และอุทัยวรรณ แสงวณิช. 2551. ความหลากหลายของเห็ดและราขนาดใหญ่ในประเทศไทย. สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 514 หน้า
 Shaffer, R.L. (1962). The subsection Compactae of *Russula*. *Brittonia* 14: 254-284.
 Thiers, H.D. (1997). The Agaricales (Gilled Fungi) of California. 9. Russulaceae I. *Russula*. Mad River Press: Eureka, CA. 158 p.

สภาพนิเวศ พบในป่าไผ่ และป่าเบญจพรรณ เป็นดอกเดี่ยว หรือเป็นกลุ่ม

ลำดับเบส

Russula_dissimulans_HL545 ITS ok CTCCTACTTCCTCGATCTTCGACTTATAGGTAGGC
 CCTGTTTCATATCATTAAATTGCAGGTGCGTGTACTAAAAAGCCACACGGTGTCCGCGGAGGCTG
 ACCCCGCGTATGGATAATTATTGTTTGGGGCGGCGCGGGGGGGTGGGCTCGCTCTTCGAAG

CCTTTTGCCCACTTTAGCTTTTTTCACTACTTTTCCCCTTGTGCATAACCCCGTGGGGTCTCTC
 TTTTGGGAGGCTCGCGTTTTTAATACACACACATACACGTTTATAGTCAGTTTAGAATGTCACTC
 ATTTGCGATCACACGCAATCAATACAACCTTTCAACAATGGATCTCTTGGCTCTCGCATCGATGA
 AGAACGCAGCGAAATGCGATACGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGA
 ACGCACCTTGCACCCCTTGGTATTCCGAGGGGTACACCCGTTTGAGTGTCGTGAAATTCTCAA
 CCTTCTTGGTCTCTTGATCAAGATGGCTTTGGACTTGGAGGTGTTTGCTGGCTTTGCGAAAGGT
 CAGCTCCTCTTAAATGCATTAGTGGGGTCCCCTTTGCCGACCCCGAGGCGTGATAAGTCATTTT
 TACGTCTCGGGATTTGCTCTGTTCTTGGAACCTGCTTCTAATCGTCTCATTGGAGGCATGGT
 TGAAGATCTCGTAACCCACGTATCAATAAGCGGAGTATGCAGAGACAACGCG

