

ภาคผนวก

แบบสอบถามเลขที่ _____

แบบสัมภาษณ์การใช้ยาพื้นบ้าน ราชจีดังต้ม สำหรับขับสารพิษในร่างกาย

คำชี้แจง โปรดใส่เครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง () หน้าข้อความที่เลือก หรือ เติมข้อความลงในช่องว่างที่เว้นไว้

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์
2. ที่อยู่
3. อายุ
 ต่ำกว่า 15 ปี 15 – 19 ปี 20 – 24 ปี
 25 – 29 ปี 30 – 34 ปี 35 – 39 ปี
 40 ปีขึ้นไป
4. โรคประจำตัว ประวัติการแพ้ยา

ส่วนที่ 2 ข้อมูลก่อนใช้สมุนไพรและยาพื้นบ้าน

1. อาการป่วย ระยะเวลาที่ป่วย
 2. การรักษาตนเอง(ก่อนตรวจเลือด) ใช้ยา
 3. ได้รับยาจาก ซื้อในเมือง ซื้อในหมู่บ้าน หา/ปรุงเอง
 4. การใช้ยา รักษาเฉพาะเมื่อป่วย รักษาเป็นประจำ หา/ปรุงเอง
 5. ระยะเวลาที่รักษาตนเอง
 6. อาการหลังรักษาตนเอง
 7. ผลการตรวจเลือด เมื่อวันที่
- () ปกติ () ปลอดภัย () เสี่ยง () ไม่ปลอดภัย

ส่วนที่ 3 ข้อมูลหลังใช้สมุนไพรและยาพื้นบ้าน

1. ใช้ยาrajจีดังวันที่ ถึงวันที่
2. ผลจากการใช้ยา หรือ ประสิทธิภาพของยาที่ท่านรู้สึกได้
 ดีขึ้น รู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลง
- ไม่รู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลง
- แย่ลง สาเหตุ
3. ผลข้างเคียงของการใช้ยา อาการแพ้ หรือ พิษที่เกิดจากการใช้ยา ที่ท่านรู้สึกได้
 เกิดอาการแพ้
- ไม่เกิดอาการแพ้
- ไม่รู้
8. ท่านคิดว่าผลจากการใช้ยาพื้นบ้าน ได้ผล ไม่ได้ผล เฉยๆ

9. ท่านคิดว่าต้องการใช้ยาต่ำรับอื่น ได้แก่

เนื่องจาก ประสิทธิภาพดีกว่า เห็นผลเร็วทันใจ มีน้ำใจกว่า

ข้อเสนอแนะอื่นๆ

ขอบคุณสำหรับความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม



รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ด้านสมุนไพร
ในการรณรงค์ลดการใช้สารเคมีและวิเคราะห์หารือพิษตอกด้านในเลือดของเกษตรกร และชาวบ้าน





รายชื่อผู้เข้าร่วมทดสอบการใช้ยาแรงจิต สำหรับขับสารพิษในร่างกาย

วันที่ 11 มิถุนายน 2557

ณ โครงการขยายผลโครงการหลวงป่ากล้วย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ลายเซ็น	หมายเหตุ
1.	นาย สุริยา วิภากร ใจดี	P-	00000000000000000000000000000000
2.	นาย สุรัตน์ ใจดี	สูบ	00000000000000000000000000000000
3.	นาย ไชย เศรษฐ์	สูบ	00000000000000000000000000000000
4.	นาย ไชย เศรษฐ์ ใจดี	สูบ	00000000000000000000000000000000
5.	นาย วิชัย พ่อ ใจดี	สูบ	00000000000000000000000000000000
6.	นาย ไชย ใจดี	สูบ	00000000000000000000000000000000
7.	นาย ไชย ใจดี	สูบ	00000000000000000000000000000000
8.	นาย ไชย ใจดี	สูบ	00000000000000000000000000000000
9.	นาย ไชย ใจดี	สูบ	00000000000000000000000000000000
10.	นาย ไชย ใจดี	สูบ	00000000000000000000000000000000
11.	นาย ไชย ใจดี	สูบ	00000000000000000000000000000000
12.	นาย ไชย ใจดี	สูบ	00000000000000000000000000000000
13.	นาย ไชย ใจดี	สูบ	00000000000000000000000000000000
14.	นาย ไชย ใจดี	สูบ	00000000000000000000000000000000



รายชื่อผู้เข้าร่วมทดสอบการใช้ยาร่างจีด สำหรับขับสารพิษในร่างกาย

วันที่ 11 มิถุนายน 2557

ณ โครงการขยายผลโครงการหลวงป่ากส้าย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ลายเซ็น	หมายเหตุ
15	นาย/นางสาว ฤทธิ์มนัส		10 กม. x 2
16	นายว่องชัย กูล		10 กม. x 2
17	นายไสว ใจดี		10 กม. x 1
18	นาย/นายน พานะ		coll.
19	นาย ชัยวุฒิ เจริญ.		✓
20	นาย ใจดี ใจดี		new ✓
H1	นาย วีระ พัฒน์		coll.
H2	นาย พานะ พานะ		coll.
H3	นาย ใจดี ใจดี		coll.
H4	นาย พานะ พานะ		coll.
H5	นาย ใจดี ใจดี		coll.
H6	นาย พานะ พานะ		coll.
H7	นาย ใจดี ใจดี		coll.
H8	นาย พานะ พานะ		coll.



รายชื่อผู้เข้าร่วมทดสอบการใช้ยาารางจีด สำหรับขับสารพิษในร่างกาย

วันที่ 11 มิถุนายน 2557

ณ โครงการขยายผลโครงการหลวงป่ากล้วย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ลายเซ็น	หมายเหตุ
๒๙	ใบ บุญเรือง ใจดี	บุญเรือง	๕๖๑
๓๐	นรา พิศาล เลากุล	พิศาล	๕๖๑
๓๑	น.ส. รุ่ง ใจดี	รุ่ง	๕๖๑
๓๒	* นางศรี ใจดี	ศรี	๕๖๑
๓๓	* นางสาว ใจดี	สาว	๕๖๑ ๒๘๖ ๒๖๖ ๒๔๖ ๒๒๖ ๒๐๖ ๑๘๖
๓๔	น.ส. ใจดี	ใจดี	๕๖๑
๓๕	น.ส. อรุณรัตน์ ใจดี	อรุณรัตน์	๕๖๑



รายชื่อผู้เข้าร่วมทดสอบการใช้ยาร่างกาย สำหรับขับสารพิษในร่างกาย

วันที่ 11 มิถุนายน 2557

ณ โครงการขยายผลโครงการหลวงป่ากสัย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ลายเซ็น	หมายเหตุ
1 36	นาย พงษ์ พัฒนา	นาย พงษ์ พัฒนา	พ.ศ. 2557
2 37	นางสาว นฤมล	นางสาว นฤมล	น.
3 38	นางสาว อรุณรัตน์	นางสาว อรุณรัตน์	น.
4 39	นาย อรุณรัตน์ คงชัย	นาย อรุณรัตน์ คงชัย	น.
5 40	นางสาว อรุณรัตน์ คงชัย	นางสาว อรุณรัตน์ คงชัย	พ.ศ. 2557
6	นางสาว อรุณรัตน์ คงชัย	นางสาว อรุณรัตน์ คงชัย	(ชื่อ)- ชื่อ-
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			

เอกสาร “ร่างจีด สมุนไพรลังพิษ”



ภาคเหนือ	น้ำแม่น้ำแม่เจี้ยน รงจีด	ภาคกลาง	รงจีด ยาเขียว เหรือชาเขียว ต้าสีเขียวเนื้อโค
ภาคอีสาน	รงจีด	ภาคใต้	รงเย็น คาย คเหວ ทิดพุด

ชื่อสามัญ: Babbler's bill leaf
ชื่อวิทยาศาสตร์: *Thunbergia laurifolia* Lindl.
วงศ์: ACANTHACEAE

รงจีด	
	ต้น เป็นไม้เลื้อยเนื้อแข็ง สามารถเลื้อยไปได้ไกล 5 - 10 เมตร
	ใบ ใบเดี่ยว เเรียงตรงข้าม รูปขอบขนานหรือรูปใบหัวใจ ขอบใบเรียบ มีเส้นแขนงใบ 5 - 10 เส้น หนังใบเรียบมัน น้ำใบเขียวเข้ม ใบขนาดใหญ่กว่าใบอ่อน อ่อนนุ่มนวล
	ดอก ดอกออกตลอดปี ช่อต่อช่อ ออกที่ปลายกิ่งและซอกใบ ฐานดอกอัด แน่นเป็นรูปทรงกลม ดอกย่อยมีชื่อตามสี โคนเชื่อมกัน ปลายแยกออกเป็น 5 แยก ก้านสั้น กลีบดอกมีสีขาว แดง ชมพู เหลือง ไข่มุก หรือสีเขียว ใบประดับสีเขียวประดับม้าตาลแดง ผลแห้ง แตกได้

การใช้ประโยชน์ของ ชุมชนบนพื้นที่สูง

14.

สำหรับเด็ก โดยเฉพาะเด็กอายุไม่เกิน ๕ ปี มีอาการ ไข้สูงมาก หากไม่มีสีสังคัดปกติเด็กๆ กับอะไรดีอยู่ ในตอนนี้มีอาการหน้าอืดหัววาย (อาจเป็นโรคคออื่น) ต้องรีบพาไปพบแพทย์โดยทันทีที่สุด



อาการคอกลัด เป็นเลือดคล้ำ จากทางไหนก็ตาม โดยเฉพาะทางซ่องคอคอด ดองพานไปพบแพทย์โดยเร็วที่สุด

15.

อาหาร	ดอกนำ้ไปประกอบอาหารประเภท แกง อย่างแกงส้ม
สมุนไพร	เลาหรือใบนำ้ไปต้มน้ำดื่ม รักษา อาการอาหารเป็นพิษ และพิษเบื้องเม่าต่างๆ ช่วยขับสารพิษในร่างกาย แก้ลมพิษ แก้ปวดห้อง



รางจีด สมุนไพรสาธารณสุขมูลฐาน

สรรพคุณ

แก้ไข้ ร้อนใน ถอนพิษไข้
(ไม่ควรรับประทานเป็นประจำ)



10. เจ็บปอกในท้องด้านหลังไว้ก็หาย
ปวดท้องรุนแรงมาก ห้องแข็ง อ้าท้องมูก
และน้ำที่เด็กน้อยหรือแม่ (อาจเป็นโรคไข้ตึ้งอักเสบอย่างรุนแรง
หรือถ้าได้ส่วนนี้อักเสบ)



11. อาเจียนเป็นเลือดคิดเห็นว่าเป็นโภค (อาจเป็นโรค
ร้ายแรงของไวรัสกระเพาะอาหารหรือปอด) ต้องให้
คนไข้หันหน้าที่น้ำ หันหน้าเพื่อให้เด็กชี้นูน
มาตรฐานที่บ้านถ้าเป็นด้องพากไปพบแพทย์ทันที



12. ก้อนเดินอย่างรุนแรง ถุงขาวเป็นน้ำ
บางทีเล็กน้อยก็หันขาวหัว
บางทีถ่ายทุกที ลักษณะตื้นๆ ชั่ว
เวลาเรื้อรัง (อาจเป็นโรคลิ่ว) ต้อง[†]
พานไปพบแพทย์โดยทันที ถ้าไม่ไหวหัวเสียแข็ง
แพทย์หรืออนามัยที่ใกล้ที่สุดโดยเร็ว

13. ถ่ายอุจจาระเป็นน้ำเหลือง
บางทีเก็บน้ำมันน้ำอุจจาระเหลือง
ถ่ายบ่อยมาก อุจจาระล้นถังรักใน
หนึ่งชั่วโมง คนไข้พิสูจน์มาก
(อาจเป็นโรคคิดอย่างรุนแรง)



ผลการวิจัย

สมุนไพรรางจีด ที่เกี่ยวกับการถอนพิษค้างๆ ในร่างกาย
สรุปโดยค้นเป็นฐานนับองค์การวิจัยฯ ใจดีนี้

กระบวนการอาหาร	รายการต่อ	แพ้แมลงภู่น้ำไฟ
บัว	ถุงใบโภค	แพ้รังสีแลด
ใบไม้เมือง	ถุงใบโภค	แพ้ยา
แขกใบไม้เข็น	ห้องร่วง ห้องเสีย	แพ้ยาแก้ปวด
ชี้เชื่อมสูตรชี้	อาเจียนอาหารเป็น	แพ้ยาดัดผม
ไข่เชื่อมชาลีม	พิษ	แพ้ยาแพ้
คอดเลสเคลอรอล	ห้องรูป	แพ้พิษ
คัน	ห้องดีดฟื้น	แพ้พิษ
คันดา	หนองลักบีชัน	แพ้อาหารทะเล
คันดี	น้ำดักเท้า	ไฟลามตุ่ง
คันนู	เบาหวาน	ภูมิแพ้
คันน้ำเมือง	ปวดแขน ปวดขา	มดเดดคัฟไฟฟ้า
คลื่นเย็นอาเจียน	ปวดตัว	แมงป่องอ่อน
ความดันโลหิตสูง	ปวดท้องก่อนมีรอบ	แมลงสาดแล้วร้อน
งูเขียวตัด	เดือน	แมลงเหตุดา
งูดงเข็งตัด	ประจันเดือนไม้ปักดิ	แมลงງูต่อย
งูสวัด	ปวดคอม	เมารถ

งูเข่าตัด	ปัวบัวม่วงเข็ปตาม	เมฆเหล้า
งูเสียดห้อง	ร่างกาย	ไมเกรน
เจ็บคอ	ปัวดแบบปวดร้อนที่	ยาข่าแมลงโพลีดอล
เจ็บปาก	หลัง	ยุงตัด
เจ็บเหือก	ปัวดหัว มีน้ำหัว	ลดสีดวงทวาร
ชาที่เรือและเต้า	ปัวดฟัน	ร้อนที่ฟัน
ชื่นเครา	ปัวกากกระจอก	เติม
เดินไม่สะดวก	ปัวสลายมีลิน	เลิกเหล้า
ตาแดง	ปัวสลายเป็นฟอง	เวียนหัว
ตาพร่องที่เป็นน้ำด้วย	เหลืองทุ่งเข้าน	ลมอบน่อ
ตารางายคีด่อง	ปัวสลายเลี้ยวมีบ่ออย	สารหนู
แตงโมเป็นพิษ	ปัวสลายสุดแล้วเสียว	ลิว
แตงต้มอย	เป็นไข้	สมนหมาย
ตุ่นคัน ที่เระยะ	ผด	หนานนัน
ตัวตืดตอย	ผ่อน	หมอยาอีรีเป็นพิษ
ตะขะบัดดี้	ผึ้ด	หนอนบัน
ถูกด่านข้อน	ผื่นแดงตามร่างกาย	หือหอบบ
ถูกเดริดไฟฟ้าคาด	แพลริ้วอ่อง	เหตุเป็นพิง
ถูกน้ำมันข้อน		

อาการที่รุนแรง มีดังนี้

7. ไข้สูง (ตัวร้อนตัด) คาดคง ปัวดมือของมากซึ่ม นาเงือกหอก (อาชเป็นไข้หัวติดใหญ่ หรือไข้ป่าชนิดขั้นสูง)
8. ไข้สูงและเรื้อรัง (ตัวเหลือง) อ่อนเพลียมาก อาชเขียวและชาโกรง (อาชเป็นโรคตับอักเสบ ภูมิต้องต้านทาน ฯลฯ)
9. ปัวดแหลกเฉียบ เวลาอาเจียนออกด้วยปัวตามขั้น หน้าอักเสบซึ่งอาจห้องสูญและมีไข้ตื้นน้อย นรีโภก (อาชเป็นไข้ตัวตึงตักสนอนช่อง肠胃 หรือล่าไฟส่วนอันอักเสบ)




หากผู้ป่วยเป็นโรคร้ายแรง โรคเรื้อรัง หรือโรคที่ซื้อพืชจนไม่ได้ແນ່ชักว่ารักษาได้ ต้องใช้ยาตัด นาคทะขัก กระซูกหัก มะเริง วัฟไฟค์ กานาโนะ กวนวนโนะ กิตตู โรคเบาหวาน โรคเรื้อรัง ดีชิน หลอดลมอักเสบเรื้อรัง ปอดบวม (ปอดอักเสบ) อาการบวม ไข้ไฟฟอยด์ โรคตาทุกชนิด ไม่ควรใช้สมุนไพร

ผู้ป่วยอาการโรค/อาการ นาดเข็บที่รุนแรง ต้องนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลทันที ไม่ควรรักษาด้วยการซื้อยา自行炮制 ทางเดียว




ถูกน้ำร้อนลวก	แพลริ้วอ่อง	ข้ออ่อนเพลีย
ถูกงูเข้าน	แพลสด	เรือสูตรอีส
ถูกจากาลวัย	พะอิชพะอม	รังนูกุ้ง
แพบีชร์	เพลี้ยเปปี	ไข้ร้อน
แพก้าแฟท	แพทเครื่องสำอาง	แพทกุ้นและอ่อนแข็ง
แพกวยเตี้ยบีด	แพพังชากฟอก	ห้อใจเสีย




มีการวิจัยในประเทศไทยนานแล้ว แต่ยังไม่ตัดจน

พ.ศ. 2521 นักวิจัยจากคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นกลุ่มแรกที่ทดลองป้อนผง慌าร่างสีดให้หมูทดลองกินน้ำยาสารวิกนินพบร่วมกับหัวหักและตาดาย แต่ถ้าผสมกับน้ำยาสารวิกนินก่อนป้อน พบร่วมหูกทดลองไม่เป็นอะไร และสรุป 慌าร่างสีดสามารถลดชับสารพิษชนิดนี้ไว้

พ.ศ. 2523 หาย์ เดชะเสน และคณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ใช้น้ำคั้นใบ慌าร่างป้อนหูกทดลองที่กินน้ำยาข่าแมลง “โพลีดอล” พบร่วมกับพิษได้ ลดอัตราการตายลงจาก 56% เหลือเพียง 5% เท่านั้น ในขณะที่วิธีการฉีดกลับไม่ได้ผล

พ.ศ. 2551 สุชานี คงกระพันธ์ ใช้สารสกัดแห้งในร่างวีดีป้อนหมูทดลองที่ได้รับยาข่าแมลงกลุ่มอร์แกนโนฟอสเฟต์ซึ่งมีроваเรอ้อน พบร่วมช่วยชีวคิดได้ 30%

พ.ศ. 2553 จิตบรรจง ตั้งปอง มหาวิทยาลัยลักษณ์ พบร่วมสารประกลบในใบราธีชี้ฟอยป้องกันการตายของเซลล์ประสาทของหมูทดลองที่ได้รับพิษจากสารตระกูล จึงสามารถป้องกันสูญเสียการเรียนรู้และความจำได้อย่างมีประสิทธิภาพ

6.

ต้มหอกิ่ง ตามหอกิ่ง มีสาระเหลือง และมีอุ่นหัวจะเกิดฟองน้ำหอกิ่ง (เป็นอาการของดีช่า) อาการนี้แสดงถึงอันตรายร้ายแรง ต้องรีบไปพบแพทย์ อาการเข็บป่วยและไข้ที่ไม่ควรใช้สมุนไพรหรือซื้อยา自行炮制 ด้วยตนเอง



2. เมื่ออาหาร กลิ่นໄส อาเจียน
(หรืออ่างไม้อ่างหนึ่ง)
ด้านเป็นอยู่ต่อหน้ากินชา
อาจเป็นโรคกระเพาะ



3. บุ้รี ตามัว ชาที่ลื้น ชาที่ผิดหวัง

4. ประสาทรับความรู้สึก ทำงานໄว้เกินปกติ
 เช่นพิษจะระคิวน้ำที่รู้สึกเจ็บ
 ถุงลมที่แบบหนาศรีรัง ฯลฯ

5. ใจสั่น ใจเต้น หรือรู้สึกหนาวบาง
 ใจจะหดดันและเป็นน้ำอ่า



สำหรับในคน นพ. ปัญญา อิทธิธรรม
 ทดลองเก็บข้อมูลการใช้สมุนไพรร่างกาย
 ในเกษตรกรซึ่งที่มีผู้สูงอายุและแมลง ทั้งกลุ่ม
 ไม่ปลูกด้วย กลุ่มเสียง กลุ่มปลูกด้วย โดยตรวจ
 จากระดับเอนไซม์ในร่างกายที่เพิ่มขึ้นเมื่อได้รับ
 สารพิษนี้

พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ
 ทางสถิติระหว่างกลุ่มที่กินและไม่ได้กินสารสกัด
 น้ำรังจื๊อ

แต่ยังสรุปไม่ได้ชัดเจน เพราะมีปัจจัยต่างๆ
 ของพืชฐานร่างกายอื่น ๆ ของอาสาสมัคร เช่น
 ความแข็งแรง อายุ เป็นต้น



สารสำคัญ

- ลดไข้ (antipyretic)

- ถอนพิษ (detoxification)

กลุ่ม flavonoids ที่สำคัญคือ apigenin
 ลักษณะพิเศษ ต้านไวรัส 11 ชนิด ภูมิแพ้ ขัด
 อนุมูลอิสริยะ ต้านการสร้างเซลล์มะเร็ง และยังมี
 สารต้านออกเสบ อ่อน化 ฯลฯ

- สะสม เรือรัง เช่น ยาจ้ำหัญญา ยาจ่าแมลง
 สารเคมีเกษตร ฯลฯ

- เลี้ยงพลัน เช่น โคนยาพิษและสตอริกนิน

อาการแพ้ที่เกิดจาก การแพ้ยาสมุนไพร



1. คืนขึ้นคันคิวน้ำจางเป็นน้ำเหลือง
 ตุ่นๆ ดีด เป็นปืนหรือปืนมีดแบบ
 กัดขลุกพิษ อาจบวมที่ตา (ตาบีบ)
 หรือมีไฟป่า (ปากอ่อ) หรือมี
 เพียงดวงเดียวที่คิวน้ำ



ถ้าแพ้ยาสมุนไพร



สมุนไพรมีคุณสมบัติเข้มข้นเดียวกันของ
 ทั่วไป คือมีทั้งคุณและโทษ บางคนใช้แล้วเกิด
 อาการแพ้ เป็นคัน คัน หรือมีอาการคิดปกติแสดงว่า
 ท่านอาจแพ้สมุนไพร แต่ดังกล่าวหากดีขึ้นได้อีก
 เพราสมุนไพรไม่ใช่สารเคมีชนิดเดียว เช่นเดียวกับ
 ยาแผนปัจจุบัน ถูกที่จึงไม่รุนแรง (ยกเว้นพอกพืชพิษ
 บางชนิด) อย่างไรก็ตามหากมีอาการแพ้ควรหยุดยา
 สมุนไพรเดี๋ยอก่อน ถ้าหยุดยาสมุนไพรแล้วอาการ
 หายไป แสดงว่าท่านแพ้ยานั้น ควรหยุดและ
 แปลงไปใช้ยาอื่น ถ้าอาการแพ้รุนแรงควรไปรับ
 การรักษาที่สถานีอนามัยโรงพยาบาล

วางแผนเป็นตัวยาระเบียน ใช้ได้ทั้ง ใน راك เค้า
 ตำคั้นน้ำ หรือผึ้นกับน้ำผึ้น น้ำชาเข้าว้า กินเพียง
 สองครั้งก็เห็นผลในการให้ได้มอนพิษ พิษจาก
 ยาจ่าแมลง อาหารเป็นพิษ พิษจากเมมาสูรา
 หรือกินยานอนหลับเกินอัตราส่วนที่แพทย์
 กำหนด

ทั้งนี้ เพราะสรรพคุณของร่างกายจะเปลี่ยน
 กรณีหรือด่างในร่างกายที่เป็นพิษให้เป็นกลาง
 (หมุดฤทธิ์) และเมื่อสารยาของร่างกายดีขึ้นเข้าไป
 ระบบประสาท ในเส้นเลือด ไปประทับกับพิษยา
 หรือสารพิษต่างๆ ในร่างกาย มันจะทำลายพิษ
 เหล่านั้นให้เป็นกลางในเวลาอันรวดเร็ว ไม่เกิน

๔๕ นาที



ชื่อพืชไป	ชื่อวิทยาศาสตร์	การใช้ประโยชน์ของชุมชน
บ่อระเพ็ด	<i>Tinospora crispa</i> (L.) Miers ex Hook.f.&Thomson	เค้า ผลสมุนไพรจัด ฟันกับทันให้พอกในใบแกงและรักษาผลิตภัณฑ์อาหาร เช่น ผักกาด หัวหอม กระเทียม และนิยมผสมในตาน้ำขี้วัวม่วงกับเครื่องปรุง เช่น หัวหอม กะปู กระเทียม ฯลฯ
ตะไคร้		ใบตะไคร้ หัวใต้ภาคควบคุมทั้งต้น ในผักติด ชนิดละ 3 ใบ ในไปแข็ง หรือต้มรวมกัน ดีมีเมื่อมีอาการแก้อาการเรื้อรังมาทุกชนิด เช่น เป็นภูมิแพ้หรือ
หญ้าหากควาย	<i>Eleusine indica</i> (L.) Gaertn.	ใบตะไคร้ หัวใต้ภาคควบคุมทั้งต้น ในผักติด ชนิดละ 3 ใบ ในไปแข็ง หรือต้มรวมกัน ดีมีเมื่อมีอาการแก้อาการเรื้อรังมาทุกชนิด เช่น เป็นภูมิแพ้หรือ
ผักติด	<i>Solanum spirale</i> Roxb.	ใบตะไคร้ หัวใต้ภาคควบคุมทั้งต้น ในผักติด ชนิดละ 3 ใบ ในไปแข็ง หรือต้มรวมกัน ดีมีเมื่อมีอาการแก้อาการเรื้อรังมาทุกชนิด เช่น เป็นภูมิแพ้หรือ

ชื่อพืชไป	ชื่อวิทยาศาสตร์	การใช้ประโยชน์ของชุมชน
ห้อยดาว	<i>Succowia officinalis</i> Linn.	พื้นเมืองเรื้อรังตอนหน้า ลักษณะเป็นราก ลักษณะขาวไม่ใหญ่มาก ตัดสีกลางลักษณะเป็นราก ตัดสีขาว ตามที่จะแล้วนำไปสักกับพื้นดินนา ให้ติด แก้สรรพพิษ (แก้พิษต่างๆ) แก้กันผื่ด (อาการเป็นพิษอย่างรุนแรง) ขับน้ำในร่างกาย ให้อาหารเป็นพิษอย่างรุนแรง แก้ห้องอื้อ
เห็ดพาร์ที	-	เค้า ผลสมุนไพรจัด ดีมีเมื่อมีอาการแก้พิษรุนแรง หรือนำมาพัฒนา成แก้พิษรุนแรง เช่นเมื่อมีอาการแก้ไข้ได้
ผ่องดาวี่	-	เค้า กินสดหรือทาก แก้พิษรุนแรง เมื่อกินจะทำให้อ้วกอกหนา
สูงใบใหญ่	-	ตัน เน่าไฟ และบีบนำไปสุน้ำเชื่อม รักษา
กรดด้าน	<i>Scorodonia dulcis</i> L.	รากหรือหัวต้น ต้มน้ำดื่มน มีอาการกันผื่ด อาการเป็นพิษอย่างรุนแรง น้ำยาให้เจ็บน้ำ 3 รากหรือหัว

ชื่อพืชไป	ชื่อวิทยาศาสตร์	การใช้ประโยชน์ของชุมชน
ฝ่าแป้ง	<i>Solanum erianthum</i> D.Don	พื้นเมืองเรื้อรังตอนหน้า ลักษณะเป็นราก ลักษณะขาวไม่ใหญ่มาก ตัดสีกลาง ลักษณะเป็นราก ตัดสีขาว ตามที่จะแล้วนำไปสักกับพื้นดิน แก้สรรพพิษ (แก้พิษต่างๆ) แก้กันผื่ด (อาการเป็นพิษ) ขับลมในร่างกาย แก้ห้องอื้อ
เครื่องดื่มชา หญ้าดื่มชา	<i>Paederia linearis</i> Hook.f.	พื้นเมืองเรื้อรังตอนหน้า ลักษณะเป็นราก ลักษณะขาวไม่ใหญ่มาก ตัดสีกลาง ลักษณะเป็นราก ตัดสีขาว ตามที่จะแล้วนำไปสักกับพื้นดิน แก้สรรพพิษ (แก้พิษต่างๆ) แก้กันผื่ด (อาการเป็นพิษ) ขับลมในร่างกาย แก้ห้องอื้อ
ฝ่า	<i>Caesalpinia sappan</i> L.	พื้นเมืองเรื้อรังตอนหน้า ลักษณะเป็นราก ลักษณะขาวไม่ใหญ่มาก ตัดสีกลาง ลักษณะเป็นราก ตัดสีขาว ตามที่จะแล้วนำไปสักกับพื้นดิน แก้สรรพพิษ (แก้พิษต่างๆ) แก้กันผื่ด (อาการเป็นพิษ) ขับลมในร่างกาย แก้ห้องอื้อ

การใช้

ใบสด
สำหรับคน 10-12 ใบ

สำหรับวัวควาย 20-30 ใบ

นำใบสดมาตำให้ลักษณะเดียวกันทันทีที่มีอาการ อาจให้กินเข้าได้อีกใน

1/2 - 1 ชั่วโมง ต่อมา

รากสด

สำหรับคน 1-2 องค์เล็ก (ข้อน้ำมือ)

สำหรับวัวควาย 2-4 องค์เล็ก (ข้อน้ำมือ)

นำรากมาบดหรือตำให้เข้ากัน แล้วดีบ้มหัวหมกทันทีที่มีอาการ อาจใช้เข้าได้อีกใน 1/2 - 1 ชั่วโมง ต่อมา

การใช้

ใบ หรือหัวราก เค้า ใบ มาลัดให้สะอาด ตำหรือบีบให้เหลวเอี้ยดผสมกับน้ำขาวข้าว ในกรณีไม่มีน้ำขาวข้าวให้เอาวัวสารมาตำ หรือบีบให้ละเอียดผสมลงในกีดีใช้เข็นกัน คันເອນ้ำดื่มเข้าไปครั้งละ 1 แก้วเดี๋มๆ

ใช้ใบราจรจีด ต้มกินและอาบน้ำ หลังอาบน้ำ อาการผื่นแพ้เก็บทุก處

ชื่อพืช	ชื่อวิทยาศาสตร์	การใช้ประโยชน์ของขุนชน
เบรบีสไทย	<i>Tocca chantieri</i> Andrie	ลำต้น แก้พิษด่างๆ
ว่านหางจระเข้	<i>Boesenbergia</i> sp.	หัวกินสดหรือดันน้ำดื่ม แก้พิษสั่งๆ ได้ดีกว่าวร่าจี้จีด
หลักข่ายหาด	<i>Lycopodium flexuosum</i> (L.) Sw.	ราก นำไปปลูกน้ำดื่ม เป็นยาดองพิษ แก้ไข้อาหาร แก้เป็นพิษอาหารเป็นพิษ
ไฟฟ้า	<i>Zingiber montanum</i> (Zoncini) Link ex Dietr.	หันเดาเครื่องดัดหมา ลำต้นฝาปี๊บ ลำต้นและเปลือก ให้มีลักษณะขาวไม่ใหญ่มาก อัดสีกลาจังลำต้นดึงหัว คาดที่หัว แล้วนำไปตอกกับน้ำในภาชนะ ใช้ดื่ม แก้กระเพทาย (แก้พิษด่างๆ) แก้กินพิษ (อาหารเป็นพิษ) ขับมนในลำไส้ บำรุงธาตุบำรุงกำลัง แก้ห้ออืด
ราชพฤกษ์	<i>Cassia fistula</i> L.	หันเดาเครื่องดัดหมา ลำต้นฝาปี๊บ ลำต้นและเปลือก ให้มีลักษณะขาวไม่ใหญ่มาก อัดสีกลาจังลำต้นดึงหัว คาดที่หัว แล้วนำไปตอกกับน้ำในภาชนะ ใช้ดื่ม แก้กระเพทาย (แก้พิษด่างๆ) แก้กินพิษ (อาหารเป็นพิษ) ขับมนในลำไส้ บำรุงธาตุบำรุงกำลัง แก้ห้ออืด

การใช้

ใบและเลา ครั้งละประมาณ 1 กิโลกรัม ใส่น้ำ 3 ส่วน ดุมเคียงให้เหลือ 1 ส่วน จึงให้ผู้ป่วยกินให้หมดในครั้งเดียว

หากอาการอยู่ในระยะแรกๆ พึงทำให้ผู้ป่วยอาเจียนเสียก่อน จึงทำยานี้ให้กิน

ต้องใช้ยาเร็วที่สุดเท่าที่จำทำได้ จึงจะได้ผลดี ถ้าพิชยาซึมเข้าสู่ร่างกายมากแล้ว หรือหื้งไว้ข้ามคืน ร่างกายจะได้ผลน้อยลง

กินติดต่อ กัน 2-3 วัน

กินเป็นประจำ 2 สปดาท์ต่อครั้ง หรืออย่างน้อยเดือนละครั้ง

!! ผู้มีความดันโลหิตต่ำควรใช้ร่างกายด้วยความระมัดระวัง ผู้ป่วยโรคหอบหืด และหอบหืดต้องครุ่นคิดใช้สารสกัดน้ำจากใบแห้ง ต้องระมัดระวังผลข้างเคียงเรื่อง การกดประสาท หรือระบบไหลเวียนเลือด

ชื่อพืช	ชื่อวิทยาศาสตร์	การใช้ประโยชน์ของขุนชน
สะพานกันตีดจิ้งจอก	<i>Sambucus javanica</i> Reichenb. ex Blume	หัวตัน
เสゴโภ/มะวงวังห้อย	<i>Eudia glomerata</i> Craib	เดาร่างดี ร่างดีดออกแตง รากยอดต้น เนื้อไม้มะวงห้อย ดูดนมดื่ม
ตองสาด	<i>Phrynium pubinerve</i> Blume	เหร้า ต้มรวนกับส้านเพื่อบดและรังดี ดื่มน้ำขาวให้สร้างเมมาหรือขับพิษ
ส้านเพ็บ	<i>Saurauia rousburghii</i> Wall.	กับหืออัน สกัดหือแห้ง ต้มรวนกับตองสาดและรากดี คืนน้ำหัวให้สร้างเมมาหรือขับพิษ
สุวพิษคำ	-	ราก ต้มดื่ม แก้ริดสีดวงทวาร ผลสมบูรณ์หรืออ่อนเป็นกาบที่พิษ
เม่า langeana	<i>Tiliacora triandra</i> (Clethr.) Diels	ใบ นำไปบด ตันน้ำ ผสมน้ำดับบันยาแก้พิษ แก้พิษ

พีชล้างพิษอีนๆ

ชื่อพืช	ชื่อวิทยาศาสตร์	การใช้ประโยชน์ของขุนชน
ยอดิน ยอดปา	<i>Morinda angustifolia</i> Roxb. var. <i>Angustifolia</i>	ราก ต้มน้ำด่มาดนา ล้างร่างกายด่างๆ
คงคง/ไม้เหงือกคน	<i>Helicopis terminalis</i> (Kurz) Steumer	เนื้อใบใช้ห้ามคันข้าว เป็นยาแก้พิษ
หนามแมง/รากจืด ดอกแดง	<i>Thunbergia coccinea</i> Wall. ex D.Don	เจาหรือหัวตัน ต้มน้ำดื่ม ล้างร่างกาย
สังข์หัว	<i>Pseudovaria rugosa</i> (Blume) Merr.	รากนำไปต้มน้ำดื่ม รักษาโรคคีดช่วยล้างร่างกาย และแก้อကeration ร่างกาย
สังข์ใบเขียว	-	รากนำไปต้มน้ำดื่ม รักษาโรคคีดช่วยล้างร่างกาย และแก้อကeration ร่างกาย
หญ้าดัดใบขาว	<i>Sida acuta</i> Burm.f.	รากหรือหัวตัน ให้ต้มกินแก้อาหารเป็นพิษ

ปัจจุบัน มีผลิตภัณฑ์หลายแบบ

1. ชงดื่ม บรรจุในถุงชา คล้ายใบชา

2. ต้มดื่ม ลักษณะ ใบแห้ง เก่าแห้ง

3. เครื่องดื่มสมุนไพรสำเร็จรูป

4. แคปซูล





ต้ม水上น้ำดื่ม หมายถึงต้มสมุนไพร
ที่วายการใส่น้ำพอประมาณหรือสาม
ของปริมาณที่ต้องการใช้
ต้มพอเดือดอ่อนๆ ให้เหลือ 1 ส่วน
จาก 3 ส่วน ข้าวต้ม รับ水上น้ำดื่มตาม

ชง水上น้ำดื่ม หมายถึง
ใส่น้ำเดือดหรือน้ำร้อนจัด
ลงบนสมุนไพร
ที่อยู่ในภาชนะปิดฝ่าทึ่งไว้
สักครู่จะง่ายต่อ



การเจริญเติบโต

เจริญเติบโตรวดเร็ว ถ้าปลูกด้วยเมล็ดจะมีอายุเก็บ
เก็บประมาณ 1 ปี ถ้าปลูกโดยใช้ข้อ母ที่มีรากมีอายุ
เก็บเก็บประมาณ 5-6 เดือน

การเก็บเกี่ยว

ใบ ใช้ใบรงจีดไม่แก่ไปอ่อนกินใบแรก
ราก ให้รากที่มีอายุเกิน 1 ปีขึ้นไป (หากทรงจีดจะมี
ตัวยาวมากกว่าใบ 4-7 เซนติเมตร)
根 ใช้ค่าสันต้นศูนย์กลาง 0.5 เซนติเมตร



การปลูก

หลุมปลูก ขนาด 50x50x30 ซม.
ระยะปลูก 1x1 เมตร
ควรเลือยดออกหรือปุยหมักรองด้านหลุมก่อนปลูก
ตั้งปลูก อาจใช้ตั้งปุ่มหรือค้าใบในขันดินให้ญี่-แข็งแรง
นิยมปลูกในช่วงฤดูฝน ประมาณเดือนมิถุนายนถึง^{กันยายน}
เดือนกรกฎาคม โดยปักชำใบในหลุมที่เตรียมไว้หลุมละ 2-3 ต้น
ถ้ามีการเทาะชำให้ถุงภายในโรงเรือนจะได้ดีทันใหม่ที่มี
ความแข็งแรง

การดูแลรักษา

ในช่วงเริ่มปลูกต้องการการดูแลรักษาและให้น้ำ^{มากๆ}
มากกว่าช่วงอื่น ๆ หลังจากนั้นมีการให้น้ำบ้างในช่วงฤดูแล้ง^{บ้าง}
ก็ต้องดูว่าพืชบ้างเป็นครั้งคราว ให้ปุ๋ยอินทรีย์

รังจีด กับ“เมนูล้างพิษ”

“ผัดถั่วเมล็ดพิษ” หรืออีกชื่อเรียกว่า “ผัดยอดตราเจดิลเป็นน้ำมันหอย”
ส่วนประกอบ ใช้ส่วนของยอด หรือใบอ่อนของ
รังจีด และน้ำมันหอย

“ไข่ปูเมล็ดพิษ” ซึ่งเป็น “ไข่เจียวใส่ต่อทรงจีด”
ส่วนประกอบ คือรังจีด และไข่

“สลัดเพื่อพิษ” อาหารสำหรับผู้ที่เข็นขอบ “สลัดเพื่อ
สุขภาพ”
ส่วนประกอบ ใส่ยอด หรือใบอ่อนรังจีด น้ำส้มสายสักดิ์
และผลของผักชนิดต่างๆ

“น้ำส้มน้ำมะนาว” เป็น “น้ำส้มน้ำมะนาวล้างพิษ”
ส่วนประกอบ หลักๆ ก็มี ในรังจีด ใบเคลือบทอง
และน้ำตาลทราย

มาปลูกทรงจีด กันเถอะ !



สภาพนิเวศน์

มากเจริญเติบโตบริเวณลุ่มน้ำ ริมลำธาร พบรตาม
บริเวณชายป่าดิบชั้นทวีป เจริญเติบโตได้ดีในดินร่วน
ปนทราย
พบทั่วทุกภาคของประเทศไทย ต่างประเทศพบ
ทั่วไปในเขตเทือะหัวระเหวอกาเนียงใต้

การขยายพันธุ์

เทาเมล็ด (แก่ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม)
มีคำแนะนำให้หัตตาระประมาณ 3,000-5,000 ต้น/ไร่
นิยมปักชำเอา โดยตัดลำต้นที่มีตาติดอยู่ 5-6
ตา ยาวประมาณ 20-30 ซม. มาปักช้า

