



ตารางภาคผนวกที่ 1 คุณภาพผลของเสาวรสที่คัดเลือกจำนวน 14 รหัสต้นภายใต้โรงเรือนปิดในปี พ.ศ. 2560 (อัจฉรา และคณะ, 2560)

รหัสต้น	อายุผล (วัน)	น้ำหนักผล (กรัม)	ขนาดผล (ซม.)	TSS (องศาบริกซ์)	ลักษณะเด่น
SG01-9	79.5	125.0	6.38 x 7.32	15.0	ผลทรงไข่ ขนาดผลใหญ่ ผิวผลสีเหลือง เปลือกหนาปานกลาง เนื้อเต็มในผล เนื้อเหลือง
SG02-5	67.2	110.3	6.10 x 6.51	16.7	ทรงผลกลม ผิวผลสีเหลืองอ่อน เนื้อสีเหลืองส้ม
SG02-9	70.3	143.5	6.39 x 6.86	18.4	ทรงผลสามเหลี่ยม ขนาดผลใหญ่ ผิวผลสีเหลือง เปลือกหนาปานกลาง เนื้อเต็มในผล เนื้อสีเหลือง มีกลิ่นหอม
SG03-2	86.3	127.8	6.02 x 6.85	17.8	ทรงผลกลม ผิวผลสีเหลือง เนื้อและน้ำสีเหลือง เนื้อเต็มผล มีกลิ่นหอมคล้ายน้ำผึ้ง
SG03-6	75.6	117.4	6.20 x 6.81	16.5	ผิวผลและเนื้อสีเหลือง เปลือกบาง ทรงผลสามเหลี่ยม
SG04-5	79.0	110.8	6.06 x 6.52	16.4	ทรงสามเหลี่ยม ผิวผลสีเหลือง ขนาดผลใหญ่ เปลือกหนา เนื้อเต็มในผล เนื้อสีเหลืองส้ม
SG04-10	71.0	155.5	7.15 x 7.04	16.3	ทรงสามเหลี่ยม ขนาดผลใหญ่ ผิวผลสีม่วง เปลือกผลบาง เนื้อสีเหลือง มีกลิ่นหอม
SG05-8	87.0	79.0	5.56 x 5.99	19.5	ทรงสามเหลี่ยม ขนาดผลใหญ่ ผิวผลสีเหลือง เปลือกผลหนาปานกลาง เนื้อสีเหลืองส้ม มีกลิ่นหอม หวานมาก
SG07-6	90.0	137.7	6.45 x 6.42	17.2	ผิวผลสีเหลือง เปลือกผลบาง เนื้อสีเหลือง เนื้อผลเต็ม มีปริมาณน้ำมาก หวานอมเปรี้ยว
SG08-4	89.0	115.5	5.97 x 6.75	17.0	ผิวผลสีม่วง เปลือกผลหนาปานกลาง เนื้อสีเหลืองส้ม
SG09-2	75.2	127.2	6.62 x 6.85	17.4	ทรงผลกลม ผิวผลสีเหลือง เปลือกหนาปานกลาง เนื้อเหลืองส้ม
SG09-3	75.3	69.7	5.70 x 5.84	19.0	ทรงผลกลม ผิวผลสีเหลือง ผลมีขนาดเล็ก เปลือกหนาปานกลาง เนื้อเหลืองส้ม หวาน
SG09-4	74.4	111.8	5.85 x 6.42	16.6	ผลทรงไข่ ผิวผลสีเหลือง เปลือกหนา เนื้อสีเหลือง
SG09-6	74.2	88.6	5.71 x 6.70	16.4	ผิวผลสีม่วง มีจุดประที่ผิวผล ทรงผลกลม เนื้อเหลือง หวาน

ตารางภาคผนวกที่ 2 การเปรียบเทียบช่วงการออกดอก ช่วงการเก็บเกี่ยวผล และคุณภาพผลของเสาวรส 14 รหัสต้นที่ปลูกในแปลงโดยใช้ค้างแบบรั้วที่สถานีเกษตรหลวงปางดะ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ (n = 89)

กรรมวิธี	ช่วง ออกดอก	ช่วง เก็บเกี่ยว	อายุผล (วัน)	น้ำหนักผล (กรัม)	ขนาดผล (ซม.)		ความหนา เปลือก (มม.)	เปอร์เซ็นต์ (โดยน้ำหนัก)		ปริมาณน้ำต่อผล (มิลลิลิตร)
					กว้าง	ยาว		เปลือก	เนื้อและน้ำ	
SG01-9	มิ.ย.-ก.ค.2561	ก.ย.-ต.ค.2561	87.0	92.5±34.2	5.85±5.3	6.01±5.5	8.18±3.0	62.32	37.68	34.00±17.2
SG02-5	พ.ค.-มิ.ย.2561	ก.ค.-ก.ย.2561	110.0	114.6±51.1	6.42±12.3	6.54±11.8	5.79±1.4	58.24	41.76	47.33±21.6
SG02-9	พ.ค.-ก.ค.2561	ก.ค.-ก.ย.2561	80.2	115.4±60.0	6.26±14.2	7.15±14.1	7.23±1.0	53.48	46.52	59.67±30.2
SG03-2	มิ.ย.-ส.ค.2561	ส.ค.-ต.ค.2561	79.0	91.14±40.8	6.09±7.7	6.76±3.4	8.97±2.2	69.88	30.12	33.33±26.4
SG03-6	ก.ค.-ส.ค.2561	ก.ย.-ต.ค.2561	75.0	57.78±19.4	5.19±4.9	5.63±4.7	5.42±0.6	63.62	36.38	19.75±5.3
SG04-5	มิ.ย.-ส.ค.2561	ส.ค.-ต.ค.2561	86.0	68.34±28.4	5.12±11.1	5.55±12.3	4.74±2.0	60.74	39.26	25.55±14.3
SG04-10	มิ.ย.-ส.ค.2561	ส.ค.-ต.ค.2561	98.0	63.26±24.9	5.42±5.2	5.85±4.7	5.25±1.2	57.96	42.04	27.75±15.2
SG05-8	มิ.ย.-ก.ค.2561	ก.ย.-ต.ค.2561	115.0	65.83±29.9	4.47±15.5	5.13±17.5	3.65±1.5	62.17	37.83	21.00±15.8
SG07-6	มิ.ย.-ก.ค.2561	ส.ค.-ก.ย.2561	88.0	69.30±25.5	4.82±16.9	5.82±21.4	2.87±0.5	71.58	28.42	12.67±6.4
SG08-4	พ.ค.-ก.ค.2561	ส.ค.-ต.ค.2561	112.0	68.44±25.5	4.85±13.1	5.17±14.2	5.16±1.9	64.68	35.32	25.13±13.6
SG09-2	มิ.ย.-ส.ค.2561	ส.ค.-ต.ค.2561	87.0	64.02±22.6	5.16±8.0	5.55±8.6	5.95±1.9	42.93	57.07	21.76±16.0
SG09-3	มิ.ย.-ก.ค.2561	ส.ค.-ก.ย.2561	93.1	86.9±50.6	4.88±17.5	5.70±18.6	6.06±2.1	68.51	31.49	22.44±20.1
SG09-4	พ.ค.-ก.ค.2561	ก.ค.-ต.ค.2561	102.0	67.59±25.5	5.06±10.2	5.52±11.4	5.98±1.9	67.25	32.75	22.63±14.2
SG09-6	มิ.ย.-ก.ค.2561	ส.ค.-ต.ค.2561	82.0	75.22±29.8	5.41±6.4	6.13±6.7	6.48±0.8	62.28	37.72	33.11±16.4

ตารางภาคผนวกที่ 3 การเปรียบเทียบค่าของสีผิวผล ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำได้ ปริมาณกรดทั้งหมดที่ไตเตรตได้ และสัดส่วนระหว่างปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำได้ต่อปริมาณกรดที่ไตเตรตได้ของผลเสาวรสี 14 รหัสต้นในแปลงโดยใช้ค้ำแบบรื้อที่สถานีเกษตรหลวงปางดะ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ (n = 89)

กรรมวิธี	TSS (องศาบริกซ์)	TA (เปอร์เซ็นต์)	TSS/TA	pH	สีผิว			สีผิวผล	สีเนื้อและน้ำ	จำนวนเมล็ด ต่อผล	ปริมาณผลผลิต (กรัมต่อต้น)
					L*	C	H				
SG01-9	17.48±0.6	2.31±0.7	7.60	3.28	70.75	47.18	86.70	ม่วง เหลือง	ส้ม	113.25±69.0	185
SG02-5	16.60±1.6	1.93±0.5	9.00	3.20	68.89	41.14	86.99	เหลือง	เหลือง ส้มเหลือง	117.00±48.8	573
SG02-9	18.20±2.4	2.79±0.5	6.73	3.10	72.34	46.13	87.76	เหลือง	เหลือง ส้ม	216.83±123.2	385
SG03-2	14.23±3.4	4.07±0.6	3.60	3.06	70.44	47.36	89.07	เหลือง	ส้มเหลือง	109.71±91.4	319
SG03-6	18.40±0.8	2.53±0.4	7.44	3.26	42.76	27.94	30.74	ม่วงแดง	เหลือง	66.63±14.4	665
SG04-5	18.32±1.0	3.18±0.7	5.91	2.94	64.89	41.48	78.45	ม่วงกระ	เหลือง	63.92±43.0	797
SG04-10	18.03±1.5	2.38±0.3	7.65	3.29	40.71	26.65	26.69	ม่วงแดง	เหลือง	82.25±44.4	490
SG05-8	16.80±1.3	2.44±0.3	7.34	2.89	70.22	49.32	86.90	เหลือง	เหลือง	58.40±54.6	593
SG07-6	16.57±0.8	2.66±0.2	6.23	2.50	73.07	49.43	89.77	เหลือง	เหลือง	32.00±6.1	347
SG08-4	16.66±2.0	2.68±0.6	6.52	3.01	61.57	42.02	67.25	ม่วงแดง เหลือง	เหลือง	71.7±44.9	573
SG09-2	17.65±1.8	3.06±0.5	5.83	3.04	69.98	47.07	84.88	เหลือง	ส้ม เหลือง ส้มเหลือง	54.14±45.5	886
SG09-3	17.94±0.6	3.28±0.6	5.59	2.94	71.43	49.58	89.30	เหลือง	เหลือง	81.00±97.9	239
SG09-4	17.28±1.3	2.93±0.9	6.50	3.14	64.31	42.92	73.22	เหลือง ม่วง	เหลือง	65.38±50.7	1,263
SG09-6	16.53±1.7	2.41±0.8	7.29	3.22	61.38	39.95	67.46	เหลือง ม่วง	เหลือง ส้ม	95.94±56.5	647

L* = the lightness factor (value), a* and b* = the chromaticity coordinates, C = Chroma, H = Hue angle

ตารางภาคผนวกที่ 4 การเปรียบเทียบช่วงการออกดอก ช่วงการเก็บเกี่ยวผล และคุณภาพผลของเสาวรส 14 รหัสต้น ที่ปลูกในแปลงโดยใช้ค้างแบบฝืนที่สถานีเกษตรหลวงปางดะ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ (n = 77)

กรรมวิธี	ช่วง ออกดอก	ช่วง เก็บเกี่ยว	อายุผล (วัน)	น้ำหนักผล (กรัม)	ขนาดผล (ซม.)		ความหนา เปลือก (มม.)	เปอร์เซ็นต์ (โดยน้ำหนัก)		ปริมาณน้ำต่อผล (มิลลิลิตร)
					กว้าง	ยาว		เปลือก	เนื้อและน้ำ	
SG01-9	มิ.ย.-ก.ค.2561	ก.ย.-ต.ค.2561	87.3	89.33±34.1	5.95±6.3	6.13±4.9	10.15±1.0	66.88	33.12	26.50±19.0
SG02-5	มิ.ย.-ก.ค.2561	ต.ค.-ธ.ค.2561	115.0	74.72±22.7	5.48±4.5	6.01±3.9	5.50±1.1	48.61	51.39	27.69±12.7
SG02-9	ส.ค.2561	พ.ย.-ธ.ค.2561	79.0	76.25±31.8	5.67±5.4	5.86±4.4	6.18±1.8	57.92	42.08	30.50±15.9
SG03-2	ก.ค.-ส.ค.2561	ก.ย.-ธ.ค.2561	106.1	75.76±32.9	5.71±6.6	5.93±5.2	6.30±1.5	57.35	42.65	31.71±18.0
SG03-6	ก.ค.2561	ก.ย.-ต.ค.2561	87.0	84.06±29.3	5.68±5.3	5.98±5.8	7.15±1.4	58.02	41.98	34.6±17.8
SG04-5	ก.ค.2561	ก.ย.-ต.ค.2561	87.0	84.06±29.3	5.68±5.3	5.98±5.8	7.15±1.4	58.02	41.98	13.00±4.8
SG04-10	มิ.ย.-ก.ค.2561	ส.ค.-พ.ย.2561	103.6	68.82±25.3	5.47±6.5	5.83±5.1	5.79±1.0	62.38	37.62	27.44±13.5
SG05-8*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SG07-6*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SG08-4	มิ.ย.2561	ก.ย.-ธ.ค.2561	114.0	94.80±32.9	5.81±6.7	5.98±6.2	6.70±0.8	61.21	38.79	34.70±12.3
SG09-2	มิ.ย.-ส.ค.2561	ส.ค.-พ.ย.2561	88.3	88.32±28.2	5.88±8.6	6.01±7.9	6.27±1.9	63.56	36.44	32.10±18.7
SG09-3	มิ.ย.-ส.ค.2561	ก.ย.-พ.ย.2561	95.8	93.73±36.3	5.85±5.8	6.50±6.2	7.13±1.1	60.40	39.60	45.87±25.9
SG09-4	มิ.ย.-ส.ค.2561	ส.ค.-พ.ย.2561	100.3	87.15±30.2	5.66±10.9	6.03±10.7	6.65±2.0	66.42	33.58	26.97±15.4
SG09-6	มิ.ย.-ส.ค.2561	ส.ค.-พ.ย.2561	80.4	58.16±18.5	4.65±11.1	5.15±10.3	5.97±2.1	65.60	34.40	20.14±11.4

* ไม่ให้ผลผลิต

ตารางภาคผนวกที่ 5 การเปรียบเทียบค่าของสีผิวผล ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำได้ ปริมาณกรดทั้งหมดที่ไทเทรตได้ และสัดส่วนระหว่างปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำได้ต่อปริมาณกรดที่ไทเทรตได้ของผลเสาวรส 14 รหัสต้นที่ปลูกในแปลงโดยใช้ค้ำแบบพื้นดินที่สถานีเกษตรหลวงปางดะ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ (n = 77)

กรรมวิธี	TSS (องศาบริกซ์)	TA (เปอร์เซ็นต์)	TSS/TA	pH	สีผิว			สีผิวผล	สีเนื้อและน้ำ	จำนวนเมล็ด ต่อผล	ปริมาณ ผลผลิต (กรัมต่อต้น)
					L*	C	H				
SG01-9	13.90±3.5	3.43±1.7	4.51	3.25	68.75	52.25	87.30	เหลือง	ส้มเหลือง	70.25±43.5	536
SG02-5	15.85±2.3	2.90±0.7	5.94	3.06	68.59	50.59	87.04	เหลือง	เหลือง ส้มเหลือง	74.92±38.3	259
SG02-9	18.36±0.9	3.64±0.7	5.18	2.99	72.34	45.01	88.96	เหลือง	เหลือง	73.13±55.9	305
SG03-2	17.46±1.7	3.93±1.4	4.87	3.08	72.44	45.55	86.28	เหลือง	ส้มเหลือง	96.71±70.7	337
SG03-6	18.11±0.5	4.95±1.8	4.01	2.96	73.46	49.19	88.82	เหลือง	เหลือง เหลืองส้ม	101.0±75.0	395
SG04-5	17.33±2.2	4.01±0.8	4.59	3.00	47.60	23.74	46.03	ม่วงกระ	เหลือง	34.0±7.5	357
SG04-10	18.16±1.7	3.17±1.3	5.72	3.72	43.92	27.12	32.77	ม่วงกระ	เหลือง ส้ม เหลืองส้ม	83.07±55.9	1,677
SG05-8*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SG07-6*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SG08-4	17.54±1.2	3.28±0.9	5.73	3.05	70.54	47.94	88.81	เหลือง	เหลือง เหลืองส้ม	106.50±47.4	316
SG09-2	16.57±1.7	3.47±0.1	4.58	3.04	69.49	49.82	86.47	เหลือง	ส้ม เหลือง	90.65±46.2	839
SG09-3	16.70±1.3	4.10±1.0	4.35	3.10	71.19	48.73	88.86	เหลือง	ส้ม	142.27±85.5	895
SG09-4	17.52±1.5	4.78±2.2	4.05	3.91	71.58	49.95	87.39	เหลือง	เหลือง ส้ม	79.03±46.6	1,336
SG09-6	16.81±1.3	4.68±0.8	3.63	2.90	48.08	29.08	43.35	เหลือง ม่วง	เหลือง ส้ม	49.47±34.8	591

* ไม่ให้ผลผลิต

L* = the lightness factor (value), a* and b* = the chromaticity coordinates, C = Chroma, H = Hue angle

ตารางภาคผนวกที่ 6 เกณฑ์การประเมินพันธุ์เสาวรส 14 รหัสต้น

เกณฑ์การประเมิน	ระดับคะแนน				
	1 = น้อยที่สุด	2=น้อย	3=ปานกลาง	4=ดี	5=ดีมาก
อายุผล (วัน)	น้อยกว่า 59	60-69	70-79	80-89	มากกว่า 90
น้ำหนักผล (กรัม)	น้อยกว่า 59.9	60.0-69.9	70.0-79.9	80.0-89.9	มากกว่า 90.0
ขนาดผล (ความกว้างของผล, ซม.)	น้อยกว่า 4.59	4.60-4.99	5.00-5.49	5.50-5.99	มากกว่า 6.00
ความหนาเปลือก (มม.)	มากกว่า 9.1	7.1-9.0	5.1-7.0	3.0-5.0	น้อยกว่า 3.0
เปอร์เซ็นต์เนื้อและน้ำ (%)	น้อยกว่า 39.9	40.0-44.9	45.0-49.9	50.0-54.9	มากกว่า 55.0
TSS (องศาบริกซ์)	น้อยกว่า 14.99	15.0-15.99	16.0-16.99	17.0-17.99	มากกว่า 18.0
TA (%)	มากกว่า 5.0	4.0-4.9	3.0-3.9	2.0-2.9	น้อยกว่า 1.9
TSS/TA	น้อยกว่า 4.9	5.0-5.9	6.0-6.9	7.0-7.9	มากกว่า 8.0
จำนวนเมล็ดต่อผล (เมล็ด)	น้อยกว่า 49.9	50.0-69.9	70.0-89.9	90.0-119.9	มากกว่า 120.0
ปริมาณผลผลิต (กรัม)	น้อยกว่า 499	500.0-699.9	700.0-899.9	900.0-1199	มากกว่า 1200.0

ตารางภาคผนวกที่ 7 ผลการประเมินคุณภาพผลของเสาวรสี จำนวน 14 รหัสต้นในแปลงปลูกกลางแจ้งภายใต้ค้างแบบรื้อและแบบฝืนที่สถานีเกษตรหลวงปางดะ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

รหัสต้น	อายุผล		น้ำหนักผล		ขนาดผล		ความหนาเปลือก		%เปลือกเนื้อและน้ำ		TSS		TA		TSS/TA		จำนวนเมล็ด		ปริมาณผลผลิต		ภาพรวม	คะแนนเฉลี่ย
	รื้อ	ฝืน	รื้อ	ฝืน	รื้อ	ฝืน	รื้อ	ฝืน	รื้อ	ฝืน	รื้อ	ฝืน	รื้อ	ฝืน	รื้อ	ฝืน	รื้อ	ฝืน	รื้อ	ฝืน		
SG01-9	4	4	5	4	4	4	1	1	1	1	4	1	4	3	4	1	5	3	1	1	1	33.0
SG02-5	5	2	5	3	5	3	3	3	2	4	3	2	5	4	5	2	5	3	2	1	1	42.0
SG02-9	4	3	5	3	5	4	2	3	3	2	5	5	4	3	3	2	5	3	1	1	5	41.5
SG03-2	3	5	5	3	5	4	2	3	1	2	1	4	2	3	1	1	4	4	1	1	2	32.0
SG03-6	3	4	1	4	3	4	3	2	1	2	5	5	4	2	4	1	2	4	2	1	2	35.0
SG04-5	5	4	2	4	3	4	2	2	1	2	5	4	3	2	2	1	2	1	3	1	3	33.0
SG04-10	5	5	2	2	3	3	3	3	2	1	5	5	4	3	4	2	3	3	1	5	5	42.0
SG05-8	2	-	2	-	1	-	4	-	1	-	3	-	4	-	4	-	2	-	2	-	1	33.0
SG07-6	4	-	2	-	2	-	5	-	1	-	3	-	4	-	3	-	1	-	1	-	1	32.0
SG08-4	2	2	2	5	2	4	3	3	1	1	3	4	4	3	3	2	3	4	2	1	1	32.5
SG09-2	4	4	2	4	3	4	3	3	5	1	4	3	3	3	2	1	2	4	3	3	1	38.5
SG09-3	5	5	4	5	2	4	3	2	1	1	4	3	3	2	2	1	3	5	1	3	2	35.0
SG09-4	5	5	2	4	3	4	3	3	1	1	4	4	4	2	3	1	2	4	5	5	5	43.0
SG09-6	4	4	3	2	3	2	3	3	1	1	3	3	4	2	4	1	4	1	2	2	5	34.0

เกณฑ์การประเมินการให้คะแนน 1= น้อยที่สุด 2 =น้อย 3=ปานกลาง 4=ดี 5=ดีมาก

ตารางภาคผนวกที่ 8 ช่วงการออกดอกและเก็บเกี่ยวผล ปริมาณผลผลิตและคุณภาพผลของเสาวรสที่คัดเลือก 4 รหัสต้น

กรรมวิธี	ค้าง	ช่วง ออกดอก	ช่วง เก็บเกี่ยว	อายุผล (วัน)	น้ำหนักผล (กรัม)	ขนาดผล (ซม.)		ความหนา เปลือก (มม.)	เปอร์เซ็นต์		TSS (องศาบริกซ์)	TA (%)	TSS/T	จำนวน เมล็ด ต่อผล	ปริมาณผลผลิต ต่อต้น (กรัม)	ลักษณะเด่น
						กว้าง	ยาว		เปลือก	เนื้อ และน้ำ						
SG02-9	รั้ว	พ.ค.-ก.ค. 2561	ก.ค.-ก.ย. 2561	80.2	115.4	6.26	7.15	7.23	53.48	46.52	18.20	2.79	6.73	216.83	385	ทรงผลสามเหลี่ยม ผิวผลสี เหลือง เปลือกหนาปาน กลาง เนื้อเต็มในผล เนื้อสี เหลือง มีกลิ่นหอม
	ฝืน	ส.ค.2561	พ.ย.-ธ.ค. 2561	79.0	76.25	5.67	5.86	6.18	57.92	42.08	18.36	3.64	5.18	73.03	305	
SG04-10	รั้ว	มิ.ย.-ส.ค. 2561	ส.ค.-ต.ค. 2561	98.0	63.26	5.42	5.85	5.25	57.96	42.04	18.03	2.38	7.65	82.25	490	ทรงสามเหลี่ยม ขนาดผล ใหญ่ ผิวผลสีม่วง เปลือกผล บาง เนื้อสีเหลือง มีกลิ่นหอม
	ฝืน	มิ.ย.-ก.ค. 2561	ส.ค.-พ.ย. 2561	103.6	68.82	5.47	5.83	5.79	62.38	37.62	18.16	3.17	5.72	83.07	1677	
SG09-4	รั้ว	พ.ค.-ก.ค. 2561	ก.ค.-ต.ค. 2561	102.0	67.59	5.06	5.52	5.98	67.25	32.75	17.28	2.93	6.5	65.38	1263	ผลทรงไข่ ผิวผลสีเหลือง เปลือกหนา เนื้อเต็มในผล เนื้อสีเหลือง
	ฝืน	มิ.ย.-ส.ค. 2561	ส.ค.-พ.ย. 2561	100.3	87.15	5.66	6.03	6.65	66.42	33.58	17.52	4.78	4.05	79.03	1336	
SG09-6	รั้ว	มิ.ย.-ก.ค. 2561	ส.ค.-ต.ค. 2561	82.0	75.22	5.41	6.13	6.48	62.28	37.72	16.53	2.41	7.29	95.94	683	ผิวผลสีม่วง มีจุดประที่ผิวผล ทรงผลกลม เนื้อเหลือง หวาน
	ฝืน	มิ.ย.-ส.ค. 2561	ส.ค.-พ.ย. 2561	80.4	58.16	4.65	5.15	5.97	65.60	34.40	16.81	4.68	3.63	49.47	591	

