

บทที่ 4

ผลการวิจัยและวิจารณ์ผล

4.1 การศึกษาระบบการปลูกพืชและวิเคราะห์สมบัติดินในแปลงเกษตรกรบนพื้นที่สูง

โดยการรวบรวมและสังเคราะห์ข้อมูลดินในพื้นที่โครงการหลวงและพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง และสำรวจการปลูกพืชและวิเคราะห์สมบัติดินในแปลงเกษตรกรบนพื้นที่สูง ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง จำนวน 5 แห่ง

1) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงพหุพระ

ตั้งอยู่ ตำบลศรีราษฎร์ อำเภอบพพระ จังหวัดตาก มีเนื้อที่ประมาณ 595.44 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 372,772 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลท้าววัน อำเภอแม่สอด และอำเภอเมืองตาก

ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลไมไกรอำเภออุ้มผางและประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมแห่งสหภาพมา

ทิสตะวันออกเฉียง ติดต่อกับ อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร และอำเภอรังเจ้า

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลช่องแคบ ตำบลรวมไทยพัฒนา ตำบลพหุพระ อำเภอพหุพระ

ลักษณะภูมิประเทศ สภาพทั่วไปของภูมิประเทศตำบลศรีราษฎร์ ประกอบด้วยป่าไม้ และเทือกเขาสลับซับซ้อน ซึ่งมีพื้นที่ลาดชันร้อยละ 80 ของพื้นที่ ซึ่งพื้นที่ซึ่งเป็นป่าโปร่ง ป่าดงดิบ แหล่งน้ำสำคัญได้แก่ห้วยแม่ละเมาห้วยอุ้มเยี่ยม น้ำตกป่าห้วย ลักษณะภูมิประเทศ เป็นพื้นที่ลาดชัน เฉลี่ย 10-15% ตั้งอยู่บนที่สูงมีความสูงจากระดับน้ำทะเล 481-1,200 เมตร

ลักษณะดิน ดินในการทำการเกษตร เป็นดินร่วนถึงดินเหนียว มีข้อจำกัดในการใช้ประโยชน์ คือ ในบริเวณที่มีความลาดชัน มีแนวโน้มที่จะเกิดการชะล้างพังทลายของดินได้ง่าย จำเป็นต้องมีการจัดการเกี่ยวกับระบบการปลูกพืชและการอนุรักษ์ดินและน้ำที่เหมาะสม สภาพการใช้ประโยชน์ในปัจจุบันใช้ในการปลูกพืชไร่ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ไม้ผล และไม้ยืนต้น พืชตระกูลถั่วต่างๆ

กลุ่มชุดดินที่สำคัญ 3 กลุ่ม

- กลุ่มชุดดินที่ 29 B มีพื้นที่ ประมาณ 40,000 ไร่ (เหมาะสมกับการปลูกพืชไร่)

- กลุ่มชุดดินที่ 29 C มีพื้นที่ ประมาณ 11,000 ไร่

- กลุ่มชุดดินที่ 62 มีพื้นที่ ประมาณ 643 ไร่

จากการสำรวจและการรวบรวมข้อมูลโดยกรมพัฒนาที่ดิน ลักษณะที่ดินของตำบลศรีราษฎร์ ส่วนใหญ่เป็นดินร่วนถึงดินเหนียว ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

หน่วยแผนที่ 15 มีสภาพเป็นพื้นที่ที่เทือกเขาที่มีความลาดชันมากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์ ขึ้นไปไม่เหมาะสมกับการทำการเกษตร ควรสงวนไว้เป็นป่าธรรมชาติ เพื่อรักษาเป็นแหล่งต้นน้ำ ลำธาร สำหรับพื้นที่เขตตำบล ศรีราษฎร์ มีพื้นที่ เช่นนี้ประมาณ 75 เปอร์เซ็นต์ และมีความสูงเฉลี่ยสูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 800 เมตรขึ้นไป

หน่วยแผนที่ 19 ลักษณะเป็นดินร่วน – เหนียว มีสีน้ำตาลปนเหลือง สีแดง มีวัตถุต้นกำเนิดจากตะกอน ลาน้ำเก่า หรือวัตถุตกค้างจากหินทับถมกำเนิดบนลานน้ำท่วม พื้นผิวเหลืองดำจากการกัดกร่อน ระดับดินลึก สภาพการระบายน้ำดี ดินมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง มีปฏิกิริยาความเป็นกรด-ด่าง ประมาณ 5-7 มีสภาพ พื้นที่ลาดชัน เนินเขา มีระดับความลาดชัน 3-25 เปอร์เซ็นต์ มีข้อจำกัดในการใช้ประโยชน์ คือ ในบริเวณที่มีความลาดชัน มีแนวโน้มที่จะเกิดการชะล้างพังทลายของดินได้ง่าย จำเป็นต้องมีการจัดการเกี่ยวกับระบบการปลูกพืชและการอนุรักษ์ดินและน้ำที่เหมาะสม สภาพการใช้ประโยชน์ในปัจจุบันใช้ในการปลูกพืชไร่ ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ไม้ผล และไม้ยืนต้น พืชตระกูล ถั่วต่างๆ ลักษณะดินชุดนี้มีอยู่ประมาณ 25 เปอร์เซ็นต์

ระบบการปลูกพืช เนื่องจากสภาพการใช้ประโยชน์ในปัจจุบันใช้ในการปลูกพืชที่หลากหลายขึ้นอยู่กับตลาดรับซื้อ ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง มันฝรั่ง พืชผัก (กะหล่ำ ผักกาดขาวปลี ดอกหอม ขาโยเด่ พริกปลูกล้อมข้าวโพด) ถั่วเขียว ถั่วเหลือง ไม้ผล สตรอเบอร์รี่ และพืชตระกูลถั่วต่างๆ ส่วนพืชส่งเสริม ฝรั่ง เสาวรส อาโวคาโด

ข้อมูลผลการวิเคราะห์ดิน

จากการสุ่มเก็บตัวอย่างดินในแปลงของเกษตรกรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงพบพระ จำนวน 12 แปลง จากพืช 5 ชนิด ได้แก่ ข้าวไร่ มะเขือเทศ เสาวรส กะหล่ำปลี และดอกหอมโดยเกษตรกรจะมีการปลูกพืชหมุนเวียนในแปลง พบว่า ดินจาก 12 ตัวอย่าง มีความเป็นกรดรุนแรงมาก กรดจัดมาก จนถึงกรดปานกลาง (4.41-5.6) ปริมาณอินทรีย์วัตถุในดินสูงมาก (3.55-5.89%) ปริมาณไนโตรเจนในดินสูงมาก (0.18-0.29%) ความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวก อยู่ในระดับต่ำถึงปานกลาง (12.31-22 meq/100g) ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในระดับปานกลาง ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ต่ำจนถึงสูงมาก (3.82-123 mg/kg) โดยมีปริมาณต่ำและปานกลางในแปลงที่ปลูกข้าวไร่ ส่วนแปลงที่ปลูกผักและไม้ผลมีปริมาณสูง ปริมาณโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้สูงมาก (104-300 mg/kg) ปริมาณแคลเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับต่ำมากถึงต่ำ (44-442 mg/kg) ซึ่งมีแปลงนายไพบูลย์ แซ่ซ่ง ที่ปลูกกะหล่ำปลี และนายประจักษ์ ลิปะกายพร ที่ปลูกมะเขือเทศ ที่แคลเซียมอยู่ในระดับปานกลาง ปริมาณแมกนีเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ต่ำมากถึงต่ำ (12.9-132 mg/kg) ยกเว้นแปลงนายไพบูลย์ แซ่ซ่ง ที่อยู่ในระดับปานกลาง (124 mg/kg) เนื้อดินเป็นดินเหนียวถึง 12 ตัวอย่าง

การจัดกลุ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน ดินจะอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนใหญ่ดินมีความเป็นกรดจัด ซึ่งมีปัญหาในการดูดใช้ธาตุอาหารของพืช และปริมาณแคลเซียม แมกนีเซียมที่ต่ำ ในทุกแปลงที่เก็บตัวอย่างซึ่งควรได้รับการจัดการ เบื้องต้นแนะนำให้จัดการดินโดยใช้โดโลไมท์หรือยิปซัม เพื่อเพิ่ม pH ให้เป็นประโยชน์ต่อการดูดใช้ธาตุอาหารพืช และการใช้โดโลไมท์ยังช่วยเพิ่มธาตุแคลเซียมและแมกนีเซียมในดิน



แปลงปลูกข้าวโพดเหลืองด้วยพริก



แปลงปลูกมันฝรั่ง



แปลงปลูกดอกหอม



แปลงปลูกชาโยเด



แปลงปลูกผักกาดขาวปลี



แปลงปลูกมันสำปะหลัง

ภาพที่ 1 สภาพพื้นที่แปลงปลูกพืชของเกษตรกรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบพพระ

ตารางที่ 1 แสดงผลวิเคราะห์ดินในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงพหุพระ

ลำดับ	เกษตรกร	ชนิดพืช	pH	OM	N	CEC	P	K	Ca	Mg	Texture
				(%)		meq/100 g		mg/kg			
1	นายเล้ง แซ่กือ	ดอกหอม	4.41	4.2	0.21	13.25	84.3	171	148	12.9	Clay
2	นายชาติ วิจิตชัยเจริญ	ดอกหอม	4.6	4.41	0.22	21.9	22.96	300	336	49.42	Clay
3	นายสี รักษ์แม่ละเมา	ข้าวไร่	4.8	5.31	0.27	15.13	11.54	104	118	38.37	Clay
4	นายปรีชา รักษ์แม่ละเมา	ข้าวไร่ (จะปลูกถั่ว)	4.97	5.89	0.29	22	26.9	234	442	50.95	Clay
5	นายสมชาย แซ่มี	ข้าวไร่	5.14	4.77	0.24	17.3	3.82	185	516	91	Clay
6	นายเทห์ แซ่มี	ข้าวไร่	5.52	4.9	0.24	18.89	4.31	307	973	108	Clay
7	นายใหม่ สิปะกายพร	มะเขือเทศ	4.42	5.27	0.26	18.99	61.08	164	44	9.44	Clay
8	นายไพบูลย์ แซ่จั้ง	กะหล่ำปลี	5.41	3.55	0.18	18.24	123	198	1,633	124	Clay
9	นายสมหมาย แซ่ลี	กะหล่ำปลี	4.8	5.24	0.26	18.14	30.35	218	327	55.25	Clay
10	นายชูชัย สิปะกายพร	เสาวรส	4.92	4.62	0.23	12.31	38.74	141	340	29.24	Clay
11	นายประจักษ์ สิปะกายพร	เสาวรส	4.78	5.13	0.26	15.13	26.4	160	235	23.2	Clay
12	นายประจักษ์ สิปะกายพร	มะเขือเทศ	5.6	4.05	0.2	15.89	27.32	293	1,418	132	Clay

2) พื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่รูปแบบโครงการหลวงผาหิ้ง-ศรีคีรีรักษ์

ที่อยู่ ขอบเขตของโครงการพัฒนาพื้นที่รูปแบบโครงการหลวงผาหิ้ง - ศรีคีรีรักษ์ พิจารณาโดยใช้ขอบเขต หมู่บ้านเป็นเกณฑ์ครอบคลุมพื้นที่ 2 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านผาหิ้ง หมู่ที่ 6 และบ้านศรีคีรีรักษ์ หมู่ 11 ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก มีพื้นที่ 197.22 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 123,263.53 ไร่ โดยมีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ โกล่เคียงดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับบ้านวังเย็น หมู่ที่ 8 และบ้านวังทอง หมู่ที่ 4 ตำบลนาโบลด์ อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก

ทิศใต้ ติดต่อกับแขวงเจ้า บ้านโละโค๊ะ ตำบลโกล่สัมพิ อำเภโกล่สัมพินคร จังหวัดกำแพงเพชร

ทิศตะวันออก ติดต่อกับบ้าน ตะเคียนงาม ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมืองตาก และตำบลศรีสวรรค์ อำเภอพบพระ

ลักษณะภูมิประเทศ

บ้านผาหิ้ง ตั้งอยู่ที่พิกัด X 506822 Y 1831136 ระดับความสูง 510 เมตร จากระดับทะเลปานกลาง และบ้านศรีคีรีรักษ์ ตั้งอยู่ที่พิกัด X 513579 Y 1829467 ระดับความสูง 998-2,609 เมตร จากระดับทะเลปานกลาง พื้นที่ร้อยละ 67.87 อยู่ในระดับความสูงตั้งแต่ 500 - 1,000 เมตรจากระดับน้ำทะเล มีพื้นที่ 83,664.42 ไร่ ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่ปลูกข้าวโพด และมี ระดับความลาดชันของพื้นที่ส่วนใหญ่เกินร้อยละ 35 เปอร์เซนต์ มีพื้นที่ 57,306.74 ไร่ คิดเป็น ร้อยละ 46.94 ของพื้นที่ทั้งหมด ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการชะล้างและ การเสื่อมโทรมของที่ดิน ทำให้ส่งผลกระทบต่อความอุดมสมบูรณ์ ของดิน

ลักษณะดิน ลักษณะดินส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชุดดินที่ 62 เป็นพื้นที่ลาดชันเชิงซ้อน (Slope Complex) คิดเป็นร้อยละ 96 เป็นดินหน่วยผสมของพื้นที่ที่มีความลาดชัน ชับซ้อน ดินกลุ่มนี้ประกอบด้วยพื้นที่ภูเขา ซึ่งมีความลาดชันมากกว่าร้อยละ 35 ดินที่พบในบริเวณดังกล่าวนี้มีทั้งดินลึกและดินตื้น ลักษณะของเนื้อดินและความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติแตกต่างกันไปแล้วแต่ชนิดของหินต้นกำเนิดในบริเวณนั้น มักมีเศษหิน ก้อนหิน หรือหินพื้นผิว กระจายอยู่ทั่วไป สภาพดินเป็นดินทรายผสมดินลูกรัง ดินกลุ่มนี้มีความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ำเนื่องจากอยู่ในบริเวณที่มีความลาดชันสูงมาก ในพื้นที่ทำการเกษตรจะเกิดการชะล้างพังทลายสูญเสียหน้าดินอย่างรุนแรง ขาดแคลนน้ำและบางพื้นที่อาจพบชั้นหินพื้นหรือเศษหินกระจายอยู่บริเวณหน้าดิน ควรมีการใช้ประโยชน์ที่ดินในเชิงอนุรักษ์หรือวนเกษตร ในบริเวณพื้นที่ที่เป็นดินลึกและสามารถพัฒนาแหล่งน้ำได้ มีระบบอนุรักษ์ดินและน้ำเช่น ปลูกพืชคลุมดิน ทำแนวรั้วหญ้าแฝก และชุดหลุมปลูกเฉพาะต้น โดยไม่มีการทำลายไม้พื้นล่าง ร้อยละ 96.73 ที่เหลือเป็นดินชุด 44 กลุ่มดินทรายหนาที่เกิดจากตะกอนลำน้ำหรือตะกอนเนื้อหยาบ ปฏิกิริยาดินเป็นกรดเล็กน้อยถึงเป็นกลาง การระบายน้ำค่อนข้างมาก ความอุดมสมบูรณ์ต่ำ พื้นที่ส่วนใหญ่มีระดับการชะล้างพังทลายของดินในระดับน้อย 2-5/ ตัน/ตร.กม./ปี คิดเป็นร้อยละ 53.26 รองลงมาเป็นการชะล้างพังทลายของดินระดับปานกลาง (ที่สูง) 5-12 ตัน/ตร.กม./ปี คิดเป็นร้อยละ 37.15 การชะล้าง พังทลายของดินระดับน้อยมาก (ที่สูง) 0-2 ตัน/ตร.กม./ปี คิดเป็นร้อยละ 7.13 และ การชะล้างพังทลายของดินระดับ รุนแรงมาก (ที่สูง) >20 ตัน/ตร.กม./ปี คิดเป็นร้อยละ 2.49

กลุ่มดินในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงผาตั้ง-ศรีศรียักษ์

รหัส	กลุ่มดิน	พื้นที่		ร้อยละ
		ตารางกิโลเมตร	ไร่	
44	ดินชุดปากช่องประเภทที่เป็นพื้นที่ลูกคลื่น ลอนลาด	6.45	4,031.01	3.27
62	พื้นที่ลาดชันเชิงซ้อน	190.77	119,232.52	96.73
รวม		197.22	123,263.53	100.00

ระบบการปลูกพืชในพื้นที่ โดยส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่ดอน มีการปลูกพืชไร่ โดยเฉพาะข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ซึ่งเป็นพืชหลักที่สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร รองลงมาเป็นมันสำปะหลัง ถั่วเขียว ถั่วลิสง กล้วยน้ำว้า พริกชี้ฟ้า กระชายดำ ถั่ว หิวง เป็นต้น และข้าวไร่ ซึ่งข้าวไร่จะปลูกไว้สำหรับบริโภค ส่วนพืชส่งเสริม ประกอบไปด้วย เสาวรส อาโวคาโด พักทองญี่ปุ่น ถั่วขาว

ข้อมูลผลการวิเคราะห์ดิน

จากการสุ่มเก็บตัวอย่างดินในแปลงของเกษตรกรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ผาตั้ง-ศรีศรียักษ์ จำนวน 11 แปลง จากพืช 6 ชนิด ได้แก่ อุ่น เสาวรส อาโวคาโด ข้าวโพด มันสำปะหลัง และแตงกวาญี่ปุ่น พบว่า ดินเป็นกรดจัดมากถึงกลาง โดยส่วนใหญ่เป็นกรดปานกลางถึงกลาง (5.6-7.3) ปริมาณอินทรีย์วัตถุในดินสูง (2.66-3.94%) ปริมาณไนโตรเจนในดินสูง (0.13-0.27%) ความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวก อยู่ในระดับต่ำมากถึงปานกลาง (8.37-19.55 meq/100g) ขางมีค่าสูงในแปลงของนายจาวหัว แซ่เล่า ที่ปลูกอาโวคาโด ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์สูงจนถึงสูงมาก (19.08-1226.09 mg/kg) โดยมีปริมาณปานกลางในแปลงที่ปลูกมันสำปะหลังสลับข้าวโพด ส่วนแปลงที่ปลูกไม้ผลมีปริมาณสูงมาก ปริมาณโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้สูงมาก (134.6-371.25mg/kg) ปริมาณแคลเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลางถึงสูง (1,212.5-3,952.5 mg/kg) ซึ่งมีแปลงนายธนกร แซ่ว่าง ที่ปลูกอุ่น นายชาติชาย แซ่ว่าง ที่ปลูกเสาวรสและอุ่น นายศักดิ์ชัย แสงสว่าง ที่ปลูกแตงกวาญี่ปุ่น ที่แคลเซียมอยู่ในระดับต่ำมากและต่ำ ปริมาณแมกนีเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ต่ำถึงปานกลาง (69.7-294 mg/kg) ยกเว้นแปลงนายกิตติ แสงสว่าง ที่อยู่ในระดับสูง (425.88 mm/kg) และนายจาวหัว แซ่เล่า ที่อยู่ในระดับสูงมาก (1,036.9 mm/kg) เมื่อดินตั้งแต่ดินร่วนเหนียวปนทราย ดินร่วนเหนียว จนถึงดินเหนียว

การจัดกลุ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน ดินส่วนใหญ่มีความอุดมสมบูรณ์ปานกลางจนถึงสูง แต่พบว่า บางแปลงที่จำเป็นต้องมีการจัดการ ได้แก่แปลงของนายธนกร ที่จะปลูกอุ่น ดินเป็นกรดจัดมากปริมาณอินทรีย์วัตถุ และไนโตรเจนปานกลาง และปริมาณแคลเซียมต่ำมาก โดยการปรับ pH และเพิ่มปริมาณอินทรีย์วัตถุ



สภาพพื้นที่ทำการเกษตรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงผาแดง-ศรีคีรีรักษ์



สภาพพื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์



สภาพพื้นที่ปลูกมันสำปะหลัง



สภาพพื้นที่ปลูกเสาวรส



สภาพพื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และกล้วย

ภาพที่ 2 สภาพพื้นที่แปลงปลูกพืชของเกษตรกรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงผาแดง-ศรีคีรีรักษ์

ตารางที่ 2 แสดงผลวิเคราะห์ดินในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงผาผึ้ง-ศรีศรีรักษ์

ลำดับ	เกษตรกร	ชนิดพืช	pH	OM	N	CEC	P	K	Ca	Mg	Texture
				(%)	(%)	meq/100 g			mg/kg		
1	นายธนกร แซ่ว่าง	องุ่น	4.68	2.1	0.11	12.88	18.36	119	352	120	Clay
2	นายกิตติ แสงว่าง	เสาวรส และองุ่น	6.04	2.72	0.14	18.71	144	175	2,091	425	Clay Loam
3	นายชาติชาย แซ่ว่าง	เสาวรส และองุ่น	5.67	2.73	0.14	8.37	99.28	134	837	69.7	Sandy Clay loam
4	นายต้อง แสงว่าง	เสาวรส และองุ่น	6.32	3.34	0.17	15.42	32.61	361	1,608	203	Clay
5	นายธนกร	เสาวรส เดิมปลูกข้าวโพด	6.07	3.22	0.16	19.55	18.36	371	1,757	163	Clay
6	โรงเรียนศรีศรีรักษ์	เสาวรส	6.8	5.35	0.27	13.16	1,226	286	2,281	259	Sandy Clay loam
7	นายจواهر แซ่เล่า	เสาวรส	7.02	3.61	0.18	17.3	175	240	2,556	294	Clay Loam
8	นายจواهر แซ่เล่า	อาโวคาโด	7.31	3.94	0.2	33.84	461	283	3,952	1,036	Clay Loam
9	นางพิกุล แซ่ลี	ข้าวโพด	5.55	3.36	0.17	12.97	23.19	142	1,212	116	Clay Loam
10	นายเยี่ย แสงสว่าง	มันสำปะหลังสับข้าวโพด	5.81	2.79	0.14	11.94	13.53	154	1,249	174	Clay
11	นายศักดิ์ชัย แสงสว่าง	แตงกวาญี่ปุ่น	5.6	2.66	0.13	15.89	19.08	236	873	149	Clay

3) พื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยน้ำขาว

พื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยน้ำขาว ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1 ตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ตั้งอยู่ระหว่างพิกัด 714071 E 1864417 N มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ประมาณ 500-1,200 เมตร อยู่ในลุ่มสาขาลุ่มน้ำวังทอง ลุ่มหลักลุ่มน้ำน่านพื้นที่หมู่บ้านส่วนใหญ่อยู่ในเขตชั้นคุณภาพ ลุ่มน้ำ 3 และมีพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงเหนืออยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า หมู่บ้านมีพื้นที่ประมาณ 78 ตารางกิโลเมตร หรือ 48,718 ไร่ พื้นที่อยู่อาศัยและทำการเกษตรไม่มีเอกสารสิทธิ์ และมีปัญหาหน้าดินถูกชะล้างพังทลาย อยู่ห่างจากอำเภอเขาค้อ 33 กิโลเมตร ตั้งอยู่ในเขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ

มีอาณาเขตติดต่อดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเพชรบูรณ์

ทิศใต้ ติดต่อกับ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อำเภอนครไทย จังหวัดเพชรบูรณ์

พืชอาหารหลักคือ ข้าวไร่ ซึ่งจะมีหลากหลายพันธุ์ ส่วนพืชที่สร้างรายได้ คือกะหล่ำปลี ซึ่งใน 1 ปี จะปลูกในฤดูฝนและหนาว ทั้งนี้ขึ้นกับสภาพพื้นที่และแหล่งน้ำ นอกจากนี้งานส่งเสริมของสำนักพัฒนาได้ สนับสนุนและถ่ายทอดองค์ความรู้ในการปลูกผักในโรงเรือน ได้แก่ มะเขือเทศ พริกหวาน ผักอินทรีย์ ส่วนไม้ ผล ได้แก่ มีเสาวรส อาโวคาโด เป็นต้น

ข้อมูลผลการวิเคราะห์ดิน

จากการสุ่มเก็บตัวอย่างดินในแปลงของเกษตรกรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงห้วยน้ำขาวจำนวน 13 แปลง จากพืช 5 ชนิด ได้แก่ กะหล่ำปลี ข้าวไร่ ข้าวโพด ถั่วหวาน และถั่วลิ้นเต่า พบว่า ดินจาก 13 ตัวอย่าง มีความเป็นกรดรุนแรงมาก จนถึงกรดจัดมาก (4.47-5.06) ปริมาณอินทรีย์วัตถุในดินสูง (1.69-3.39%) ปริมาณไนโตรเจนในดินปานกลางจนถึงสูงมาก (0.1-0.25%) ความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวก อยู่ในระดับต่ำมากถึงปานกลาง (8.74-20.40 meq/100g) ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในระดับต่ำ ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ต่ำจนถึงสูงมาก (6.08-1,030 mg/kg) โดย ปริมาณโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ปานกลางถึงสูงมาก (78.58-255 mg/kg) ปริมาณแคลเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับต่ำมากถึงต่ำ (125-811.50 mg/kg) ซึ่งมีแปลงนายสุทิน ศักดิ์เจริญชัยกุล ที่ปลูกกะหล่ำปลี ที่แคลเซียมอยู่ในระดับปานกลาง ปริมาณแมกนีเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ต่ำมากถึงต่ำ (27.87-107.75 mg/kg) ยกเว้นนางดาว แซ่ย่าง ที่ปลูกกะหล่ำปลี และแปลงปลูกข้าวไรzenองนางจ่อ ศักดิ์เจริญชัยกุล และนางยุวพา ศักดิ์เจริญชัยกุล ที่อยู่ในระดับปานกลาง เนื้อดินที่พบจะเป็นดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง ดินเหนียวปนทราย จนถึงดินเหนียว

การจัดกลุ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน ดินส่วนใหญ่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำถึงปานกลาง เนื่องจากดินค่อนข้างเป็นกรดจัด ปริมาณอินทรีย์วัตถุและไนโตรเจนปานกลาง และแคลเซียมแมกนีเซียมที่อยู่ในระดับต่ำ ซึ่งแปลงที่มีปัญหาที่ต้องมีการจัดการ คือแปลงของนางจ่งเย้ ซึ่งเดิมเป็นพื้นที่ปลูกข้าวโพด แล้วจะนำไปปลูก

ผัก เนื่องจากดินเป็นกรดจัดมากปริมาณอินทรีย์วัตถุปานกลาง ไนโตรเจนปริมาณแคลเซียมและแมกนีเซียมต่ำ ดังนั้นควรปรับ pH โดยใช้โดโลไมท์ ซึ่งจะช่วยให้เพิ่มแคลเซียมและแมกนีเซียมให้แก่ดิน และควรเพิ่มปริมาณอินทรีย์วัตถุ โดยใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก หรือปลูกพืชตระกูลถั่วสลับกับปลูกผัก



สภาพพื้นที่ปลูกกะหล่ำปลี



สภาพพื้นที่ปลูกข้าวไร่



สภาพพื้นที่ปลูกมะเขือเทศในโรงเรือน

ภาพที่ 3 สภาพพื้นที่แปลงปลูกพืชของเกษตรกรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยน้ำขาว

ตารางที่ 3 แสดงผลวิเคราะห์ดินในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยน้ำขาว

ลำดับ	เกษตรกร	ชนิดพืช	pH	OM	N	CEC	P	K	Ca	Mg	Texture
				(%)		meq/100 g			mg/kg		
1	นายธนากร ศักดิ์พิการเจริญกุล	กะหล่ำปลี	4.47	3.38	0.17	16.36	185	218	790	82.2	Clay
2	นายจำ ศักดิ์เจริญชัยกุล	กะหล่ำปลี	4.5	2.75	0.14	9.87	133	202	228	57.95	Clay Loam
3	นายสมชาย 1	กะหล่ำปลี	4.54	3.39	0.17	12.97	31.76	204	270	37.49	Clay
4	นายสมชาย 2	กะหล่ำปลี	4.64	2.89	0.14	10.06	35.28	159	210	38.92	Sandy Clay
5	นายสุทิน ศักดิ์เจริญชัยกุล	กะหล่ำปลี	4.67	4.19	0.25	20.4	1,030	243	1,232	107	Clay
6	นายศักดิ์ดา แซ่สง	กะหล่ำปลี	4.72	3.22	0.16	13.91	51.14	245	514	44.86	Clay Loam
7	นางดาว แซ่ย่าง	กะหล่ำปลี	4.87	2.56	0.13	13.44	6.08	219	477	134	Clay
8	นายจือควั ว่องปรีชญากุล	ข้าวไร่	4.47	2.83	0.14	9.87	31.16	78.58	125	27.87	Clay
9	นางวันเพ็ญ	ข้าวไร่	4.64	2	0.1	11.37	24.15	238	248	67.55	Sandy Loam
10	นายจ่อ ศักดิ์เจริญชัยกุล	ข้าวไร่	4.93	2.77	0.14	20.21	22.22	218	811	168	Clay
11	นางยุวพา ศักดิ์เจริญชัยกุล	ข้าวไร่	5.06	3.04	0.15	12.78	21.5	255	584	176	Clay
12	นายจือควั ว่องปรีชญากุล	ถั่วหวาน + ถั่วสันดา	4.72	2.1	0.1	11	21.19	151	166	30.16	Clay Loam
13	นายจงเมย์ ศักดิ์ศิลากุล	ข้าวโพด (จะปลูกผัก)	4.89	1.69	0.08	8.74	29.79	189	407	55.9	Sandy Clay loam

4) พื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยก้างปลา

พื้นที่โครงการห้วยก้างปลา มีพื้นที่ 39.98 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 24,987 ไร่ ลักษณะทั่วไปเป็นที่ราบสลับภูเขา และเทือกเขาสูงชัน มีความลาดชันระหว่าง 20-60 เปอร์เซ็นต์ สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางระหว่าง 600-1,050 เมตรมีแม่น้ำจันไหลผ่าน

ขนาดที่ตั้ง บ้านห้วยก้างปลา หมู่ที่ 15 ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย อยู่ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติดอยบ่อ มีเนื้อที่ประมาณ 5,000 ไร่ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พิจารณาเห็นว่าพื้นที่ดังกล่าวมีลักษณะโดดเด่น ทางธรรมชาติที่สวยงาม เพื่อเป็นการสงวนคุ้มครองพื้นที่ให้อยู่ตลอดไป เพื่อประโยชน์เป็นแหล่งศึกษาวิจัยค้นคว้า และ เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน และเพื่อรักษามรดกของระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนความหลากหลายทางชีวภาพ

อาณาเขตติดต่อ

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลท่าสุด ตำบลบ้านดู่ ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลท่าตอน อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงใหม่ และประเทศสหภาพเมียนมาร์

ลักษณะภูมิประเทศ เป็นที่ราบสลับภูเขา และเทือกเขาสูงชัน ทอดตัวยาวแนวเหนือ-ใต้ พื้นที่ลาดเอียงไปทางทิศเหนือ มีความลาดชันระหว่าง 20-60 เปอร์เซ็นต์ สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางระหว่าง 458-1,151 เมตร มีแม่น้ำจันไหลผ่าน

ลักษณะดิน โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยก้างปลา มีแหล่งน้ำผิวดินที่สำคัญในพื้นที่มีดังนี้ น้ำแม่จันไหลผ่านทางตอนเหนือของพื้นที่ มีทิศการไหลจากตะวันตกไปทางตะวันออกไปที่รวมของลำห้วยต่าง ๆ ในพื้นที่ ได้แก่ ห้วยก้างปลา มีต้นกำเนิดมาจากเสาธง ทางทิศใต้ของพื้นที่ มีทิศการไหลไปทางทิศเหนือ ไหลผ่านบ้านห้วยก้างปลา ก่อนไหลวกไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือลงส่งน้ำแม่จันที่บ้านห้วยยาโน ห้วยก้างปลา มีลำห้วยสาขาได้แก่ ห้วยเอี้ย ห้วยปุมต้นกำเนิดมาดอยบ่อ ทางทิศใต้ของพื้นที่ มีทิศการไหลไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือแล้วไหลวกกลับไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือผ่านบ้านห้วยปู้ แล้วไหลลงน้ำแม่จัน

ทรัพยากรดิน กลุ่มชุดดิน โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยก้างปลา มีหน่วยแผนที่ดินซึ่งเป็นกลุ่มดินกว้าง ๆ ดังนี้

กลุ่มชุดดินที่ 15 ที่มีเนื้อดินเป็นดินร่วนเหนียวหรือดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง ดินบนมีสีน้ำตาลปนเทา ปฏิกริยาดินเป็นกรดปานกลางถึงเป็นกลาง pH 6.0-7.5

กลุ่มชุดดินที่ 30D เนื้อดินเป็นดินเหนียว พบบริเวณพื้นที่ภูเขาเป็นส่วนใหญ่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางตั้งแต่ 500 เมตรขึ้นไป สีดินเป็นสีแดง มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลาง ปฏิกริยาดินเป็นกรดแก่ถึงเป็นกรดเล็กน้อย pH 5.5-6.5

กลุ่มชุดดินที่ 48C เนื้อดินเป็นส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย ส่วนดินล่างเป็นดินร่วนเหนียวปนเศษหินหรือปน กรวด ก่อนกรวดขนาดใหญ่เป็นหินกลมมน มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่ำ ระดับน้ำใต้ดินอยู่ลึกกว่า 2 เมตร ตลอดปี pH 5.0-7.0

กลุ่มชุดดินที่ 48D/29D หน่วยดินผสม เนื้อดินบนส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย ส่วนดินล่างเป็นดินร่วนเหนียวปนเศษหินหรือปนกรวด ก้อนกรวดขนาดใหญ่เป็นหินกลมมน มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่ำ ระดับน้ำใต้ดินอยู่ลึกกว่า 2 เมตร pH 5.0-7.0 และเนื้อดินเป็นดินเหนียว ดินมีสีน้ำตาลเหลือง หรือแดง เกิดจากวัตถุต้นกำเนิดดินพวกตะกอนลำน้ำ มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติค่อนข้างต่ำ pH 4.5-5.5

กลุ่มชุดดินที่ 5 เนื้อดินเป็นดินเหนียว ดินบนมีสีเทาแก่ น้ำตาลปนเทา ดินล่างมีสีเทาอ่อนหรือสีเทาดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติค่อนข้างต่ำถึงปานกลาง pH 5.5-6.5 แต่ถ้าดินมีก้อนปูนปะปนในดินชั้นล่าง ดินชั้นนี้มี pH 7.5-8.0

กลุ่มชุดดินที่ 52D(52C) หน่วยดินผสม เนื้อดินเป็นดินเหนียว สีดินเป็นสีน้ำตาลหรือแดง ในดินชั้นล่าง ระดับความลึกต่ำ 50 ซม.ลงไปจะพบหินผุ มีการระบายน้ำดีถึงดีปานกลาง pH 6.0-7.5 ความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลางหรือเนื้อดินเป็นดินเหนียว สีดินเป็นสีน้ำตาลหรือแดง ในดินชั้นล่างระดับความลึกต่ำ 50 ซม.ลงไปจะพบหินผุ มีการระบายน้ำดีถึงดีปานกลาง ค่าความเป็นกรดประมาณ 6.0-7.5 มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลาง

กลุ่มชุดดินที่ 6 เนื้อดินเป็นดินเหนียว ดินบนมีสีเทาแก่ ดินล่างมีสีน้ำตาลปนเทาหรือสีเทา มีจุดประสีน้ำตาลหรือสีแดงตลอดชั้นดินบางแห่งมีศิลาแลงอ่อน ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่ำหรือค่อนข้างต่ำ pH 4.5-5.5

กลุ่มชุดดินที่ 62 ประกอบด้วยพื้นที่ภูเขาและเทือกเขาที่มีความลาดชันมากกว่า 35 % เป็นดินลึกและต้น ลักษณะดิน และความอุดมสมบูรณ์แตกต่างกันตามแต่ชนิดของหินต้นกำเนิด มีเศษหินก้อนหินหรือหินพื้นโผล่ ยังปกคลุมด้วยป่าไม้ต่างๆ มักมีการทำไร่เลื่อนลอยที่ขาดการอนุรักษ์

กลุ่มดิน โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยก้างปลา

กลุ่มชุดดิน	พื้นที่		ร้อยละ
	ตารางกิโลเมตร	ไร่	
กลุ่มชุดดินที่ 15	0.24	151.55	0.61
กลุ่มชุดดินที่ 30D	0.13	78.95	0.32
กลุ่มชุดดินที่ 48C	1.86	1,165.62	4.66
กลุ่มชุดดินที่ 48D/29D	0.12	73.63	0.29
กลุ่มชุดดินที่ 5	2.20	1,372.86	5.49
กลุ่มชุดดินที่ 52D(52C)	0.55	344.94	1.38
กลุ่มชุดดินที่ 6	0.49	306.09	1.23
กลุ่มชุดดินที่ 62	34.39	21,493.10	86.02
รวม	39.98	24,986.74	100.00

การใช้ประโยชน์ที่ดิน การวิเคราะห์ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ใช้ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยวิธีการแปลงข้อมูลจากภาพถ่ายทางอากาศปี 2545 มาตราส่วน 1:4,000 พบว่าพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงเป็นพื้นที่ป่าไม้ ร้อยละ 79.48 พื้นที่ เกษตรกรรม ร้อยละ 13.87 พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง ร้อยละ 4.40 พื้นที่เบ็ดเตล็ด ร้อยละ 1.40 และพื้นที่แหล่งน้ำร้อยละ 0.85

การใช้ประโยชน์ที่ดินปี2545โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยกังปลา

การใช้ประโยชน์ที่ดิน	พื้นที่		ร้อยละ
	ตารางกิโลเมตร	ไร่	
พื้นที่เกษตรกรรม	5.54	3,465.53	13.87
ที่นา	0.89	556.45	2.23
พืชไร่	1.44	902.82	3.61
ที่ไม่ผล/ไม่ยืนต้น	1.28	802.77	3.21
พื้นที่การเกษตรอื่น	0.04	27.51	0.11
ที่รกร้างว่างเปล่า	1.88	1,175.99	4.71
พื้นที่ป่าไม้	31.77	19,859.01	79.48
ป่าไม้	31.77	19,859.01	79.48
พื้นที่เบ็ดเตล็ด	0.56	350.10	1.40
ป่าละเมาะ	0.56	350.10	1.40
พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง	1.76	1,099.57	4.40
พื้นที่อื่นนอกการเกษตร	1.61	1,003.82	4.02
ถนน	0.15	95.76	0.38
แหล่งน้ำ	0.34	212.57	0.85
รวม	39.98	24,986.79	100.00

พืชที่เกษตรกรปลูกในพื้นที่ ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ข้าวไร่ ข้าวนา หวาย สับปะรด ขิง ผักอินทรี และไม้พืชมะพร้าวได้แก่ เสาวรส องุ่น จากการสอบถามเกษตรกรส่วนใหญ่ไม่ได้มีการปรับปรุงบำรุงดินมีการใช้ที่ดินอย่างต่อเนื่องในทุกปี แปลงที่เคยปลูกพืชข้าวหลายปีส่งผลทำให้ผลผลิตไม่ดี ส่วนการใช้ปุ๋ยขึ้นกับกำลังในการซื้อของเกษตรกรและชนิดพืช



สภาพพื้นที่ปลูกข้าวโพดของเกษตรกร



สภาพพื้นที่ปลูกข้าวนาของเกษตรกร



สภาพพื้นที่ปลูกหนุ่ยของเกษตรกร

สภาพพื้นที่ปลูกสับปะรดของเกษตรกร

ภาพที่ 4 สภาพพื้นที่แปลงปลูกพืชของเกษตรกรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยก้งปลา



สภาพพื้นที่ปลูกข้าวไร่ของเกษตรกร

ภาพที่ 4 (ต่อ) สภาพพื้นที่แปลงปลูกพืชของเกษตรกรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยก้งปลา

ข้อมูลผลการวิเคราะห์ดิน

จากการสุ่มตัวอย่างดินในแปลงของเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวงพัฒนาพื้นที่สูงห้วยก้งปลา จำนวน 5 แปลง จากพืช 4 ชนิด ได้แก่ ข้าวโพด เสาวรส สับปะรด และ พืชเป็นกรดจัดมาก (4.54-5.03) ปริมาณอินทรีย์วัตถุในดินปานกลางจนถึงสูง (1.76-3.83%) ปริมาณไนโตรเจนในดินปานกลางถึงสูงมาก (0.1-0.19%) ความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวก อยู่ในระดับต่ำมากถึงปานกลาง (6.86-15.89 meq/100g) ซึ่งมีแปลงนายกร ที่ปลูกข้าวโพดและเสาวรส ที่อยู่ในระดับปานกลาง ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ต่ำมาก จนถึงสูง (2.53-22.61 mg/kg) โดยมีปริมาณต่ำและต่ำมากในแปลงที่ปลูกผลไม้ ส่วนแปลงที่ปลูกข้าวโพดมี ปริมาณสูง ปริมาณโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ปานกลางถึงสูงมาก (64.6-359.75 mg/kg) ปริมาณแคลเซียม ที่แลกเปลี่ยนได้ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับต่ำมากถึงต่ำ (143.4-589 mg/kg) ปริมาณแมกนีเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ต่ำ มากถึงต่ำ (41.72-166.41 mg/kg) เนื้อดินที่พบจะเป็นดินร่วนเหนียวปนทราย ดินร่วนปนทราย และดินเหนียวปนทราย

การจัดกลุ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน ดินส่วนใหญ่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำถึงปานกลาง เนื่องจากดินค่อนข้างเป็นกรดจัดมาก ปริมาณอินทรีย์วัตถุและไนโตรเจนปานกลาง และฟอสฟอรัสต่ำแคลเซียมและแมกนีเซียมต่ำมาก ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของพืช โดยเฉพาะเสาวรส แปลงของนายกร ที่มีธาตุอาหารในดินต่ำมาก อีกทั้งดินค่อนข้างเป็นทราย จึงต้องมีการจัดการในการบำรุงดินและการใช้ปุ๋ยให้เหมาะสมกับสภาพดิน

ตารางที่ 4 แสดงผลวิเคราะห์ดินในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยกังปลา

ลำดับ	เกษตรกร	ชนิดพืช	pH	OM	N	CEC	P	K	Ca	Mg	Texture
				(%)	(%)	meq/100 g			mg/kg		
1	นายกร	ข้าวโพด	4.54	2.93	0.15	15.42	8.17	306	306	119	Sandy Clay
2	นายทรงพล ชื่นมหาชัย	ข้าวโพด	4.74	1.76	0.09	6.86	22.61	64.6	589	67.8	Sandy loam
3	นายกร	เสาวรส	4.84	2.09	0.1	8.74	2.53	182	143	41.72	Sandy Clay loam
4	นายกร	สับปะรด	4.9	3.7	0.19	15.89	4.08	359	443	166	Sandy Clay loam
5	นายอาเจื้อะ ผลอเมี้ยะ	หวาย	5.03	3.83	0.19	11.56	4.17	216	181	85.7	Sandy Clay

5) พื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางหินฝน

สภาพทั่วไป

ขนาดที่ตั้ง หมู่บ้านปางหินฝน หมู่ที่ 10 เป็น 1 ในจำนวน 14 หมู่บ้าน ของตำบลปางหินฝน อยู่ห่างจากตัวอำเภอ แม่แจ่ม 26 กิโลเมตร หมู่บ้านปางหินฝนอยู่ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่แจ่ม ซึ่งกันออกจากเขตอุทยานแห่งชาติแม่อือ เมื่อปี 2548 มีพื้นที่ 25 ตารางกิโลเมตร คิด เป็น 15,625 ไร่ พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตลุ่มน้ำชั้น 1 B และชั้น 2

ลักษณะภูมิประเทศ เป็นภูเขาและที่ราบเชิงเขา มีความสูงระหว่าง 900-1,400 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง เกษตรกรทำการเกษตรบริเวณเชิงเขาและที่ราบเชิงเขา

ลักษณะดิน ดินมีความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างสูง มี ลักษณะเป็นดินร่วนซุย มีพืชพรรณขึ้นปกคลุมทั่วไป

การประกอบอาชีพ ประชาชนหมู่บ้านปางหินฝน มีอาชีพหลัก คือ เกษตรกรรม โดยทำไร่และทำนาเพียงเป็นหลัก การ ประกอบอาชีพในฤดูแล้งมีน้อยมาก เช่น การปลูกผัก และการปลูกไม้ผล อาชีพรองลงไป คือการทอผ้า และรับจ้าง ส่วนการเลี้ยงสัตว์ก็เลี้ยงไว้บริโภคและมีการขายภายในหมู่บ้านเท่านั้น

การใช้ประโยชน์ที่ดิน ประชาชนใช้พื้นที่โดยแบ่งเป็นที่อยู่อาศัยประมาณ 1,495 ไร่ พื้นที่ทำการเกษตรประมาณ 13,600 ไร่ พื้นที่ทำนาประมาณ 1,300 ไร่ พื้นที่ทำไร่ประมาณ 7,350 ไร่ และพื้นที่ทำสวนประมาณ 2,370 ไร่ โดยใช้ในการปลูก พืช ได้แก่ ข้าวโพด ข้าวไร่ ข้าวนา พืชผัก เช่น กะหล่ำปลี ขาวปลี มันฝรั่ง หอมแดงมะเขือเทศ และกาแฟ ต่อเนื่องกัน ทุกปี

ข้อมูลผลการวิเคราะห์ดิน

จากการสุ่มเก็บตัวอย่างดินในแปลงของเกษตรกรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงปางหินฝน จำนวน 6แปลง จากพืช 3 ชนิด ได้แก่ มะเขือเทศ หอมญี่ปุ่น และกะหล่ำปลี พบว่า ดินเป็นกรดรุนแรงมาก กรดจัดมาก กรดปานกลาง จนถึงกรดเล็กน้อย (4.02-6.26) ปริมาณอินทรีย์วัตถุในดินปานกลางจนถึงสูงมาก (2.11-4.98 %) ปริมาณไนโตรเจนในดินปานกลางจนถึงสูงมาก (0.11-0.25 %) ความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวกอยู่ในระดับปานกลาง (12.22-23.22 meq/100g) ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์สูงมาก (213.04-1,243.48 mg/kg) ปริมาณโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้สูงมาก (145.58-443.5 mg/kg) ปริมาณแคลเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับต่ำ (414.35-728.5 mg/kg) ซึ่งมีแปลงนายสุรโชค ที่ปลูกมะเขือเทศ ที่แคลเซียมอยู่ในระดับต่ำมาก (125.3mg/kg) แปลงนางสุรดา ชูขุนชนะพงศ์ และนายหล้า ขวัญใจชาวดอย ที่ปลูกหอมญี่ปุ่น ที่แคลเซียมอยู่ในระดับปานกลางจนถึงสูง ปริมาณแมกนีเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ต่ำถึงปานกลาง (46.48-300.63 mg/kg) ยกเว้นแปลงนายสุรโชค ที่อยู่ในระดับต่ำมาก (19.75 mm/kg) เนื้อดินที่พบจะเป็นดินร่วนเหนียวปนทราย ดินร่วนเหนียว และดินเหนียว

การจัดกลุ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน มีความอุดมสมบูรณ์ปานกลางถึงสูง ส่วนใหญ่เป็นดินที่ใช้ปลูกพืชผัก มีปริมาณฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมในดินมีปริมาณสูงมาก อาจเนื่องจากมีการใช้ปุ๋ยเคมีติดต่อกันเป็นระยะเวลานานทำให้ยังมีตกค้างอยู่ในดิน



แปลงปลูกกะหล่ำปลี



แปลงปลูกมะเขือเทศ



แปลงปลูกหอมญี่ปุ่นที่ดอน



แปลงปลูกหอมญี่ปุ่นหลังปลูกข้าวนา

ภาพที่ 5 สภาพพื้นที่แปลงปลูกพืชของเกษตรกรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางหินฝน

ตารางที่ 5 แสดงผลวิเคราะห์ดินในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางหินฝน

ลำดับ	เกษตรกร	ชนิดพืช	pH	OM	N	CEC	P	K	Ca	Mg	Texture
				(%)	(%)	meq/100 g			mg/kg		
1	นายสุรโชค	มะเขือเทศ	4.02	4.98	0.25	16.54	352	268	125	19.75	Clay Loam
2	นายพะสะเว กิตติเดชอมร	หอมญี่ปุ่น	4.56	2.47	0.12	12.22	1,243	145	499	67.95	Sandy Clay loam
3	นายยงยุทธ พูลสมมาตร	กะหล่ำปลี	4.64	4.6	0.23	17.3	1,178	164	414	46.48	Clay
4	นายเลอดี กิตติเดชอมร	หอมญี่ปุ่น	4.69	2.11	0.11	20.4	213	443	728	103	Clay
5	นางสุรดา ชูภูชนะพงศ์	หอมญี่ปุ่น	5.89	3.52	0.18	17.39	494	369	1,988	273	Clay Loam
6	นายหล้า ขวัญใจขาวดอย	หอมญี่ปุ่น	6.26	3.9	0.2	23.22	1,091	352	2,017	300	Clay Loam

4.2 การทดสอบเทคโนโลยีการฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดิน

โดยแบ่งตามลักษณะสภาพดินเสื่อมโทรมที่เป็นปัญหาในการปลูกพืชบนพื้นที่สูง 4 กลุ่ม ดังนี้ 1) กลุ่มพื้นที่ที่มีความลาดชัน ดินเสื่อมโทรม มีการตัดถางและเผาก่อนปลูก 2) กลุ่มพื้นที่ที่มีลักษณะดินทรายและมีหินปน 3) กลุ่มพื้นที่ที่มีความลาดชัน มีการเผา ใช้สารเคมีและปลูกข้าวโพดติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน 4) กลุ่มพื้นที่ที่ปลูกพืชผักและใช้ที่ดินติดต่อกันแบบเข้มข้น โดยดำเนินการต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ.2561-2563)

4.2.1 กลุ่มพื้นที่ที่มีความลาดชัน ดินเสื่อมโทรม มีการตัดถางและเผาก่อนปลูก

พื้นที่ดำเนินงาน : พื้นที่ปลูกข้าวไร่ 2 แห่ง

1. โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่ฮ่อง อ.ท่าสองยาง จ. ตาก
2. โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่ละอ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

ทดสอบเทคโนโลยีการฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดินในพื้นที่ปลูกข้าวไร่ที่เหมาะสมกับพฤติกรรม การปลูกข้าวไร่ของเกษตรกรบนพื้นที่สูง ในการแก้ปัญหาดินเสื่อมโทรมและผลผลิตต่ำ ดำเนินการร่วมกับ เกษตรกร 4 ราย

โดยได้วางแผนการทดสอบดังนี้

กรรมวิธี/ แปลงที่	ปีที่ 1	ปีที่ 2	ปีที่ 3
1	control ข้าวไร่ตามวิธีของเกษตรกร	control ข้าวไร่ตามวิธีของเกษตรกร	control ข้าวไร่ตามวิธีของเกษตรกร
2	ข้าวไร่ + ระบบอนุรักษ์ดิน และน้ำ+ ถั่วลันเตา	ข้าวไร่ + ระบบอนุรักษ์ดิน และน้ำ+ ถั่วลันเตา	ข้าวไร่ + ระบบอนุรักษ์ดิน และน้ำ+ ถั่วลันเตา
3	ระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ+ ถั่วเขียวแดง	ข้าวไร่ + ระบบอนุรักษ์ดินและ น้ำ	ระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ+ ถั่วเขียวแดง
4	ระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ + ถั่วดำ	ข้าวไร่ + ระบบอนุรักษ์ดิน และน้ำ	ระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ + ถั่วดำ

1) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่ฮ่อง อ.ท่าสองยาง จ. ตาก

1.1) ผลวิเคราะห์คุณสมบัติดินก่อนการทดสอบเทคโนโลยีการฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดินในพื้นที่พื้นที่ที่มีความลาดชัน ดินเสื่อมโทรม มีการตัดถางและเผาก่อนปลูกพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่ฮ่อง

ผลการวิเคราะห์ดินจากบริเวณป่าชุมชนของหมู่บ้านยะแปะ และจากแปลงของเกษตรกรที่จะปลูกข้าวไร่ ในปี 2561 จำนวน 3 ตัวอย่าง พบว่า ดินบริเวณป่าชุมชน มีความเป็นกรดรุนแรงมาก (4.41) ปริมาณอินทรีย์วัตถุในดินสูงมาก (5.17%) ปริมาณไนโตรเจนในดินสูงมาก (0.26%) ความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวก อยู่ในระดับปานกลาง (16.83 meq/100g) ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์อยู่ในระดับต่ำมาก (2.77 mg/kg) ปริมาณโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้สูงมาก (135.71 mg/kg) ปริมาณแคลเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ อยู่

ในระดับต่ำมาก (20.63 mg/kg) ปริมาณแมกนีเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ต่ำมาก (26.68 mg/kg) เนื้อดินเป็นดินเหนียว ผลวิเคราะห์ดินในแปลงปลูกข้าวไร่ของเกษตรกร พบว่า ดินเป็นกรดจัดมากถึงกรดจัด (4.69-5.11) ปริมาณอินทรีย์วัตถุในดินสูง (2.99-3.14%) ปริมาณไนโตรเจนในดินสูง (0.15-0.16%) ความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวก อยู่ในระดับต่ำถึงปานกลาง (14.95-16.17 meq/100g) ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์อยู่ในระดับต่ำมากถึงเพียงพอ (2.55-10.68mg/kg) ปริมาณโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้สูงมาก (170-245 mg/kg) ปริมาณแคลเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ต่ำมาก (52.93-351 mg/kg) ปริมาณแมกนีเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ต่ำ (40.63-71.35 mg/kg) เนื้อดินเป็นดินเหนียว (ตารางที่ 6)

ตารางที่ 6 ผลวิเคราะห์ดินพื้นที่ลาดชัน ดินเสื่อมโทรม มีการตัดถางและเผาก่อนปลูก (ข้าวไร่) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่ฮ่องสอน

ลำดับ	เกษตรกร	pH	OM	N	CEC	P	K	Ca	Mg	Texture
			(%)		meq/100 g			mg/kg		
1	ป่าชุมชนบ้านเยนแปะ	4.41	5.17	0.26	16.83	2.77	135	20.63	26.68	Clay
2	ยงยุทธ ศิริชมรม	4.69	2.99	0.15	16.17	10.68	245	351	71.35	Clay
3	สุวิทย์ ไพโรภาวิ	5.11	3.14	0.16	14.95	2.550	170	52.93	40.63	Clay

1.2) ผลการทดสอบเทคโนโลยีการฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดินในสภาพพื้นที่ลาดชัน ดินเสื่อมโทรม มีการตัดถางและเผาก่อนปลูก (ข้าวไร่) ของโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่ฮ่องสอน

โดยมีเกษตรกรร่วมทดสอบ 2 ราย ได้แก่ นายยงยุทธ ศิริชมรม และนายสุวิทย์ ไพโรภาวิ โดยมีขนาดพื้นที่แปลงทดสอบ ดังตารางที่ 7 จากการเก็บข้อมูลผลผลิตข้าวไร่แปลงนายยงยุทธ พบว่า กรรมวิธีที่ 1 ที่ปลูกข้าวไร่ ให้ผลผลิตข้าวไร่ 280 กก./ไร่ ในขณะที่กรรมวิธีที่ 2 ที่ปลูกข้าวไร่ร่วมกับถั่วลันเตา ให้ผลผลิตข้าวไร่ 436 กก./ไร่ และให้ผลผลิตถั่วลันเตา 7.22 กก./ไร่ กรรมวิธีที่ 3 ให้ผลผลิตถั่วลิสงนางแดง จำนวน 39.38 กก./ไร่ และกรรมวิธีที่ 4 ให้ผลผลิตถั่วดำ 23.8 กก./ไร่ (ตารางที่ 8) ส่วนแปลงทดสอบของนายสุวิทย์ พบว่า กรรมวิธีที่ 1 ที่ปลูกข้าวไร่ ให้ผลผลิตข้าวไร่ 251 กก./ไร่ ในขณะที่กรรมวิธีที่ 2 ที่ปลูกข้าวไร่ร่วมกับถั่วลันเตา ให้ผลผลิตข้าวไร่ 338 กก./ไร่ และให้ผลผลิตถั่วลันเตา 4.9 กก./ไร่ กรรมวิธีที่ 3 ให้ผลผลิตถั่วลิสงนางแดง จำนวน 27.45 กก./ไร่ และกรรมวิธีที่ 4 ให้ผลผลิตถั่วดำ 37.25 กก./ไร่ (ตารางที่ 9) จากข้อมูลดังกล่าว พบว่าการปลูกข้าวไร่ร่วมกับถั่วลันเตาให้ผลผลิตข้าวมากกว่าแปลงปลูกข้าวไร่เพียงอย่างเดียว ซึ่งการศึกษาในปีต่อไปจะปลูกข้าวไร่ในทุกกรรมวิธีเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงของคุณสมบัติดินและผลผลิตข้าวไร่ต่อไป

ตารางที่ 7 ขนาดพื้นที่แปลงทดสอบการฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดิน (ข้าวไร่) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่ฮ่องสอน

แปลงทดสอบ/กรรมวิธี	ขนาดพื้นที่แปลงทดสอบ (ไร่)	
	นายยังยุทธ ศิริชมรม	นายสุวิทย์ ไพโรภากวี
1. ข้าวไร่	3.08	2.74
2. ข้าวไร่+ถั่วลลิต	0.55	0.51
3. ถั่วเขียวนางแดง	0.67	0.51
4. ถั่วดำ	0.75	0.51

ตารางที่ 8 แสดงข้อมูลผลผลิตข้าวไร่และถั่วจากแปลงทดสอบนายยังยุทธ ศิริชมรม

กรรมวิธี	ผลผลิตข้าวไร่		ผลผลิตถั่วลลิต		ผลผลิตถั่วเขียวนางแดง		ผลผลิตถั่วดำ	
	กก./พื้นที่	กก./ไร่	กก./พื้นที่	กก./ไร่	กก./พื้นที่	กก./ไร่	กก./พื้นที่	กก./ไร่
1. ข้าวไร่	862	280						
2. ข้าวไร่+ถั่วลลิต	241	436	4	7.22				
3. ถั่วเขียวนางแดง					26.5	39.38		
4. ถั่วดำ							18	23.8

ตารางที่ 9 แสดงข้อมูลผลผลิตข้าวไร่และถั่วจากแปลงทดสอบนายสุวิทย์ ไพโรภากวี

กรรมวิธี	ผลผลิตข้าวไร่		ผลผลิตถั่วลลิต		ผลผลิตถั่วเขียวนางแดง		ผลผลิตถั่วดำ	
	กก./พื้นที่	กก./ไร่	กก./พื้นที่	กก./ไร่	กก./พื้นที่	กก./ไร่	กก./พื้นที่	กก./ไร่
1. ข้าวไร่	690	251						
2. ข้าวไร่+ถั่วลลิต	172.5	338.21	2.5	4.9				
3. ถั่วเขียวนางแดง					14	27.45		
4. ถั่วดำ							19	37.25



ภาพที่ 6 แปลงทดสอบการฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดินในแปลงข้าวไร่
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สอง



เมล็ดถั่วลลวด



เมล็ดถั่วดำ



เมล็ดถั่วลิสงแดง

ภาพที่ 7 ผลผลิตถั่วจากแปลงทดสอบการฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดินในแปลงปลูกข้าวไร่

2) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่ละลอ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

2.1) ผลวิเคราะห์คุณสมบัติดินก่อนการทดสอบเทคโนโลยีการฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดินในพื้นที่ปลูกข้าวไร่พื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่ละลอ

ผลการวิเคราะห์ดินจากบริเวณป่าชุมชนของหมู่บ้านใหม่พัฒนา และจากแปลงของเกษตรกรที่จะปลูกข้าวไร่ ในปี 2561 จำนวน 3 ตัวอย่าง พบว่า ดินบริเวณป่าชุมชนเป็นกลาง (6.7) ปริมาณอินทรีย์วัตถุในดินสูงมาก (6.49%) ปริมาณไนโตรเจนในดินสูงมาก (0.32%) ความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวก อยู่ในระดับปานกลาง (24.06 meq/100g) ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ต่ำ (5.89 mg/kg) ปริมาณโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้สูงมาก (464 mg/kg) ปริมาณแคลเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ อยู่ในระดับปานกลาง (2,596 mg/kg) ปริมาณแมกนีเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ อยู่ในระดับสูง (633 mg/kg) เนื้อดินเป็นดินเหนียว ผลวิเคราะห์ดินในแปลงปลูกข้าวไร่ของเกษตรกร พบว่า ดินเป็นกรดรุนแรงมากถึงกรดจัด (4.34-5.2) ปริมาณอินทรีย์วัตถุในดินปานกลางถึงสูง (1.8-2.83%) ปริมาณไนโตรเจนในดินปานกลางถึงสูง (0.09-0.14%) ความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวก อยู่ในระดับต่ำถึงปานกลาง (10.62-19.74 meq/100g) ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์อยู่ในระดับปานกลาง (10.04-11.4 mg/kg) ปริมาณโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้สูงมาก (127-377 mg/kg) ปริมาณแคลเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ อยู่ในระดับต่ำมากถึง (21.43-454 mg/kg) ปริมาณแมกนีเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ ปานกลางถึงต่ำมาก (223-19.7 mg/kg) เนื้อดินเป็นดินเหนียวและดินเหนียวปนทรายแป้ง


ตารางที่ 10 ผลวิเคราะห์ดินพื้นที่ลาดชัน ดินเสื่อมโทรม มีการตัดถางและเผาก่อนปลูก (ข้าวไร่)

โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่ละลอ

ลำดับ	เกษตรกร	pH	OM	N	CEC	P	K	Ca	Mg	Texture
			(%)		meq/100 g				mg/kg	
1	ป่าชุมชน บ้านใหม่พัฒนา	6.47	6.49	0.32	24.06	5.89	464	2,596	633	Clay
2	นางผ่องพรรณ คุณานุสรณ์กุล	4.34	1.8	0.09	10.62	11.4	127	21.43	19.7	Silty Clay
3	นางวดี ธาณีพัฒนาอริญ	5.2	2.83	0.14	19.74	10.04	377	454	223	Clay

2.2) ผลการทดสอบเทคโนโลยีการฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดินในสภาพพื้นที่ลาดชัน ดินเสื่อมโทรม มีการตัดทางและไถก่อนปลูก (ข้าวไร่) ของโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่ละออ

มีเกษตรกรร่วมทดสอบ 2 ราย ได้แก่ นางผ่องพรรณ คุณานุสรณ์กุล และนางวอติ ธาณิพัฒนาภรณ์ จากการเก็บข้อมูลผลผลิตข้าวไร่ร่วมกับถั่วลออด แปลงนางผ่องพรรณให้ผลผลิตข้าวไร่ 650 กก./ไร่ ผลผลิตถั่วลิ้วนางแดง จำนวน 193 กก./ไร่ และผลผลิตถั่วดำ 155 กก./ไร่ แปลงนางวอติให้ผลผลิตข้าวไร่ 381 กก./ไร่ ผลผลิตถั่วลิ้วนางแดง จำนวน 173 กก./ไร่ และผลผลิตถั่วดำ 90 กก./ไร่ ซึ่งทั้ง 2 แปลง ไม่สามารถเก็บข้อมูลผลผลิตถั่วลออดได้ เนื่องจากเกษตรกรไม่ได้ปลูกถั่วลออดพร้อมกับปลูกข้าวไร่ ซึ่งเกษตรกรปลูกหลังจากปลูกข้าวไร่ไปประมาณ 2 เดือน อีกทั้งเมล็ดพันธุ์ถั่วลออดไม่ค่อยดี จึงให้ผลผลิตต่ำ



ภาพที่ 8 แปลงทดสอบการฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดินในแปลงข้าวไร่
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่ละออ

4.2.2 กลุ่มพื้นที่ที่มีลักษณะดินทรายและมีหินปน

พื้นที่ดำเนินงาน พื้นที่ปลูกมันสำปะหลังในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงคลองลาน ซึ่งตั้งอยู่ในเขต อ.ชาณุวรลักษณ์ จ.กำแพงเพชร

ทดสอบเทคโนโลยีการฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดินในพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังเพื่อปรับปรุงบำรุงดินสำหรับใช้ปลูกพืชทางเลือกอื่น ดำเนินการร่วมกับเกษตรกร 2 ราย ดังนี้

1. นายโท จะตะ
2. นางอรชร เป้าทอง

แบ่งการทดสอบเป็น 5 กรรมวิธี ดังนี้

กรรมวิธีที่ 1 แปลงควบคุม ปลูกมันสำปะหลังวิธีของเกษตรกร

กรรมวิธีที่ 2 ปลูกมันสำปะหลังร่วมกับถั่วเขียว

กรรมวิธีที่ 3 ปลูกมันสำปะหลังร่วมกับถั่วลิสง

กรรมวิธีที่ 4 ปลูกมันสำปะหลังร่วมกับถั่วพราง

กรรมวิธีที่ 5 ปลูกมันสำปะหลังร่วมกับถั่วดำ (ตัดถั่วคลุมดินหลังปลูก 45 วัน)

หมายเหตุ : ปลูกถั่วหลังปลูกมันสำปะหลัง 1 – 2 เดือน (หลังฉีดพ่นยาคุมหญ้า)

ผลวิเคราะห์คุณสมบัติดินก่อนการทดสอบเทคโนโลยีการฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดินในพื้นที่ปลูกมันสำปะหลัง พื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงคลองลาน

ผลการวิเคราะห์ดินจากบริเวณป่าอนุรักษ์ในบริเวณบ้านปางมะละกอ และจากแปลงเกษตรกรที่ปลูกมันสำปะหลัง จำนวน 3 ตัวอย่าง (ตารางที่ 11) พบว่า ดินจากป่าอนุรักษ์ มีความเป็นกรดปานกลาง (5.98) ปริมาณอินทรีย์วัตถุในดินปานกลาง (2.39%) ปริมาณไนโตรเจนในดินปานกลาง (0.12%) ความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวกอยู่ในระดับต่ำ (6.2 meq/100g) ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์อยู่ในระดับต่ำ (3.28mg/kg) ปริมาณโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ปานกลาง (87.53mg/kg) ปริมาณแคลเซียมที่แลกเปลี่ยนได้อยู่ในระดับต่ำ (724 mg/kg) ปริมาณแมกนีเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ปานกลาง (124 mg/kg) เนื้อดินเป็นดินร่วนเหนียวปนทราย ผลวิเคราะห์ดินในแปลงปลูกมันสำปะหลังของเกษตรกร พบว่า มีความเป็นกรดปานกลาง (5.97-5.99) ปริมาณอินทรีย์วัตถุในดินต่ำ (0.9-1.23%) ปริมาณไนโตรเจนในดินต่ำ (0.05-0.06%) ความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวก อยู่ในระดับต่ำมาก (4.23-5.85 meq/100g) ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์อยู่ในระดับต่ำ (3.09-3.13mg/kg) ปริมาณโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ปานกลาง (66.83-88.2 mg/kg) ปริมาณแคลเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ อยู่ในระดับต่ำ (430-639 mg/kg) ปริมาณแมกนีเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ต่ำ (52.25-105 mg/kg) เนื้อดินเป็นดินร่วนเหนียวปนทรายและดินร่วนปนทราย ซึ่งจากผลวิเคราะห์ดินที่ปลูกมันสำปะหลังเป็นระยะเวลานาน มีปัญหาเรื่องความอุดมสมบูรณ์ของดิน มีปริมาณอินทรีย์วัตถุ ความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวก ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ แคลเซียมที่แลกเปลี่ยนได้และปริมาณแมกนีเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ต่ำ อีกทั้งดินยังเป็นดินทรายและมีหินปน

ตารางที่ 11 ผลวิเคราะห์ดิน พื้นที่ที่มีลักษณะดินทรายและมีหินปน (มันสำปะหลัง)
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงคลองลาน

ลำดับ	เกษตรกร	pH	OM	N	CEC	P	K	Ca	Mg	Texture
			(%)		meq/100 g				mg/kg	
1	ป่าอนุรักษ์	5.98	2.39	0.12	6.2	3.28	87.53	724	124.85	Sandy Clay loam
2	นายโท จะตะ	5.99	1.23	0.06	5.85	3.13	66.83	639	105	Sandy Clay loam
3	นางอรชร เป้าทอง	5.97	0.9	0.05	4.23	3.09	88.2	430	52.25	Sandy loam

ผลการทดสอบเทคโนโลยีการฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดินในสภาพพื้นที่ที่มีลักษณะดินทราย และมีหินปน (มันสำปะหลัง) ของโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงคลองลาน

จากการทดสอบเทคโนโลยีในการฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดินในแปลงมันสำปะหลัง โดยเลือกใช้ ชนิดถั่วเพื่อปลูกฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดินหลังจากปลูกมันสำปะหลังในพื้นที่เดิมเป็นระยะเวลานาน ซึ่งพบว่า มันสำปะหลังเจริญเติบโตเป็นปกติโดยต้นถั่วไม่มีผลต่อการเจริญเติบโตของมันสำปะหลัง โดยต้นถั่วทั้ง 4 ชนิด มีการเจริญเติบโตที่แตกต่างกัน ในระยะแรก พบว่าถั่วดำเจริญเติบโตดีที่สุด และตัดคลุมดินหลังปลูก 45 วัน ในระยะต่อมาถั่วพรางมีการเจริญเติบโตดีที่สุดและเริ่มตัดฝักแล้ว รองลงมาถั่วลิสงและถั่วเขียว โดย น้ำหนักสดของต้นถั่วดำที่ตัดที่ระยะ 45 วันหลังปลูก ในแปลงย่อย ขนาด 4.5 x 20 เมตร ให้น้ำหนักสดเฉลี่ย 8.33 กก./พื้นที่ หรือให้ผลผลิตน้ำหนักสดถั่วดำ 148 กก./ไร่ ซึ่งจะเป็นอินทรีย์วัตถุกลับลงสู่ดิน

เก็บข้อมูลผลผลิตถั่วเขียว ถั่วลิสงและถั่วพรางจากแปลงเกษตรกร โดยแปลงของ นายทัย สามารถ เก็บผลผลิตถั่วทั้ง 3 ชนิดได้ โดยถั่วเขียวให้ผลผลิตต่ำสุด เนื่องจากต้นถั่วเขียวเจริญเติบโตไม่ดีมีลักษณะแคระแกรน ส่วนถั่วลิสงมีการเจริญเติบโตและติดฝักดี ถั่วพรางมีลักษณะต้นเตี้ย ฝักมีขนาดใหญ่และยาวถึงดิน ทำให้ ฝักถูกปลวกและมดเข้าทำลาย ให้ผลผลิต ดังตารางที่ 9 ส่วนแปลงของนางอรชรซึ่งการเจริญเติบโตของต้นมันสำปะหลังงดดีกว่าแปลงนายทัยทำให้ต้นมันสำปะหลังคลุมถั่ว ส่งผลให้ต้นถั่วเขียวและถั่วพรางแห้งตายบริเวณ ร่องมันสำปะหลัง ส่วนต้นถั่วลิสง เมล็ดไม่เต็มฝักและเมล็ดงอกในฝัก เนื่องจากช่วงก่อนเก็บผลผลิตมีฝนตก

จากการปลูกพืชตระกูลถั่วร่วมกับแปลงมันสำปะหลัง สรุปได้ว่า ต้นถั่วดำ ถั่วพรางและถั่วลิสง สามารถปลูกร่วมกับมันสำปะหลังได้ โดยสามารถให้ผลผลิตและมีเศษซากถั่วไว้สำหรับบำรุงดิน โดยถั่วลิสง ให้ ปริมาณธาตุไนโตรเจน 0.07 กก./ไร่ ฟอสฟอรัส 0.004 กก./ไร่ และโพแทสเซียม 0.018 กก./ไร่ ถั่วพรางให้ ปริมาณธาตุไนโตรเจน 0.052 กก./ไร่ ฟอสฟอรัส 0.003 กก./ไร่ และโพแทสเซียม 0.01 กก./ไร่ จากการ สอดถามเกษตรกรที่ร่วมทดสอบ ซึ่งเห็นความสำคัญของประโยชน์ของเศษซากพืช โดยในการทดสอบใน ปีงบประมาณต่อไป อาจต้องปรับเปลี่ยนกรรมวิธีในการทดสอบอีกครั้ง เช่นเป็นระบบการปลูกสลับ หรือปลูก เหมือง ซึ่งจะต้องรอบเก็บผลผลิตมันสำปะหลังออกจากพื้นที่ก่อน โดยคาดว่าจะเก็บผลผลิตในเดือนมีนาคม 2562 นี้

ตารางที่ 12 แสดงข้อมูลผลผลิตและปริมาณธาตุอาหารในถั่วบำรุงดินของแปลงมันสำปะหลัง

ชนิดถั่ว	ปริมาณผลผลิตถั่ว		ปริมาณธาตุอาหารในต้นถั่ว (กก./ไร่)		
	กก./พื้นที่	กก./ไร่	ไนโตรเจน	ฟอสฟอรัส	โพแทสเซียม
ถั่วเขียว	0.43	7.6	-	-	-
ถั่วลิสง	3.83	68	0.07	0.004	0.018
ถั่วพรี	18.37	18.3	0.052	0.003	0.01

หมายเหตุ: ไม่สามารถหาปริมาณธาตุอาหารในต้นถั่วเขียวได้ เนื่องจากการงอกและการเจริญเติบโตไม่ได้เริ่มต้นแคระแกรน



แปลงมันสำปะหลังร่วมกับถั่วเขียว



แปลงมันสำปะหลังร่วมกับถั่วดำ



แปลงมันสำปะหลังร่วมกับถั่วพรี



แปลงมันสำปะหลังร่วมกับถั่วลิสง

ภาพที่ 9 แปลงทดสอบการฟื้นฟูดินตามสมบูรณของดินในแปลงปลูกมันสำปะหลัง ของนายหทัย จะตะ



แปลงมันสำปะหลังร่วมกับถั่วเขียว



แปลงมันสำปะหลังร่วมกับถั่วดำ




แปลงมันสำปะหลังร่วมกับถั่วพริ้ว



แปลงมันสำปะหลังร่วมกับถั่วลิสง

ภาพที่ 10 แปลงทดสอบการฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดินในแปลงปลูกมันสำปะหลัง ของนางอรชร เป้าทอง



ภาพที่ 11 ผลผลิตถั่วจากแปลงทดสอบการฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดินในแปลงปลูกมันสำปะหลัง

4.2.3 กลุ่มพื้นที่ที่มีความลาดชัน มีการเผา ใช้สารเคมีและปลูกข้าวโพดติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน

พื้นที่ดำเนินงาน พื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปองคำ อ.สันติสุข จ.น่าน ทดสอบเทคโนโลยีในการฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดินในพื้นที่ปลูกข้าวโพดเพื่อปรับเป็นพื้นที่ปลูกพืชทางเลือกอื่นที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ ดำเนินการร่วมกับเกษตรกร 2 ราย แบ่งการทดสอบ ดังนี้

กรรมวิธีที่ 1 การปลูกข้าวโพดตามวิธีการของเกษตรกร

กรรมวิธีที่ 2 การปลูกข้าวโพด + ระบบอนุรักษ์ดิน และน้ำ+ ถั่วลตอด

กรรมวิธีที่ 3 การปลูกข้าวโพด + ระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ+ถั่วเขียวแดง (ปลูกเหลื่อม)

กรรมวิธีที่ 4 การปลูกข้าวโพด + ระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ+ ถั่วดำ (ปลูกเหลื่อม)

กรรมวิธี/ แปลงที่	ปีที่ 1	ปีที่ 2	ปีที่ 3
1	control ข้าวโพดตามวิธีของเกษตรกร	control ข้าวโพดตามวิธีของเกษตรกร	control ข้าวโพดตามวิธีของเกษตรกร
2	ข้าวโพด + ระบบอนุรักษ์ดิน และน้ำ+ ถั่วลตอด	ข้าวโพด + ระบบอนุรักษ์ดิน และน้ำ+ ถั่วลตอด	ข้าวโพด + ระบบอนุรักษ์ดิน และน้ำ+ ถั่วลตอด
3	ข้าวโพด + ระบบอนุรักษ์ดินและ น้ำ+ถั่วเขียวแดง (ปลูกเหลื่อม)	ข้าวโพด + ระบบอนุรักษ์ดินและ น้ำ+ถั่วเขียวแดง (ปลูกเหลื่อม)	ข้าวโพด + ระบบอนุรักษ์ดินและ น้ำ+ถั่วเขียวแดง (ปลูกเหลื่อม)
4	ข้าวโพด + ระบบอนุรักษ์ดินและ น้ำ+ถั่วดำ (ปลูกเหลื่อม)	ข้าวโพด + ระบบอนุรักษ์ดินและ น้ำ+ถั่วดำ (ปลูกเหลื่อม)	ข้าวโพด + ระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ +ถั่วดำ (ปลูกเหลื่อม)

ผลวิเคราะห์คุณสมบัติดินก่อนการทดสอบเทคโนโลยีการฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดินในพื้นที่ปลูกข้าวโพด พื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปองคำ

ผลวิเคราะห์ดินแปลงปลูกข้าวโพดของเกษตรกร 2 ราย ได้แก่ นายชัย คำยาน และนางอ้วน อินต๊ะวิชัย พบว่า ดินเป็นกรดจัดมากถึงกรดจัด (4.73-5.12) ปริมาณอินทรีย์วัตถุในดินสูง (3.49-4.05%) ปริมาณไนโตรเจนในดินสูงถึงสูงมาก (0.17-0.2%) ความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวก อยู่ในระดับต่ำถึงปานกลาง (14.85-16.54 meq/100g) ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์อยู่ในระดับต่ำ (3.97-5.14 mg/kg) ปริมาณโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ปานกลางถึงสูงมาก (88.8-94.4 mg/kg) ปริมาณแคลเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ อยู่ในระดับต่ำมากถึงต่ำ (393-754 mg/kg) ปริมาณแมกนีเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ต่ำถึงปานกลาง (86.3-223 mg/kg) ยกเว้นแปลงนายชัย คำยาน ที่อยู่ในระดับต่ำ (86.3mm/kg) เนื้อดินเป็นดินเหนียว เนื่องจากแปลงที่ดำเนินการทดสอบไม่ได้ปลูกไถ่ป่าชุมชน จึงเก็บตัวอย่างดินจากแปลงปลูกยางพารา อายุ 5 ปี ในบริเวณใกล้เคียงมาวิเคราะห์ พบว่า ดินเป็นกรดจัดมาก (4.75) ปริมาณอินทรีย์วัตถุในดินสูง (2.69%) ปริมาณไนโตรเจนในดินสูง (0.13%) ความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวก อยู่ในระดับต่ำ (14.01 meq/100g) ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์อยู่ในระดับต่ำมาก (2.37mg/kg) ปริมาณโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ปานกลาง

(70.45 mg/kg) ปริมาณแคลเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ อยู่ในระดับต่ำมาก (194 mg/kg) ปริมาณแมกนีเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ต่ำ (96.43 mg/kg) เนื้อดินเป็นดินเหนียว

ตารางที่ 13 ผลวิเคราะห์ดิน พื้นที่ที่มีความลาดชัน มีการเผา ใช้สารเคมีและปลูกข้าวโพดติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน (ข้าวโพด) โครงการพัฒนาพื้นที่รูปแบบโครงการหลวงโป่งคำ

ลำดับ	เกษตรกร	pH	OM	N	CEC	P	K	Ca	Mg	Texture
			(%)		meq/100 g			mg/kg		
1	แปลงปลูกยางพารา 5 ปี	4.75	2.69	0.13	14.01	2.37	70.45	194	96.4	Clay
2	นายชัย ค่ายาน	4.73	3.49	0.17	14.85	5.14	88.88	393	86.3	Clay
3	นางอ้วน อินตะวิชัย	5.12	4.05	0.2	16.54	3.97	94.4	754	223	Clay

ผลการทดสอบเทคโนโลยีการฟื้นฟูดินในสภาพพื้นที่ที่มีความลาดชัน มีการเผา ใช้สารเคมีและปลูกข้าวโพดติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน (ข้าวโพด) โครงการพัฒนาพื้นที่รูปแบบโครงการหลวงโป่งคำ

ดำเนินการทดสอบในแปลงปลูกข้าวโพดของเกษตรกร จำนวน 2 ราย ได้แก่ นางอ้วน อินตะวิชัย และนายชัย ค่ายาน ได้จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำโดยทำเป็นคูรับน้ำขอบเขา และปลูกหญ้าแฝกขวางความลาดชัน และดำเนินการปลูกถั่วตามแนวทดสอบ ซึ่งในการดำเนินงานเกิดปัญหาเกษตรกรไม่สามารถเข้าแปลงได้ เนื่องจากเกิดอุทกภัยทำให้สะพานข้ามแปลงขาด เกษตรกรจึงปลูกถั่วในแปลงข้างกำแพงกำหนด ส่งผลให้ผลผลิตถั่วต่ำมาก ทั้งถั่วดำ ถั่วเขียวและถั่วลันเตา ส่วนปริมาณผลผลิตข้าวโพดของทั้งแปลงนางอ้วนและนายชัย ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยแปลงนางอ้วน ผลผลิตข้าวโพดจากแปลงที่ปลูกถั่วเขียวและถั่วลันเตาสูงที่สุด รองลงมาคือแปลงปลูกถั่วลันเตา และปลูกถั่วดำ (ตารางที่ 14) ส่วนแปลงนายชัย พบว่าผลผลิตข้าวโพดจากแปลงที่ปลูกถั่วลันเตาให้ผลผลิตสูงสุด รองลงมาคือแปลงปลูกถั่วดำและปลูกถั่วเขียว

ตารางที่ 14 แสดงข้อมูลผลผลิตจากแปลงทดสอบนางอ้วน อินตะวิชัย

กรรมวิธี	ผลผลิตข้าวโพด (กก./ไร่)	ผลผลิตถั่วลันเตา (ก./ไร่)	ผลผลิตถั่วเขียว แดง (กก./ไร่)	ผลผลิตถั่วดำ (กก./ไร่)
control ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตามวิธีของเกษตรกร	ไม่สามารถเก็บข้อมูลได้เนื่องจากเกษตรกรเก็บผลผลิตก่อน			
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ + ระบบอนุรักษ์ดิน และน้ำ+ ถั่วลันเตา (ปลูกหลอม)	317	227	-	-
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ + ระบบอนุรักษ์ดิน และน้ำ+ถั่วเขียวแดง (ปลูกหลอม)	400	-	7	-
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ + ระบบอนุรักษ์ดิน และน้ำ +ถั่วดำ (ปลูกหลอม)	295	-	-	25

ตารางที่ 15 แสดงข้อมูลผลผลิตจากแปลงทดสอบนายชัย คำยาน

กรรมวิธี	ผลผลิตข้าวโพด (กก./ไร่)	ผลผลิตถั่วลลึง (กก./ไร่)	ผลผลิตถั่วเขียว แดง (กก./ไร่)	ผลผลิตถั่วดำ (กก./ไร่)
control ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตามวิธีของเกษตรกร	-ไม่สามารถเก็บข้อมูลได้เนื่องจากเกษตรกรเก็บผลผลิตก่อน-			
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ + ระบบอนุรักษ์ดิน และน้ำ+ ถั่วลลึง (ปลูกเหลื่อม)	294	158	-	-
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ + ระบบอนุรักษ์ดิน และน้ำ+ถั่วเขียวแดง (ปลูกเหลื่อม)	104	-	12	-
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ + ระบบอนุรักษ์ดิน และน้ำ +ถั่วดำ (ปลูกเหลื่อม)	192	-	-	16



ภาพที่ 12 แปลงทดสอบการฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดินในแปลงปลูกข้าวโพด

4.2.4 กลุ่มพื้นที่ที่ปลูกพืชผักและใช้ที่ดินติดต่อกันแบบเข้มข้น

พื้นที่ดำเนินงาน : พื้นที่ปลูกหอมญี่ปุ่น 2 แห่ง

- 1) พื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางหินฝน อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
- 2) พื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่ละอ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

ทดสอบเทคโนโลยีในการฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดินในพื้นที่ปลูกหอมญี่ปุ่น เพื่อแก้ปัญหาผลผลิตต่ำเนื่องจากการปลูกพืชซ้ำที่เดิมติดต่อกันเป็นเวลานาน ดำเนินการร่วมกับเกษตรกร 2 ราย แบ่งการทดสอบเป็น 2 กรรมวิธี ดังนี้

กรรมวิธีที่ 1 แปลงควบคุม ปลูกหอมญี่ปุ่นวิธีของเกษตรกร

กรรมวิธีที่ 2 ปลูกหอมญี่ปุ่น + จัดการธาตุอาหาร+ปลูกถั่วสลับบำรุงดิน

- 1) พื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางหินฝน อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

ผลวิเคราะห์คุณสมบัติดินก่อนการทดสอบเทคโนโลยีการฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดินในพื้นที่ปลูกหอมญี่ปุ่น พื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางหินฝน

ผลการวิเคราะห์ดินจากบริเวณป่าชุมชน และจากแปลงเกษตรกรที่ปลูกหอมญี่ปุ่น จำนวน 4 ตัวอย่าง พบว่า ดินจากป่าชุมชน (บ้านห้วยใต้) มีความเป็นกลาง (6.76) ปริมาณอินทรีย์วัตถุในดินสูง (3.84%) ปริมาณไนโตรเจนในดินสูงมาก (0.19%) ความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวก อยู่ในระดับปานกลาง (17.86 meq/100g) ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์อยู่ในระดับสูง (17.11 mg/kg) ปริมาณโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้สูงมาก (198 mg/kg) ปริมาณแคลเซียมที่แลกเปลี่ยนได้อยู่ในระดับปานกลาง (2,361 mg/kg) ปริมาณแมกนีเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ปานกลาง (141 mg/kg) เนื้อดินเป็นดินร่วนปนเหนียว ในส่วนของแปลงปลูกหอมญี่ปุ่น พบว่า มีความเป็นกรดรุนแรงมากถึงกรดเล็กน้อย (4.29-6.18) ปริมาณอินทรีย์วัตถุในดินสูง (3.84-4.14%) ปริมาณไนโตรเจนในดินสูงมาก (0.19-0.21%) ความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวก อยู่ในระดับปานกลาง (17.3-18.05 meq/100g) ยกเว้นแปลงของนายสรพงษ์ที่อยู่ในระดับต่ำ ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์อยู่ในระดับสูงมาก (70.76-95.60mg/kg) ปริมาณโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้สูงมาก (233-398 mg/kg) ปริมาณแคลเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ อยู่ในระดับปานกลาง (1,128-1,160 mg/kg) ยกเว้นแปลงนายโหวศิริพยาบาล ที่แคลเซียมอยู่ในระดับต่ำ (868 mg/kg) ปริมาณแมกนีเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ต่ำ (86.05-87.35 mg/kg) ยกเว้นแปลงนายพะดี เก่งกล้าชาญกิจ อยู่ในระดับปานกลาง (201 mg/kg) เนื้อดินเป็นดินร่วนเหนียวปนทราย ดินร่วนเหนียวและดินเหนียว

ตารางที่ 16 ผลวิเคราะห์ดิน กลุ่มพื้นที่ที่ปลูกพืชผักและใช้ที่ดินติดต่อกันแบบเข้มข้น (หอมญี่ปุ่น)
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางหินผ่น

ลำดับ	เกษตรกร	pH	OM	N	CEC	P	K	Ca	Mg	Texture
			(%)		meq/100 g			mg/kg		
1	ป่าชุมชน	6.76	3.84	0.19	17.86	17.11	198	2,361	141	Clay Loam
2	นายโบเว ศิริพยาบาล	4.29	3.84	0.19	18.05	93.07	247	868	86.05	Clay Loam
3	นายพะติ เก่งกล้าชาวนิกิจ	4.71	3.86	0.19	17.3	95.60	398	1,128	201	Sandy Clay Loam
4	นายสรพงษ์ กนกจากรู	6.18	4.14	0.21	14.38	70.76	233	1,160	87.35	Clay

แผนทดสอบการเพิ่มผลผลิตและฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดินในแปลงปลูกหอมญี่ปุ่น

ปุ๋ยทางดิน		
วันที่ใส่ปุ๋ย	ชนิดปุ๋ย	ปริมาณ (กก./ไร่)
7 วันหลังปลูก	16 - 20 - 0	50
30 วันหลังปลูก	16 - 20 - 0	30
	15 - 0 - 0	30
50 วันหลังปลูก	15 - 15 - 15	70
	15 - 0 - 0	70
ปุ๋ยทางใบ		
วันพ่นปุ๋ย	ชนิดปุ๋ย	ปริมาณปุ๋ย (กรัม หรือ ซีซี/ น้ำ 20 ลิตร)
30	แคลเซียมคลอไรด์	15
45	คอปเปอร์ซัลเฟต	10
60	บอริก แอซิด	7
75	น้ำปุ๋ยหมัก	30

ผลการทดสอบ

จากการทดสอบสามารถเก็บข้อมูลผลผลิต ได้ 1 ราย คือนายโบเว ศิริพยาบาล พบว่า ผลผลิตหอมญี่ปุ่นจากแปลงควบคุม 5,014 กก./ไร่ และจากแปลงทดสอบ 5,538 กก./ไร่ ซึ่งผลผลิตเพิ่มขึ้น 10% หลังจากเก็บผลผลิตหอมญี่ปุ่นออกจากแปลงจึงปลูกถั่วดำเพื่อบำรุงดิน ซึ่งถั่วดำมีการเจริญเติบโตดีมาก

ตารางที่ 17 ข้อมูลผลผลิตหอมญี่ปุ่นจากแปลงทดสอบ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางหินฝน

เกษตรกร	ผลผลิต (กก./ไร่)		หมายเหตุ
	แปลงควบคุม	แปลงทดสอบ	
นายโบเว ศิริพยาบาล	5,014	5,538	
นายพะติ เก่งกล้าชาญกิจ	-	-	พบการระบาดของโรค ในแปลง
นายสรพงษ์ กนกजारุ	-	-	เกษตรกรเปลี่ยนพื้นที่ปลูก



สภาพแปลงปลูกหอมญี่ปุ่น

ปลูกถั่วดำหลังจากเก็บผลผลิตหอมญี่ปุ่นเพื่อฟื้นฟูดินและเพิ่มอินทรียวัตถุของดิน

ภาพที่ 13 แปลงทดสอบการเพิ่มผลผลิตและฟื้นฟูดินในแปลงปลูกหอมญี่ปุ่น

2) พื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่ละอ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

ผลวิเคราะห์คุณสมบัติดินก่อนการทดสอบเทคโนโลยีการฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดินในพื้นที่ปลูกหอมญี่ปุ่น พื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่ละอ

ผลการวิเคราะห์ดินจากบริเวณป่าชุมชนและจากแปลงเกษตรกรที่ปลูกหอมญี่ปุ่น จำนวน 4 ตัวอย่าง พบว่า ดินจากป่าชุมชนบ้านแม่ละอ มีความเป็นกรดจัด (5.18) ปริมาณอินทรีย์วัตถุในดินสูง (4.26%) ปริมาณไนโตรเจนในดินสูงมาก (0.21%) ความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวก อยู่ในระดับต่ำ (11.28 meq/100g) ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์อยู่ในระดับสูงมาก (82.19 mg/kg) ปริมาณโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้สูงมาก (206 mg/kg) ปริมาณแคลเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ อยู่ในระดับต่ำมาก (383 mg/kg) ปริมาณแมกนีเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ปานกลาง (140 mg/kg) เนื้อดินเป็นดินร่วนเหนียวปนทราย ในส่วนของตัวอย่างดินของแปลงปลูกหอมญี่ปุ่น จำนวน 3 ตัวอย่าง มีความเป็นกรดจัดมาก (4.61-4.75) ปริมาณอินทรีย์วัตถุในดินสูง (3.38-3.97%) ปริมาณไนโตรเจนในดินสูงถึงสูงมาก (0.17-0.20%) ความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวกอยู่ในระดับต่ำมากถึงต่ำ (8.08-10.90 meq/100g) ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์อยู่ในระดับสูงมาก (53.52-82.12mg/kg) ปริมาณโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้สูงถึงสูงมาก (93.78-206 mg/kg) ปริมาณแคลเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ อยู่ในระดับต่ำมาก (243-295 mg/kg) ปริมาณแมกนีเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ต่ำมาก (29.65 -36.50mg/kg) ยกเว้นแปลงนายพิธิ ที่อยู่ในระดับต่ำ (41.35mm/kg) เนื้อดินเป็นดินร่วนเหนียวปนทราย

ตารางที่ 18 ผลวิเคราะห์ดิน กลุ่มพื้นที่ที่ปลูกพืชผักและใช้ที่ดินติดต่อกันแบบเข้มข้น (หอมญี่ปุ่น) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่ละอ

ลำดับ	เกษตรกร	pH	OM	N	CEC	P	K	Ca	Mg	Texture
			(%)	(%)						
					meq/100 g			mg/kg		
1	ป่าชุมชน	5.18	4.26	0.21	11.28	82.19	206	383	140	Sandy Clay Loam
2	นายวิชัย สิริธรากุล	4.68	3.97	0.20	10.90	74.87	93.78	295	36.50	Sandy Clay Loam
3	นายชอุ่ม เจริญเกียรติมานะ	4.61	3.87	0.19	8.08	82.12	98.68	252	29.65	Sandy Clay Loam
4	นางพิธิ ชัยวิบูลย์วงศ์	4.75	3.38	0.17	8.08	53.52	206	243	41.35	Sandy Clay Loam

ผลการวิเคราะห์สถานะธาตุอาหารในใบหอมญี่ปุ่นของโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่ละออ

สถานะธาตุอาหาร		
ขาดมาก	ขาดน้อย	เผื่อระวัง
Ca Mg B	Zn Cu	-

แผนทดสอบการเพิ่มผลผลิตและฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดินในแปลงปลูกหอมญี่ปุ่น

ปุ๋ยทางดิน		
วันที่ใส่ปุ๋ย	ชนิดปุ๋ย	ปริมาณ (กก./ไร่)
7 วันหลังปลูก	16 - 20 - 0	50
30 วันหลังปลูก	16 - 20 - 0	30
	15 - 0 - 0	30
50 วันหลังปลูก	15 - 15 - 15	70
	15 - 0 - 0	70
ปุ๋ยทางใบ		
วันพ่นปุ๋ย	ชนิดปุ๋ย	ปริมาณปุ๋ย (กรัม หรือ ซีซี/ น้ำ 20 ลิตร)
30	แคลเซียมคลอไรด์	15
45	คอปเปอร์ซัลเฟต	10
60	บอริก แอซิด	7
75	น้ำปุ๋ยหมัก	30
วันหลังปลูก		

ผลการทดสอบ

ทดสอบการเพิ่มผลผลิตและฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดินในแปลงปลูกหอมญี่ปุ่นร่วมกับเกษตรกร จำนวน 3 ราย ได้แก่ นางพืชี ชัยวิบูลย์วงษ์ นายวิชัย สิริธารากุลและนายช่อมุ่ณ เจริญเกียรติมานะ ในระหว่าง การทดสอบพบการระบาดของโรคในแปลงนางพืชี และนายวิชัย ซึ่งจะให้ผลผลิตค่อนข้างต่ำ แต่พบว่าผลผลิต จากแปลงทดสอบมีปริมาณผลผลิตเพิ่มจากแปลงควบคุม 10 - 38% (ตารางที่ 19)



ภาพที่ 14 แปลงทดสอบการฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดินในแปลงหอมญี่ปุ่น

ตารางที่ 19 ข้อมูลผลผลิตหอมญี่ปุ่นจากแปลงทดสอบ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่ละโล

เกษตรกร	ผลผลิต (กก./ไร่)		หมายเหตุ
	แปลงควบคุม	แปลงทดสอบ	
นางฟือซึ ซัยวิบูลย์วงศ์	2,300	2,743	พบการระบาดของโรคในแปลง
นายวิชัย สิริธรากุล	2,038	2,819	
นายช่อม เจริญเกียรติมานะ	7,248	8,000	-



หอมญี่ปุ่นแปลงฟือซึ

หอมญี่ปุ่นแปลงวิชัย

หอมญี่ปุ่นแปลงช่อม

ภาพที่ 15 ผลผลิตหอมญี่ปุ่นจากแปลงทดสอบการเพิ่มผลผลิตและฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดิน

4.3 การศึกษาและทดสอบเทคโนโลยีการลดปริมาณโลหะหนักในดินเพาะปลูกพืชบนพื้นที่สูง

1) ศึกษาสถานการณ์การปนเปื้อนของโลหะหนักในแปลงปลูกพืชในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงและโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง

1. สถานการณ์การปนเปื้อนโลหะหนักในดินและผลิตผล

โลหะหนักชนิดสำคัญที่พบในประเทศไทย ได้แก่ สารหนู แคดเมียม โคบอลต์ โครเมียม ทองแดง โปรท นิกเกิล ตะกั่ว และสังกะสี ซึ่งทุกชนิดสามารถละลายน้ำ เปลี่ยนเป็นสารประกอบเชิงซ้อน ตกตะกอนหรือเป็นอนุภาคคอลลอยด์ในน้ำได้ ทั้งนี้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (2561) รายงานว่าโลหะหนักที่ปนเปื้อนในดินมีสาเหตุมาจาก

- 1) การชะล้างหน้าดินจากอุตสาหกรรมเมืองแร่ เช่น โลหะหนักอาซิโนจากเหมืองแร่ดีบุก โลหะหนักแคดเมียมจากเหมืองแร่สังกะสี และตะกั่ว ปนเปื้อนลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติและกระจายไปบริเวณใกล้เคียง
- 2) กิจกรรมทางการเกษตร เช่น การใช้ปุ๋ย สารกำจัดแมลง และสารกำจัดวัชพืชที่มีโลหะหนักเป็นวัตถุดิบ นอกจากนี้ยังพบในน้ำยาถอนเนื้อไม้ อาหารสัตว์ ยารักษาคนและสัตว์บางชนิด
- 3) แหล่งกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูล โดยเฉพาะขยะอันตราย เช่น แบตเตอรี่ ถ่านไฟฉาย สีย้อม หากมีการรวบรวมและกำจัดไม่ถูกสุขลักษณะ โลหะหนักอาจกระจายสู่สิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ยังมีรายงานว่า ความเข้มข้นของ H^+ มีผลต่อการดูดซับโลหะหนักของอนุภาคดินเหนียว การเปลี่ยนสถานะของโลหะหนักในดินขึ้นอยู่กับค่าความเป็นกรด-ด่างของดิน ธาตุแมงกานีสและเหล็กออกไซด์มีความสามารถในการดูดซับโลหะหนักสูง ดินที่เป็นกรดสูงโลหะหนักจะจับตัวกับสารอินทรีย์ได้ดี ในขณะที่โลหะหนักที่เป็นองค์ประกอบภายในผลึกแร่ต้นกำเนิดจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงทางเคมีใดๆ

ผลการสุ่มตรวจคุณภาพดินในแปลงปลูกพืชของเกษตรกรพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงและโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2554-2560 รวม 72 แห่ง 1,331 แปลง คิดเป็นร้อยละ 11.56 ของแปลงปลูกพืชทั้งหมด 11,509 แปลง พบดินไม่ผ่านเกณฑ์พื้นฐานการปนเปื้อนโลหะหนักอาซิโน (As) หรือสารหนู และแคดเมียม (Cd) ในดินประเทศไทยของกรมวิชาการเกษตร (ไม่ระบุปี พ.ศ.) มากกว่าโลหะหนักชนิดอื่น คือ มีปริมาณอาซิโนเกิน 30 มิลลิกรัม/กิโลกรัม จำนวน 113 แปลง (ร้อยละ 8.49) จากจำนวนแปลงที่ตรวจทั้งหมด และมีปริมาณแคดเมียมเกิน 0.15 มิลลิกรัม/กิโลกรัม จำนวน 240 แปลง (ร้อยละ 18.03) ซึ่งต้องหาสาเหตุการปนเปื้อนโลหะหนักอาซิโนและแคดเมียมแต่ละพื้นที่เพื่อหาวิธีการแก้ไขต่อไป

เมื่อพิจารณาในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง จำนวนแปลงปลูกพืชที่มีปริมาณอาซิโนเกินเกณฑ์พื้นฐานมี 63 แปลง (ร้อยละ 7.13) ร้อยละเอ็ดแสดงดังตารางที่ 20 โดยศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปางอุ๋ง และทุ่งเรา มีจำนวนแปลงที่ไม่ผ่านเกณฑ์สูงสุด 10 แปลง คิดเป็นร้อยละ 47.62 และ 40 จากจำนวนแปลงที่ตรวจทั้งหมดของศูนย์ฯ รองลงมาคือ ศูนย์ฯ ทุ่งเงิง 7 แปลง (ร้อยละ 33.33) อย่างไรก็ตามมี 21 ศูนย์ฯ ที่ผ่านเกณฑ์พื้นฐานการปนเปื้อนโลหะหนักทุกแปลง

ตารางที่ 20 จำนวนแปลงปลูกพืชในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงที่มีปริมาณโลหะหนักอาซินิก (As) เกินค่าเกณฑ์พื้นฐานของกรมวิชาการเกษตร

ลำดับ	ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง	จำนวนแปลงที่ตรวจ	แปลงที่ไม่ผ่านเกณฑ์ As ≥ 30 มก./กก.	
			จำนวนแปลง	ร้อยละ
1	ปางอุ๋ง	21	10	47.62
2	หุบเรา	25	10	40.00
3	หุบเงิง	21	7	33.33
4	เลอดอ	3	1	33.33
5	ห้วยน้ำริน	22	7	31.82
6	แม่แฮ	25	6	24.00
7	ห้วยโป่ง	22	3	13.64
8	ม่อนเงาะ	23	3	13.04
9	วัดจันทร	23	3	13.04
10	ห้วยแล้ง	20	2	10.00
11	แก่น้อย	23	2	8.70
12	แม่โก	25	2	8.00
13	ห้วยสัมปอ	21	1	4.76
14	ป่าเมี่ยง	23	1	4.35
15	หนองเขียว	24	1	4.17
16	แม่สะป๊อก	25	1	4.00
17	หนองหอย	25	1	4.00
18	แม่ทวเหนือ	26	1	3.85
19	ทุ่งหลวง	28	1	3.57
20	ขุนแปะ	24	0	0.00
21	ขุนวาง	24	0	0.00
22	ตีนดก	24	0	0.00
23	ปึงคำ	21	0	0.00
24	ปางตะ	21	0	0.00
25	ผาตั้ง	21	0	0.00
26	พระบาทห้วยต้ม	21	0	0.00
27	แม่ปูลหลวง	25	0	0.00
28	แม่แพะ	25	0	0.00
28	แม่แพะ	25	0	0.00
29	แม่ลาน้อย	25	0	0.00
30	แม่สะเรียง	24	0	0.00
31	แม่สาใหม่	23	0	0.00

ลำดับ	ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง	จำนวน แปลงที่ตรวจ	แปลงที่ไม่ผ่านเกณฑ์ $As \geq 30$ มก./กก.	
			จำนวนแปลง	ร้อยละ
32	แม่หอด	21	0	0.00
33	สะเีะ	22	0	0.00
34	หมอกจำ	21	0	0.00
35	ห้วยน้ำขุ่น	21	0	0.00
36	ห้วยลึก	26	0	0.00
37	ห้วยเสี้ยว	22	0	0.00
38	อ่างช้าง	23	0	0.00
39	อินทนนท์	25	0	0.00
รวม		884	63	7.13

ส่วนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงที่พบโลหะหนักอาซิติกเกินเกณฑ์พื้นฐานมีจำนวน 50 แปลง (ร้อยละ 11.19) จากจำนวนแปลงที่ตรวจทั้งหมด โดยโครงการพัฒนาฯ พบพระ ทั้ง 3 แปลง ไม่ผ่านเกณฑ์ เช่นเดียวกับโครงการพัฒนาฯ ปางหินฝน จำนวนแปลงที่ไม่ผ่านมี 11 แปลง (ร้อยละ 52.38) และโครงการพัฒนาฯ สบเมย มี 6 แปลง (ร้อยละ 31.58) เท่ากับโครงการพัฒนาฯ ปางมะโฮ๋ ในทางตรงข้ามโครงการพัฒนาฯ 18 แห่ง ไม่พบการปนเปื้อนเกินเกณฑ์พื้นฐาน รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 21

ตารางที่ 21 จำนวนแปลงปลูกพืชในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงที่มีปริมาณโลหะหนักอาซิติก (As) เกินค่าเกณฑ์พื้นฐานของกรมวิชาการเกษตร

ลำดับ	โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบ โครงการหลวง	จำนวน แปลงที่ตรวจ	แปลงที่ไม่ผ่านเกณฑ์ $As \geq 30$ มก./กก.	
			จำนวนแปลง	ร้อยละ
1	พบพระ	3	3	100.00
2	ปางหินฝน	21	11	52.38
3	สบเมย	19	6	31.58
4	ปางมะโฮ๋	21	6	28.57
5	แม่สลอง	18	4	22.22
6	แม่มะลอ	21	4	19.05
7	แม่สามแลบ	18	3	16.67
8	แม่สลอง	18	2	11.11
9	วาวี	30	3	10.00
10	ปากกล้วย	21	2	9.52
11	สบโขง	21	2	9.52
12	ห้วยเขย่ง	21	2	9.52
13	ป่าแป๋	21	1	4.76
14	ปางแดงใน	21	1	4.76

ลำดับ	โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบ โครงการหลวง	จำนวน แปลงที่ตรวจ	แปลงที่ไม่ผ่านเกณฑ์ $As \geq 30$ มก./กก.	
			จำนวนแปลง	ร้อยละ
15	ผาแตก	18	0	0.00
16	ดอยปุย	20	0	0.00
17	โหล่งซอด	21	0	0.00
18	ห้วยเป้า	18	0	0.00
19	ถ้ำเวียงแก	9	0	0.00
20	โป่งคำ	6	0	0.00
21	สะเนียน	6	0	0.00
22	ปางยาง	6	0	0.00
23	วังไผ่	9	0	0.00
24	น้ำแบ่ง	6	0	0.00
25	แม่จริม	9	0	0.00
26	บ่อเกลือ	6	0	0.00
27	น้ำแขวง	9	0	0.00
28	น้ำเค็ม	6	0	0.00
29	ขุนสถาน	9	0	0.00
30	ห้วยน้ำขาว	3	0	0.00
31	ผาผึ้ง	3	0	0.00
32	คลองลาน	9	0	0.00
รวม		447	50	11.19

การปนเปื้อนโลหะหนักแคดเมียมในแปลงปลูกพืชของเกษตรกรศูนย์พัฒนาโครงการหลวงที่มีปริมาณเกินเกณฑ์พื้นฐานการปนเปื้อนโลหะหนักในดินประเทศไทยของกรมวิชาการเกษตร ซึ่งกำหนดไว้ไม่เกิน 0.15 มิลลิกรัม/กิโลกรัม มีจำนวน 172 แปลง คิดเป็นร้อยละ 19.46 ผลการสุ่มตรวจดินในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเหลือต้อง 3 แปลง มีปริมาณเกินค่าเกณฑ์พื้นฐาน เช่นเดียวกับศูนย์ฯ ห้วยเงียง มีจำนวน 12 แปลง คิดเป็นร้อยละ 57.14 ไม่แตกต่างกับผลการตรวจที่ศูนย์ฯ ห้วยเงียง 14 แปลง คิดเป็นร้อยละ 56 จากจำนวนแปลงที่ตรวจทั้งหมด มีเพียง 4 แห่ง ที่ผ่านเกณฑ์พื้นฐาน ได้แก่ ศูนย์ฯ แม่ป๋นหลวง ห้วยน้ำขุ่น ห้วยหลวง และห้วยส้มป่อย รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 22

ตารางที่ 22 จำนวนแปลงปลูกพืชในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงที่มีปริมาณโลหะหนักแคดเมียม (Cd) เกินค่าเกณฑ์พื้นฐานของกรมวิชาการเกษตร

ลำดับ	ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง	จำนวนแปลงที่ตรวจ	แปลงที่ไม่ผ่านเกณฑ์ Cd ≥ 0.15 มก./กก.	
			จำนวนแปลง	ร้อยละ
1	เลอตอ	3	3	100.00
2	ทุ่งเริง	21	12	57.14
3	ทุ่งเรา	25	14	56.00
4	ปางอุ๋ง	21	9	42.86
5	ตีนตอก	24	9	37.50
6	แกนน้อย	23	8	34.78
7	ปางตะเ	21	7	33.33
8	แม่แฮ	25	8	32.00
9	ม่อนเงาะ	23	7	30.43
10	วัดจันทร์	23	7	30.43
11	แม่สาใหม่	23	7	30.43
12	หนองเขียว	24	7	29.17
13	แม่เฒ	25	7	28.00
14	ห้วยบัวกรบ	22	6	27.27
15	ป่าเมี่ยง	23	6	26.09
16	แม่หลอด	21	5	23.81
17	ห้วยลึก	26	6	23.08
18	ห้วยเสี้ยว	22	5	22.73
19	แม่แพะ	25	5	20.00
20	ห้วยโป่ง	22	4	18.18
21	อ่างช้าง	23	4	17.39
22	แม่ทาเหนือ	26	4	15.38
23	หมอกจำ่ม	21	3	14.29
24	สะโงะ	22	3	13.64
25	แม่ลาน้อย	25	3	12.00
26	ผาตั้ง	21	2	9.52
27	พระบาทห้วยต้ม	21	2	9.52
28	หนองหอย	25	2	8.00
29	ห้วยแล้ง	20	1	5.00
30	ปึงค่า	21	1	4.76
31	แม่สะเรียง	24	1	4.17
32	ขุนแปะ	24	1	4.17

ลำดับ	ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง	จำนวน แปลงที่ตรวจ	แปลงที่ไม่ผ่านเกณฑ์ Cd ≥ 0.15 มก./กก.	
			จำนวนแปลง	ร้อยละ
33	ขุนวาง	24	1	4.17
34	อินทนนท์	25	1	4.00
35	แม่สะป๊อก	25	1	4.00
36	แม่ป๋นหลวง	25	0	0.00
37	ห้วยน้ำขุ่น	21	0	0.00
38	ทุ่งหลวง	28	0	0.00
39	ห้วยส้มป่อย	21	0	0.00
รวม		884	172	19.46

สำหรับผลการสุ่มเก็บตัวอย่างดินในแปลงปลูกพืชพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง 447 แปลง มีแปลงที่พบปริมาณโลหะหนักแคดเมียมไม่ผ่านเกณฑ์พื้นฐาน 68 แปลง คิดเป็นร้อยละ 15.21 โดยแปลงปลูกพืชของโครงการพัฒนาฯ ผาผึ้ง-ศรีคีรีรักษ์ 2 จาก 3 แปลง มีปริมาณเกินเกณฑ์เช่นเดียวกันโครงการพัฒนาฯ ปางมะโอ ที่พบแปลงไม่ผ่านเกณฑ์ถึงร้อยละ 57.14 (12 แปลง) และโครงการพัฒนาฯ วาวี ร้อยละ 40 (12 แปลง) ในทางตรงข้ามโครงการพัฒนาฯ 15 แห่ง ผ่านเกณฑ์พื้นฐานทุกแปลง ดังแสดงในตารางที่ 23



ตารางที่ 23 จำนวนแปลงปลูกพืชในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงที่มีปริมาณโลหะหนัก แคดเมียม (Cd) เกินค่าเกณฑ์พื้นฐานของกรมวิชาการเกษตร

ลำดับ	โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	จำนวนแปลงที่ตรวจ	แปลงที่ไม่ผ่านเกณฑ์ Cd ≥ 0.15 มก./กก.	
			จำนวนแปลง	ร้อยละ
1	ผาผึ้งศรีศรีรักษ์	3	2	66.67
2	ปางมะโฮ	21	12	57.14
3	วาวี	30	12	40.00
4	สบโขง	21	7	33.33
5	ห้วยเขย่ง	21	7	33.33
6	พหพระ	3	1	33.33
7	ปางหินฝน	21	5	23.81
8	สบเมย	19	4	21.05
9	ผาแตก	18	3	16.67
10	แม่สลอง	18	3	16.67
11	แม่สลอง	18	3	16.67
12	โหล่งขอด	21	3	14.29
13	ดอยปุย	20	2	10.00
14	ป่าแป๋	21	2	9.52
15	ห้วยเป้ง	18	1	5.56
16	ปางแดงใน	21	1	4.76
17	ปากส้ว	21	0	0.00
18	แม่สามแลบ	18	0	0.00
19	ถ้ำเวียงแก้ว	9	0	0.00
20	โป่งคำ	6	0	0.00
21	สะเนียน	6	0	0.00
22	ปางยาง	6	0	0.00
24	วังผึ่ง	9	0	0.00
25	น้ำแบ่ง	6	0	0.00
26	แม่จริม	9	0	0.00
27	บ่อเกลือ	6	0	0.00
28	น้ำแซง	9	0	0.00
29	น้ำเค็ม	6	0	0.00
30	ขุนสถาน	9	0	0.00
31	ห้วยน้ำขาว	3	0	0.00
32	คลองลาน	9	0	0.00
รวม		447	68	15.21

ผลการสุ่มตรวจการปนเปื้อนโลหะหนักในผลิตผลพืชของศูนย์พัฒนาโครงการหลวง

จำนวนพืชส่งเสริมทั้งหมดมี 150 ชนิด ได้สุ่มตรวจสอบการปนเปื้อนโลหะหนักแล้ว 89 ชนิด (ร้อยละ 59) แบ่งเป็น พืชผัก 59 ชนิด (54%) ไม้ผล 11 ชนิด (65%) พืชไร่ 14 ชนิด (78%) และพืชเครื่องดื่ม 5 ชนิด (100%) ชนิดโลหะหนักที่ตรวจสอบ ได้แก่ อาซินิก และแคดเมียม โดยสุ่มเก็บตัวอย่างผลิตผลผัก 212 ตัวอย่าง พืชไร่ 14 ตัวอย่าง ไม้ผล 49 ตัวอย่าง และพืชเครื่องดื่ม 71 ตัวอย่าง จากแปลงปลูกพืชทั้งหมดที่มีปริมาณโลหะหนักเกินเกณฑ์พื้นฐานของกรมวิชาการเกษตรและไม่เกินเกณฑ์

ผลการตรวจทุกตัวอย่างพืชระบบเกษตร GAP ผ่านค่ามาตรฐานโลหะหนักอาซินิกในอาหาร ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข (2529) ซึ่งกำหนดไว้ไม่เกิน 2 มิลลิกรัม/กิโลกรัม แต่แคดเมียมในผลิตผลต้องไม่เกิน 0.05 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ตัวอย่างผักกาดกวางตุ้ง GAP จากศูนย์ฯ แม่เมาะ มีปริมาณ 0.079 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ทั้งนี้อาจมีความเชื่อมโยงกับปริมาณแคดเมียมที่อยู่ในดินแปลงปลูกซึ่งมีค่า 1.7 มิลลิกรัม/กิโลกรัม โดยที่เกณฑ์พื้นฐานกำหนดไว้เพียง 0.15 มิลลิกรัม/กิโลกรัม สำหรับผลการสุ่มตรวจผลิตผลในแปลงปลูกพืชอินทรีย์ ทุกตัวอย่างไม่เกินค่ามาตรฐาน รายละเอียดแสดงในตารางที่ 24- 26

ตารางที่ 24 ผลการสุ่มตรวจโลหะหนักอาซินิกจากตัวอย่างผลิตผลของเกษตรกรโครงการหลวงในแปลงปลูกพืชระบบเกษตร GAP

ลำดับ	ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง	รายชื่อเกษตรกร	ชนิดพืช	ปริมาณ As (มก./กก.)	
				ผลิตผล As ≤ 2 มก./กก.	ดิน As ≤ 30 มก./กก.
1	ทุ่งรา	นายนาญ เตชะพนาลัย	มะเขือเทศ	ND	129.3
		นายอนุพล อนันทวีโร	พริกหวาน	ND	58.03
2	แม่เมาะ	บ.ห้วยขมิ้น	ผักกาดกวางตุ้ง	0.39	38.16
3	แก่งน้อย	นางสี จันดา	หอมพ่อ	ND	30.85
4	แม่เมาะ	นายสันติ อัมพรศิริขันธ์	ปวยเล้ง	ND	26.36
5	ดสันตก	นายวิเชียร ไชยมหา	คะน้าฮ่องกง	ND	20.25
6	หนองหอย	นายกัมพล นทีไพรวัลย์	กึ๋น คอส	0.026	18.61
7	ผาตั้ง	นายสมชาย แซ่ลี	เบบี๋คอส	ND	16.12
8	แม่พะ	นายจิรศักดิ์ ปันมูล	ถั่วแขก	ND	13.54
9	หนองเขี้ยว	นายณัฐกร เรือแก้ว	มะเขือม่วง	ND	12.36
10	แม่สะเรียง	นางสมศรี สุทวิวัฒน์พงศ์	คื่นฉ่าย	<0.025	8.70
11	ปึงคำ	นายเซ่ง แซ่ห่อ	เบบี๋ฮ่องเต้	ND	8.33
12	ห้วยแล้ง	นางเกียะ แซ่ห่า	คอสสลัด	ND	6.22
13	แม่สะเรียง	นายมะณี คักดีชัยปัญญา	โอดีลฟแดง	ND	5.85
14	ปึงคำ	นางสิริยา สว่างกุล	คะน้าฮ่องกง	ND	5.78

ลำดับ	ศูนย์พัฒนา โครงการหลวง	รายชื่อเกษตรกร	ชนิดพืช	ปริมาณ As (มก./กก.)	
				ผลิตผล As ≤ 2 มก./กก.	ดิน As ≤ 30 มก./กก.
15	แม่ทาเหนือ	นายมนัส วิหกทองภพ	แตงกวาญี่ปุ่น	ND	5.46
16	แก่งน้อย	นางชิงผา แซ่ลี	ชาวปลี	ND	5.42
17	แม่สะเรียง	นางอารีรัตน์ สิงขรล่อง ไพร	ผักกาดหวาน	ND	4.63
18	ห้วยลึก	นายอาทิตย์ ขจิตเพชรจรัส	มะเขือม่วงก้าน เขียว	ND	3.63
19	ผาตั้ง	นายธนภัทร จรัสจำรูญกร	ฟักเล็โหล่งเปี๊ยก	ND	2.88
20	ขุนแปะ	นายชาติรี พาค้อ	เบบักคอสด	ND	2.82
21	แม่สะป๊อก	คุณอุดม พญาปราชญ์	ผักสลัด	ND	2.65
22	หนองหอย	แปลงของศูนย์	ฟักเล็โหล่งเปี๊ยก	<0.025	2.33
		แปลงของศูนย์	เรดคอรัล	<0.025	2.33
		แปลงของศูนย์	แรดชิโอ	ND	2.33
		แปลงของศูนย์	โอ๊คลิฟเขียว	<0.025	2.33
		แปลงของศูนย์	โอ๊คลิฟแดง	<0.025	2.33
23	แม่ปุนหลวง	นางสาณิตย์ ไทยศักดิ์ดา	เซเลอรี่	<0.025	1.90
24	สะโงะ	นายเชา สะโงะ	ผักกาดกวางตุ้ง	ND	1.64
25	พระบาทห้วยต้ม	แปลงของศูนย์	มะระขาว	ND	0.62
		แปลงของศูนย์	มะระหยกเขียว	ND	0.62
26	ห้วยเลี้ยว	แปลงของศูนย์	ชาโยเต้	ND	0.53
27	ทุ่งเร่ง	นายอุ่นเรือน สิมมา	อะโวคาโด	ND	68.64
28	ทุ่งเร่ง	นายก่อ่ง โชคำ	อะโวคาโด	ND	49.37
29	ปางตะ	นายวันภนต์ อินหล่อละ	เสาวรส	<0.025	12.69
30	แม่ลาน้อย	นายจรัส พลัสทั้งกาย	เสาวรส	ND	12.45
31	ปึงคำ	นายเลาเยา เติรียมพยุ่ง	มะม่วง	ND	11.89
32	แม่ลาน้อย	นายสมเพชร พลัสทั้งกาย	เสาวรส	ND	9.31
33	แม่ทาเหนือ	นางอัมพร พื่อทอง	เสาวรส	<0.025	7.26
		นายอินสม อินไชยชา	เสาวรส	<0.025	5.07
34	แม่หลอด	แปลงของศูนย์	กาแฟอราบิก้า	ND	19.06
35	ขุนแปะ	แปลงของศูนย์	กาแฟอราบิก้า	ND	5.31
36	แม่ปุนหลวง	นายนะแน่ม ภัทรเสถียรชัย	กาแฟอราบิก้า	ND	2.99
37	ขุนวาง	นายหริว แซ่ลี	ชา	ND	1.75
38	อ่างช้าง	นายศุภพล ลายคำ	ชา	ND	1.4

ตารางที่ 25 ผลการสุ่มตรวจโลหะหนักจากตัวอย่างผลิตผลของเกษตรกรโครงการหลวงในแปลงปลูกพืชระบบเกษตรอินทรีย์

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง	รายชื่อเกษตรกร	ชนิดพืช	ปริมาณ As (มก./กก.)	
			ผลิตผล As ≤ 2 มก./กก.	ดิน As ≤ 30 มก./กก.
วัดจันทร์	นายโชทู อู๊ดอคมศรี	ผักกาดกวางตุ้ง	<0.025	41.67
	นายพะแบน จารูญเลิศวัฒนะกุล	ผักกาดกวางตุ้ง	<0.025	40.03
	นางสาวสิริพร โกมลสายชล	ผักกาดกวางตุ้ง	0.026	3.99
	นายอชิตพล เด่นตระกูลชัย	ถั่วแขก	ND	30.71
	นางภัทราภรณ์ เติ่นกล้ายา	ฟักทองญี่ปุ่น	ND	4.37
ทุ่งเริง	นายสมพร สี่มา	ถั่วแขก	ND	43.73
	นายอินสอน สี่มา	ผักกาดกวางตุ้ง	<0.025	36.13
	นางทองม้วน มณีรัตน์	ผักกาดกวางตุ้ง	0.031	27.84
	นายมงคล เชื้อก่อ	ยอดชาโยเต้	ND	25.66
	นายถนอม ทองเซอร์	ยอดชาโยเต้	ND	15.76

ตารางที่ 26 ผลการสุ่มตรวจโลหะหนักแคดเมียมจากตัวอย่างผลิตผลของเกษตรกรโครงการหลวงในแปลงปลูกพืชระบบเกษตร GAP

ลำดับ	ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง	รายชื่อเกษตรกร	ชนิดพืช	ปริมาณ Cd (มก./กก.)	
				ผลิตผล Cd < 0.05 มก./กก.	ดิน Cd < 0.15 มก./กก.
1	ผาตั้ง	นายธนภัทร จรัสจรรย์กร	ฟิลเลย์ไอซ์เบิร์ก	ND	4.38
2	ทุ่งเรา	นายนาจ เตชะพนาลัย	มะเขือเทศ	ND	2.93
3	แม่แฮ	บ.ห้วยขมิ้น	ผักกาดกวางตุ้ง	0.079	1.7
4	แกน้อย	นางสี จันทา	หอมห่อ	ND	0.7
5	แม่โถ	นายสันติ อัมพรดีชุมาศ	ปวยเล้ง	ND	0.51
6	ดินตง	นายวิเชียร ไชยมหา	คะน้าฮ่องกง	<0.018	0.47
7	สะโงะ	นายเขา สะโงะ	กวางตุ้ง	<0.018	ND
8	แกน้อย	นางชิงผา แซ่ลี	ชาวปลี	ND	ND
9	ปึงคำ	นางสิริยา ส่งมากุล	คะน้าฮ่องกง	<0.018	ND
10	แม่สะเรียง	นางสมศรี สุทวิวัฒน์พงศ์	คื่นฉ่าย	0.033	ND
11	แม่ปูลหวง	นายสันติย์ ไทยศักดิ์ดา	เซเลอรี่	<0.018	ND
12	แม่ทาเหนือ	นายมนัส วิหกทองภพ	แตงกวาญี่ปุ่น	ND	ND
13	แม่แพะ	นายจิรศักดิ์ ปันมูล	ถั่วแขก	ND	ND
14	ปึงคำ	นายเซ่ง แซ่ห่อ	เบบี้อองเต้	ND	ND

ลำดับ	ศูนย์พัฒนา โครงการหลวง	รายชื่อเกษตรกร	ชนิดพืช	ปริมาณ Cd (มก./กก.)	
				ผลิตผล Cd < 0.05 มก./กก.	ดิน Cd < 0.15 มก./กก.
15	ห้วยเสียว	แปลงของศูนย์	ชาโยเต้	ND	ND
16	แม่สะเรียง	นางอารีรัตน์ สิงขรล่อง ไพร	ผักกาดหวาน	ND	ND
17	ทุ่งเรา	นายอนุพล อนันทวีไล	พริกหวาน	ND	ND
18	หนองเขียว	นายณฐกร เรือแก้ว	มะเขือม่วง	ND	ND
19	ห้วยลึก	นายอาทิตย์ ขจิตเพชร จรัส	มะเขือม่วง ก้านเขียว	ND	ND
20	พระบาทห้วย ดัม	แปลงของศูนย์	มะระขาว	ND	ND
		แปลงของศูนย์	มะระหยกเขียว	ND	ND
21	หนองหอย	นายกำพล นทีไพรวัลย์	กระเทียม	ND	ND
		แปลงของศูนย์	ฟักเล็ขอีร์เบิร์ก	<0.018	ND
		แปลงของศูนย์	เรดคอรัล	<0.018	ND
		แปลงของศูนย์	แรดชิโอ	ND	ND
22	ขุนแปะ	นายชาตรี พาค้อ	เบบี๋คอส	ND	ND
23	ผาตั้ง	นายสมชาย แซ่ลี	เบบี๋คอส	ND	ND
24	ห้วยแล้ง	นางเกียะ แซ่เท้า	คอสสลัด	ND	ND
25	แม่สะป๊อก	คุณอุดม พญาปราชญ์	สลัด	<0.018	ND
26	หนองหอย	แปลงของศูนย์	โอ๊คสีฟ้าเขียว	<0.018	ND
		แปลงของศูนย์	โอ๊คสีฟ้าแดง	<0.018	ND
27	แม่สะเรียง	นายมะณี ศักดิ์ชัยปัญญา	โอ๊คสีฟ้าแดง	ND	ND
28	แม่ทาเหนือ	นายอินสม อินไชยชา	เสาวรส	ND	0.13
		นางอัมพร พื่อทอง	เสาวรส	<0.018	0.13
29	ทุ่งเริง	นายอุณเรือน สี่มา	อะโวคาโด	ND	0.83
30	แม่ลาน้อย	นายสมเพชร พลั้ทั้งกาย	เสาวรส	ND	ND
		นายจรัส พลั้ทั้งกาย	เสาวรส	ND	ND
31	ปางตะ	นายวัฒนภณต อินพลอสะ	เสาวรส	ND	ND
32	ทุ่งเริง	นายก่อ่ง ไชคำ	อะโวคาโด	ND	ND
33	ปึงคำ	นายเลาชา เจริญพวง	มะม่วง	ND	ND
34	ขุนแปะ	แปลงของศูนย์	กาแฟอราบิก้า	<0.018	0.13
35	แม่หลอด	แปลงของศูนย์	กาแฟอราบิก้า	<0.018	ND
36	แม่ปุนหลวง	นายยะแน้ว ภัทรเสถียรชัย	กาแฟอราบิก้า	<0.018	ND
37	ขุนวาง	นายหริ่อ แซ่ลี	ชา	ND	ND
38	อ่างช้าง	นายดุลยพล ลายคำ	ชา	<0.018	ND

ตารางที่ 27 ผลการสุ่มตรวจโลหะหนักแคดเมียมจากตัวอย่างผลิตผลของเกษตรกรโครงการหลวงในแปลงปลูกพืชระบบเกษตรอินทรีย์

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง	รายชื่อเกษตรกร	ชนิดพืช	ปริมาณ Cd (มก./กก.)	
			ผลิตผล Cd < 0.05 mg/kg	ดิน Cd < 0.15 mg/kg
วัดจันทร์	นายโชหุ จูติอุดมศรี	ผักกาดกวางตุ้ง	ND	0.56
	นายพะแบน จารุญเลิศวัฒนะกุล	ผักกาดกวางตุ้ง	0.019	0.67
	นางสาวสิริพร โกมลสายชล	ผักกาดกวางตุ้ง	<0.018	0.16
	นายอชิตพล เด่นตระกูลชัย	ถั่วแขก	ND	1.37
	นางภัทรภรณ์ เติ่นกัลยา	ฟักทองญี่ปุ่น	ND	<0.13
ห้วยเงียง	นายสนพร สี่มา	ถั่วแขก	ND	1.02
	นายอินสอน สี่มา	ผักกาดกวางตุ้ง	<0.018	0.87
	นางทองม้วน มณีรัตน์	ผักกาดกวางตุ้ง	ND	1.05
	นายมงคล เชื้อก่อ	ยอดชาโยเต้	ND	0.95
	นายถนอม ทองเซอร์	ยอดชาโยเต้	ND	0.40

นอกจากนี้ยังได้สุ่มตรวจผลิตผลจากโรงคัดบรรจุ พบป่วยเล็งจากศูนย์ฯ แม่ขุนหลวง มีปริมาณ 0.065 มิลลิกรัม/กิโลกรัม เกินค่ามาตรฐาน เช่นเดียวกับกวางตุ้ง 0.079 มิลลิกรัม/กิโลกรัม (แม่แะ) พิลเลย์ไอซ์เบิร์ก 0.060 มิลลิกรัม/กิโลกรัม (หัวน้ำขุ่น) และมะเขือม่วงก้านเขียว 0.081 มิลลิกรัม/กิโลกรัม (หัวเล็ก) ในขณะที่พืชไร่ 14 ตัวอย่าง พบแคดเมียมเกินค่ามาตรฐาน 1 ตัวอย่าง คือ ลิ้นจี่ 0.220 มิลลิกรัม/กิโลกรัม จากสถานีวิจัยเกษตรหลวงอ่างขาง ส่วนไม้ผล 49 ตัวอย่าง และพืชเครื่องดื่ม 71 ตัวอย่าง ผ่านค่ามาตรฐาน

จากการสุ่มตรวจผลิตผลข้างต้น แสดงให้เห็นว่าชนิดพืชส่งเสริมที่ดูดซับโลหะหนัก เช่น ผักกาดกวางตุ้ง มีแนวโน้มสัมพันธ์กับชนิดและปริมาณโลหะหนักที่ปนเปื้อนในดิน จึงควรศึกษาและทดสอบต่อไป

จากข้อมูลการปนเปื้อนโลหะหนักในดินและผลผลิตพืช ในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงและโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ดังกล่าว ได้คัดเลือกพื้นที่ทดสอบเทคโนโลยีการลดปริมาณโลหะหนักในดินจากผลงานวิจัย ดังนี้

1) พื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางหินฝน เนื่องจากข้อมูลผลการวิเคราะห์โลหะหนักในดินตั้งแต่ปี 2554-2560 พบว่า จากจำนวนแปลงที่สุ่มตรวจ 24 แปลง มีจำนวนแปลงที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการปนเปื้อนอาชีวพิษ จำนวน 13 แปลง และแคดเมียม จำนวน 6 แปลง ซึ่งปริมาณที่พบการปนเปื้อนมีปริมาณค่อนข้างสูง และเป็นพื้นที่ที่มีการปลูกผัก

2) พื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่เมลอ เนื่องจากข้อมูลผลวิเคราะห์ดินในปี 2558-2560 พบการปนเปื้อนอาซิติกในดิน 4 แปลง แต่ไม่พบแคดเมียม จากจำนวนแปลงที่สุ่มตรวจ 9 แปลง

3) พื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงพพระ มีจำนวนแปลงที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการปนเปื้อนอาซิติก จำนวน 6 แปลง และแคดเมียม จำนวน 4 แปลง จากจำนวนแปลงที่สุ่มตรวจทั้งหมด 6 แปลง ซึ่งปริมาณที่พบการปนเปื้อนมีปริมาณค่อนข้างสูง

สุ่มเก็บตัวอย่างดินและปัจจัยการผลิต ได้แก่ ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยเคมี ในทั้ง 3 พื้นที่ เพื่อตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนโลหะหนัก (ตารางที่ 28 – 33)

ผลการวิเคราะห์โลหะหนักในดินปลูกพืชของเกษตรกร 3 พื้นที่ ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางหินฝน จำนวน 18 ตัวอย่างพบว่า จำนวนแปลงที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการปนเปื้อนอาซิติก จำนวน 13 แปลง ตะกั่ว จำนวน 7 ตัวอย่าง และไม่พบการปนเปื้อนของแคดเมียม ซึ่งปริมาณที่พบการปนเปื้อนมีปริมาณค่อนข้างสูง และเป็นพื้นที่ที่มีการปลูกผัก พื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่เมลอ จำนวน 23 ตัวอย่าง พบว่า จำนวนแปลงที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการปนเปื้อนอาซิติก จำนวน 4 แปลง ตะกั่ว จำนวน 3 ตัวอย่าง และไม่พบการปนเปื้อนของแคดเมียม ซึ่งปริมาณที่พบการปนเปื้อนมีปริมาณค่อนข้างสูง ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงพพระ จำนวน 11 ตัวอย่าง พบว่า จำนวนแปลงที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการปนเปื้อนอาซิติก จำนวน 4 แปลง ตะกั่ว จำนวน 6 ตัวอย่าง และไม่พบการปนเปื้อนของแคดเมียม

ตารางที่ 28 ผลการสุ่มตรวจวิเคราะห์โลหะหนักในดินจากแปลงเกษตรกรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางหินฝน

ลำดับ	เกษตรกร	พืช	โลหะหนัก (ppm)			
			As	Cd	Cr	Pb
			≤ 30	≤ 0.15	≤ 80	≤ 55
1	นายเพ่ง (พุยไ้)	ข้าวโพด	<3.50	ND	26.31	40.91
2	นายเดชา (พุยไ้)	มะเขือเทศ	11.72	ND	24.59	109
3	นายหล้า ขวัญใจชาวคอย	หอมญี่ปุ่น	23.81	ND	24.48	59.44
4	นายเพี้ยะ (พุยไ้ ม้ง)	กะหล่ำปลี	26.61	ND	33.75	339
5	นายโบเว	หอมญี่ปุ่น	27.18	ND	33.4	56.6
6	นายเลอติ กิตติเดชอมร	หอมญี่ปุ่น	34.31	ND	30.97	56.92
7	นายสุรโชค กุลสวัสดิ์มงคล	มะเขือเทศ	39.56	ND	26.49	54.76
8	นายยงยุทธ กุลสวัสดิ์มงคล	กะหล่ำปลี	47.97	ND	35.25	101
9	นายพะสะเว กิตติเดชอมร	หอมญี่ปุ่น	30.25	ND	51.93	32.99
10	นางสุรดา ชูเกษมพงศ์	หอมญี่ปุ่น	37.48	ND	22.97	35.75
11	นายพะติ	หอมญี่ปุ่น	44.19	<2.00	23.33	23.16

ลำดับ	เกษตรกร	พืช	โลหะหนัก (ppm)			
			As	Cd	Cr	Pb
			≤ 30	≤0.15	≤ 80	≤ 55
12	นางรัศมี มาเมือง	กะหล่ำปลี	41.64	ND	36.85	30.49
13	นายก้าน	มะเขือเทศ	54.66	<2.00	21.11	68.73
14	นายณัฐพล	มันฝรั่ง	58.33	<2.00	55.26	23.73
15	นายชัยวัฒน์	มะเขือเทศ	58.91	<2.00	56.46	32.61
16	นายวรวิทย์ แสงอย่าง	มะเขือเทศเชอร์รี่	74.05	ND	55.42	37.71
17	นายชัยวัฒน์	กะหล่ำปลี	83.68	<2.00	46.81	43.93
18	นายสรพงษ์	หอมญี่ปุ่น	95.04	<2.00	22.57	37.79

ตารางที่ 29 ผลการสุ่มตรวจวิเคราะห์โลหะหนักในดินจากแปลงเกษตรกรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่ละออ

ลำดับ	เกษตรกร	พืช	โลหะหนัก (ppm)			
			As	Cd	Cr	Pb
			≤ 30	≤0.15	≤ 80	≤ 55
1	นางโพธิ	หอมญี่ปุ่น	<2.00	ND	16.72	16.32
2	นายพะยะเม้ง	หอมญี่ปุ่น	<2.00	ND	23.32	17.79
3	นางสุพรรณ	หอมญี่ปุ่น	<2.00	ND	24.67	15.38
4	เกรียงไกร	หอมญี่ปุ่น	<2.00	ND	19.24	18.31
5	ดินปาขมขน	บ้านแม่ละออ	2.12	ND	15.63	10.12
6	นายชัย	หอมญี่ปุ่น	2.34	ND	10.95	13.85
7	นายชะอุม	หอมญี่ปุ่น	2.42	ND	12.56	13.78
8	นายบุญเลิศ	เสาวรส	2.64	ND	16.74	18.41
9	นายสายัน กาไว	แปลงผสมผสาน	2.71	ND	12.3	12.92
10	นายสว่าง ปินคำ	แปลงผสมผสาน	3.4	ND	5.75	8.06
11	นายพะเลบือ พิชิตไพรพนา	หอมญี่ปุ่น	3.4	ND	24.35	12.82
12	นายบุญเลิศ	กล้วย/มะม่วง	5.56	ND	16.07	15.4
13	นายเกรียงไกร พิชิตไพรพนา	หอมญี่ปุ่น	5.63	ND	22.54	19.39
14	นายวิชัย ศิริธรากุล	หอมญี่ปุ่น	6.2	ND	57.56	10.92
15	นางชะอุม เจริญเกียรติมานะ	หอมญี่ปุ่น	6.93	ND	27.78	30.49

16	นายปัญญา สุนันตา	แปลงผสมผสาน	7.92	ND	17.71	17.42
17	นางสายทอง กู่ออ	ข้าวนา	20.59	ND	23.43	40.76
18	นายประทุม ปินคำ	มะเขือม่วง	24.63	ND	27.88	52.53
19	นายประทุม ปินคำ	ข้าวโพด	26.1	ND	27.26	47.07
20	นางวีไล	ฟักทอง/ผสมผสาน	45.04	ND	32.88	75.2
21	นายดวงแก้ว ปินคำ	อุ่น	46.51	ND	41.14	130
22	นางบัวไข สมนวน	ข้าวโพด	46.9	ND	34.9	160
23	นางเกษร ใจเดียม	มะเขือเทศ	53.09	ND	33.54	63.47

ตารางที่ 30 ผลการสุ่มตรวจวิเคราะห์โลหะหนักในดินจากแปลงเกษตรกรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงพหุพระ

ลำดับ	เกษตรกร	พืช	โลหะหนัก (ppm)			
			As	Cd	Cr	Pb
			≤ 30	≤ 0.15	≤ 80	≤ 55
1	นายปรีชา รักษ์แม่ละเมา	ข้าวไร่ (เปลี่ยนเป็นอุ่น)	5.9	ND	35.57	24.06
2	นายลี รักษ์แม่ละเมา	ข้าวไร่	11.34	ND	44.08	116
3	นายไพฑูย์ แซ่สง	กะหล่ำปลี	11.8	ND	18.71	84.58
4	นายเทห์ แซ่มี	ข้าวไร่	16.16	ND	27.01	211
5	นายสมชาย แซ่มี	ข้าวไร่	18.21	ND	36.73	76.62
6	นายประจักษ์ สิประกายพร	มะเขือเทศ	18.52	ND	25.56	143
7	นายชาติ วิชิตชัยเจริญ	ดอกหอม	18.67	ND	25.89	192
8	นายชูชัย สิประกายพร	เสาวรส	106	ND	14.95	27.55
9	นายใหม่ สิประกายพร	มะเขือเทศ	142	ND	26.91	37.81
10	นายแสง แซ่กือ	ดอกหอม	146	ND	20.15	43.67
11	นายประจักษ์ สิประกายพร	เสาวรส	161	ND	24.25	46.11

ตารางที่ 31 ผลการสุ่มตรวจวิเคราะห์โลหะหนักในผลผลิต

พื้นที่	เกษตรกร	พืช	โลหะหนัก (ppm)	
			As	Cd
ปางหินฝน	นายกะพะ	หอมญี่ปุ่น	<0.025	<0.018
	นายพะดี เก่งกล้าชาญกิจ	หอมญี่ปุ่น	ND	ND
	นายสุรโชค กุลสวัสดิ์มงคล	มะเขือเทศโหม้ส	ND	ND
	นางสุรดา ชูภูณพงศ์	มะเขือเทศเชอร์รี่	ND	ND
	ก้าน โชติชนันท์	มะเขือเทศห่อ	ND	ND
แม่ะล่อ	นางพือชัย ชัยพิบูลย์วงษ์	หอมญี่ปุ่น	ND	ND
	นายวิชัย สิริรากุล	หอมญี่ปุ่น	ND	ND
	นายข้อม เจริญเกียรติมานะ	หอมญี่ปุ่น	ND	<0.018
	นายวิชัย ศิริรากุล	หอมญี่ปุ่น	ND	ND

ตารางที่ 32 ผลการสุ่มตรวจวิเคราะห์โลหะหนักในปัจจัยการผลิต

ตัวอย่างปัจจัยการผลิต	พื้นที่	เกษตรกร	โลหะหนัก (ppm)			
			As	Cd	Cr	Pb
			≤50	≤5	≤300	≤500
ซีโก้เกลบ	ปางหินฝน	นายพะสะเว กิตติเดชอมร	2.34	0.18	2.18	1.52
ซีโก้เกลบ (จ้อ)	แม่ะล่อ (แม่ว่าก)	นางวีโล	3.17	0.21	1.54	1.4
ซีโก้	แม่ะล่อ (แม่ว่าก)	นายสายัญ กาไว	1.42	0.17	1.86	0.82
ซีโก้เลี้ยง	แม่ะล่อ (แม่ว่าก)	นางวีโล	2.67	<0.13	2.44	1.84
ซีโก้	แม่ะล่อ	นายพะแลบือ พิธิไพรพนา	2.82	<0.13	1.74	1.72
ซีโก้	ปางหินฝน	นายพะสะเว กิตติเดชอมร	6.99	<0.13	2.67	10.35
ซีโก้	ปางหินฝน	นายสุรโชค กุลสวัสดิ์มงคล	2.35	0.15	1.27	1.55
ซีโก้	ปางหินฝน	นายก้าน โชติชนันท์	3.34	0.28	1.67	2.54
ซีโก้	พบพระ	นายไพบูลย์ แซ่โซ้ง	1.96	0.22	3.32	1.16
ซีวีว	ผาผึ้ง ศรีศิริรักษ์	นายธนากร	4.8	<0.13	3.69	3.59
ซีวีว	ปางหินฝน	ศูนย์ปางหินฝน	2.95	<0.13	5.13	3.32
ซีวีว	แม่ะล่อ (แม่ว่าก)	นางวีโล	7.53	0.54	4.08	2.32
ปุ๋ยหมัก	แม่ะล่อ (แม่ว่าก)	พะสะเมิง	ND	ND	1.45	1.11
ปุ๋ยหมัก	แม่ะล่อ (แม่ว่าก)	นางวีโล	2.32	<0.13	4.75	4.21

ตารางที่ 33 ผลการสุ่มตรวจวิเคราะห์โลหะหนักในปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์ทางการค้า

ตัวอย่างปัจจัยการผลิต	พื้นที่	เกษตรกร	โลหะหนัก (ppm)			
			As	Cd	Cr	Pb
			≤50	≤5	≤300	≤500
13-13-21 หัววัวคั่นไค	แม่ะมอล (แม่ะวาก)	นายสว่าง ปินตา	8.22	0.22	0.57	9.84
16-20- 0 กระต่าย	แม่ะมอล (แม่ะวาก)	นายสว่าง ปินตา	0.66	ND	0.64	ND
25-7-7 เรือใบไวก็้ง	ปางหินฝน	ศูนย์ปางหินฝน	21.78	ND	3.24	3.54
15-15-15 หัววัวคั่นไค	ปางหินฝน	ศูนย์ปางหินฝน	10.7	0.16	6.89	0.66
46-0-0 กระต่าย	ปางหินฝน	ศูนย์ปางหินฝน	ND	ND	1.2	<0.13
8-24-24 เรือใบไวก็้ง	ปางหินฝน	ศูนย์ปางหินฝน	15.55	0.47	11.98	0.76
ปุ๋ยพญานาค	ปางหินฝน	ศูนย์ปางหินฝน	15.66	1.85	15.24	28.31
ปุ๋ยพญานาค			12.37	3.66	20.78	51.4
ปุ๋ยแจ๊ค			1.97	0.14	18.15	3.4
ปุ๋ยค้ำควาชากระดูก			13.02	0.44	17.21	12.56

2) ทดสอบเทคโนโลยีการลดปริมาณโลหะหนักอาซิติกในดินร่วมกับเกษตรกร

วิเคราะห์ปริมาณ อาซิติกในรูป 1) ปริมาณอาซิติกทั้งหมด 2) อาซิติกที่ละลายน้ำได้ดีและเข้าสู่พืชได้ 3) อาซิติกที่ละลายน้ำได้ดีที่อยู่ในภาวะจำเพาะจับตัวกันอย่างหลวมๆ 4) อาซิติกในรูปที่เสถียรจับกันอย่างแข็งแรง จากตัวอย่างดินในแปลงเกษตรกร จากโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางหินฝน ในแปลงปลูกมะเขือเทศและกะหล่ำปลี จำนวน 4 ตัวอย่าง จากตารางที่ 34 โดยส่วนใหญ่แล้ว อาซิติกจะอยู่ในรูปปริมาณอาซิติกทั้งหมด และอยู่ในรูปที่จับกันแข็งแรง ซึ่งอยู่ในรูปที่พืชดูดไปใช้ได้ยาก

ตารางที่ 34 ผลวิเคราะห์ปริมาณอาซินิกในดิน 4 รูป ก่อนการทดสอบการลดปริมาณโลหะหนักอาซินิกในดิน

เจ้าของแปลง	พื้นที่	พืช	Total As (mg/kg)	Soluble As (mg/kg)	As ที่จับตัวกัน อย่างหลวมๆ (mg/kg)	As ในรูป ที่จับกัน แข็งแรง (mg/kg)
นายสุรโชค กุลสวัสดิ์มงคล	ปางหินฝน	มะเขือเทศ	16.23	ND	ND	5.94
นายชัยวัฒน์ แสงยาว	ปางหินฝน	มะเขือเทศ	108.08	ND	ND	18.65
นายยงยุทธ กุลสวัสดิ์มงคล	ปางหินฝน	กะหล่ำปลี	41.74	ND	ND	6.01
นายกัน โชคขวานันท์	ปางหินฝน	กะหล่ำปลี	42.95	ND	0.09	9.99

ดำเนินการทดสอบในแปลงเกษตรกร จำนวน 2 ราย คือ นายสุรโชค กุลสวัสดิ์มงคล และ นายกัน โชคขวานันท์ ผลการวิเคราะห์ดินเบื้องต้นก่อนการทดสอบ พบว่า ดินทั้ง 2 แปลงเป็นกรดรุนแรงมาก (3.88-4.02) ปริมาณอินทรีย์วัตถุสูง (3.01-4.98%) ปริมาณไนโตรเจนสูง (0.15-0.25%) ความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวก อยู่ในระดับปานกลาง (16.45-16.54 meq/100g) ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์สูงมาก (264-352 mg/kg) ปริมาณโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้สูงมาก (207-268 mg/kg) ปริมาณแคลเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ (125-315 mg/kg) ปริมาณแมกนีเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ (19.75-26.86 mg/kg) เนื้อดินเป็นดินร่วนเหนียว

ตารางที่ 35 ผลวิเคราะห์คุณสมบัติดินเบื้องต้นก่อนการทดสอบการลดปริมาณโลหะหนักอาซินิกในดิน

รายการ	เกษตรกร	
	นายสุรโชค กุลสวัสดิ์มงคล	นายกัน โชคขวานันท์
pH	4.02	3.88
OM (%)	4.98	3.01
N (%)	0.25	0.15
CEC (meq/100g)	16.54	16.45
P (ppm)	352.17	264.33
K (ppm)	268.75	207.13
Ca (ppm)	125.3	315.7
Mg (ppm)	19.75	26.86
Texture	Clay Loam	Clay Loam

ทดสอบเทคโนโลยีหรือวิธีการลดการปนเปื้อนโลหะหนักอาซินิก ในดินร่วมกับเกษตรกร โดยวางแผนการทดสอบแบบ T-test แบ่งเป็น 2 กรรมวิธี จำนวน 3 ซ้ำ ดังนี้

กรรมวิธีที่ 1 วิธีการของเกษตรกร (แปลงควบคุม)

กรรมวิธีที่ 2 เทคโนโลยีการลดปริมาณโลหะหนัก อาซินิก ในดินจากผลงานวิจัย (การใช้ชีวภัณฑ์ การใช้สารปรับปรุงดิน กำหนดชนิดปัจจัยการผลิตที่จะใช้ในการปลูกพืช)

ซึ่งมีนายสุรโชค กลสวัสดิ์มงคล ที่จะดำเนินการปลูกมะเขือเทศ ส่วนนายก้านจะปลูกกะหล่ำปลี ในปลายปี 2561 จึงได้นำวิธีการที่ลดโอกาสในการดูดโลหะหนักของพืชปลูก โดยการบำบัดดินด้วยเชื้อแบคทีเรีย ไอโซเลท Ars.29 ร่วมกับการใช้ปุ๋ย และสารตรึงโลหะหนัก เช่น เฟอร์รัสซัลเฟต (FeSO_4) โดยให้เกษตรกรนำไปรองกันหลุม และใช้เฟอร์รัสซัลเฟตพ่นหลังปลูกพืชแล้ว หลังจากนั้นจึงเก็บผลผลิตพืช แบ่งเป็น ส่วนราก ต้น และผลผลิต และดินหลังปลูกไปวิเคราะห์โลหะหนักอีกครั้ง ซึ่งพบว่า ในดินปลูกมะเขือเทศยังพบอาซิโนในรูปอาซิโนทั้งหมด รองลงมาในรูปอาซิโนในรูปที่เสถียรจับกันอย่างแข็งแรง ส่วน อาซิโนที่ละลายน้ำได้ดีและเข้าสู่พืชได้ และอาซิโนที่ละลายน้ำได้ที่อยู่ในภาวะจำเพาะจับตัวกัน อย่างหลวมๆพบปริมาณเพียงเล็กน้อย ในส่วนของพืชพบอาซิโนในรูปอาซิโนทั้งหมดในส่วนของรากมากที่สุด 3.19 mg/kg และลำต้นเพียง 0.1 mg/kg ส่วนในผลผลิตมะเขือเทศไม่พบปริมาณอาซิโนในผลผลิต ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีการดูดอาซิโนจากดินขึ้นไปสู่พืชไม่มีผลต่อผลผลิตพืช ซึ่งมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค

ตารางที่ 36 ผลวิเคราะห์ดินและพืชหลังการทดสอบการลดปริมาณโลหะหนักอาซิโนในดิน

ดิน/พืช	Total As (mg/kg)	Soluble As (mg/kg)	As ที่จับตัวกัน อย่างหลวมๆ (mg/kg)	As ในรูปที่จับกัน แข็งแรง (mg/kg)
ดิน มะเขือเทศ	55.55	0.02	0.01	18.64
ราก มะเขือเทศ	3.19	NA	NA	NA
ต้น มะเขือเทศ	0.1	NA	NA	NA
ผล มะเขือเทศ	ND	NA	NA	NA



ภาพที่ 16 การใช้เชื้อแบคทีเรีย ไอโซเลท Ars.29 ร่วมกับการใช้ปุ๋ย ในแปลงปลูกมะเขือเทศ



ภาพที่ 17 แปลงทดสอบวิธีการลดการปนเปื้อนโลหะหนักจากจีนิก ในดิน

แนวทางการลดปริมาณโลหะหนักในดินเพาะปลูกพืช

1. งด หรือ ลดใช้ ปุ๋ยจากการผลิตทางการเกษตรที่มีโลหะหนักปนเปื้อน เช่น ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช วัสดุปลูก/เพาะกล้า
2. ลดโอกาสในการดูดโลหะหนักของพืชปลูก โดยการบำบัดดินด้วยเชื้อแบคทีเรีย ไอโซเลท Ars.29 ร่วมกับการใช้ปุ๋ย และสารตรึงโลหะหนัก เช่น เฟอรัสซัลเฟต (FeSO_4) จากผลงานวิจัยโครงการศึกษาและทดสอบเทคโนโลยีการลดปริมาณโลหะหนักในดินบนพื้นที่สูง ของ ดร.ชูชาติ สันทรทรัพย์และคณะ
3. เลือกชนิดพืชปลูกที่ไม่ดูด หรือ ดูดโลหะหนักได้ในระดับต่ำ (หากจำเป็นต้องปลูกพืชในพื้นที่ที่มีการปนเปื้อนโลหะหนัก)

บทที่ 5

สรุปผลการวิจัย

1. ศึกษากระบวนการปลูกพืชและวิเคราะห์สมบัติดินในแปลงเกษตรกรบนพื้นที่สูง ดำเนินการใน 5 พื้นที่ ดังนี้

(1) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงพหุพระ

ระบบการปลูกพืช เนื่องจากสภาพการใช้ประโยชน์ในปัจจุบันใช้ในการปลูกพืชที่หลากหลายขึ้นอยู่กับตลาดบริโภค ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง มันฝรั่ง พืชผัก (กะหล่ำ ผักกาดขาวปลี ดอกหอม ขาโยเด่ พริกปลูกเลื่อนข้าวโพด) ถั่วเหลือง ดาวเรือง ไม้ผล สตรอเบอร์รี่ และพืชตระกูลถั่วต่างๆ ส่วนพืชส่งเสริม องุ่น เสาวรส อาโวคาโด

การจัดกลุ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน ดินจะอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนใหญ่ดินมีความเป็นกรดจัด ซึ่งมีปัญหาในการดูดใช้ธาตุอาหารของพืช และปริมาณแคลเซียม แมกนีเซียมที่ต่ำ ในทุกแปลงที่เก็บตัวอย่างซึ่งควรได้รับการจัดการ เบื้องต้นแนะนำให้จัดการดินโดยใช้โดโลไมท์หรือยิปซัม เพื่อเพิ่ม pH ให้เป็นประโยชน์ต่อการดูดใช้ธาตุอาหารพืช และการใช้โดโลไมท์ยังช่วยเพิ่มธาตุแคลเซียมและแมกนีเซียมในดิน

(2) พื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงผาหิรัญ

ระบบการปลูกพืชในพื้นที่ โดยส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่ดอน มีการปลูกพืชไร่ โดยเฉพาะข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ซึ่งเป็นพืชหลักที่สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร รองลงมาเป็นมันสำปะหลัง ถั่วเหลือง พริกขี้หนู และข้าวไร่ ซึ่งข้าวไร่จะปลูกไว้สำหรับบริโภค ส่วนพืชส่งเสริม ประกอบไปด้วย เสาวรส อาโวคาโด พักทองญี่ปุ่น ถั่วขาว

การจัดกลุ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน ดินส่วนใหญ่มีความอุดมสมบูรณ์ปานกลางจนถึงสูง แต่พบว่าบางแปลงที่ต้องมีการจัดการ ได้แก่แปลงของนายธนกร ที่จะปลูกองุ่น ดินเป็นกรดจัดมากปริมาณอินทรีย์วัตถุและไนโตรเจนปานกลาง และปริมาณแคลเซียมต่ำมาก โดยการปรับ pH และเพิ่มปริมาณอินทรีย์วัตถุ

(3) พื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยน้ำขาว

ระบบการปลูกพืช พืชอาหารหลักคือ ข้าวไร่ ซึ่งจะมีหลากหลายพันธุ์ ส่วนพืชที่สร้างรายได้ คือ กะหล่ำปลี ซึ่งใน 1 ปี จะปลูกในฤดูฝนและหนาว ทั้งนี้ขึ้นกับสภาพพื้นที่และแหล่งน้ำ นอกจากนี้งานส่งเสริมของสำนักพัฒนาได้สนับสนุนและถ่ายทอดองค์ความรู้ในการปลูกผักในโรงเรือน ได้แก่ มะเขือเทศ พริกหวาน ผักอินทรีย์ ส่วนไม้ผลจะมีเสาวรส อาโวคาโด องุ่น

การจัดกลุ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน ดินส่วนใหญ่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำถึงปานกลาง เนื่องจากดินค่อนข้างเป็นกรดจัด ปริมาณอินทรีย์วัตถุและไนโตรเจนปานกลาง และแคลเซียมแมกนีเซียมที่อยู่ในระดับต่ำ ซึ่งแปลงที่มีปัญหาที่ต้องมีการจัดการ คือแปลงของนายจ้อย ซึ่งเดิมเป็นพื้นที่ปลูกข้าวโพด แล้วจะนำไปปลูกผัก เนื่องจากดินเป็นกรดจัดมากปริมาณอินทรีย์วัตถุปานกลาง ไนโตรเจนปริมาณแคลเซียมและแมกนีเซียมต่ำ ดังนั้นควรปรับ pH โดยใช้โดโลไมท์ ซึ่งจะช่วยเพิ่มแคลเซียมและแมกนีเซียมให้แก่ดิน และควรเพิ่มปริมาณอินทรีย์วัตถุ โดยใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก หรือปลูกพืชตระกูลถั่วสลับกับปลูกผัก

4) พื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยก้งปลา

พืชที่เกษตรกรปลูกในพื้นที่ ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ข้าวไร่ ข้าวนา หวาย สับปะรด ขิง ผักอินทรี และมิพืขงเสริมได้แก่ เสาวรส องุ่น จากการสอบถามเกษตรกรส่วนใหญ่ไม่ได้รับการปรับปรุงบำรุงดินมีการใช้ที่ดินอย่างต่อเนื่องในทุกปี แปลงที่เคยปลูกพืชซ้ำหลายปีส่งผลทำให้ผลผลิตไม่ต่ำ ส่วนการใช้ปุ๋ยขึ้นกับกำลังในการซื้อของเกษตรกรและชนิดพืช

การจัดกลุ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน ดินส่วนใหญ่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำถึงปานกลาง เนื่องจากดินค่อนข้างเป็นกรดจัดมาก ปริมาณอินทรีย์วัตถุและไนโตรเจนปานกลาง และฟอสฟอรัสต่ำแคลเซียมและแมกนีเซียมต่ำมาก ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อเจริญเติบโตของพืช โดยเฉพาะเสาวรส แปลงของนายกร ที่มีธาตุอาหารในดินต่ำมาก อีกทั้งดินค่อนข้างเป็นทราย จึงต้องมีการจัดการในการบำรุงดินและการใช้ปุ๋ยให้เหมาะสมสภาพดิน

5) พื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางหินฝน

พืชที่เกษตรกรปลูกในพื้นที่ ได้แก่ ข้าวโพด ข้าวไร่ ข้าวนา พืชผัก เช่น หอมญี่ปุ่น กระหล่ำปลี ขาวปลี มันฝรั่ง หอมแดงมะเขือเทศ และกาแฟ ต่อเนื่องกัน ทุกปี

การจัดกลุ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน มีความอุดมสมบูรณ์ปานกลางถึงสูง ส่วนใหญ่เป็นดินที่ปลูกพืชผัก มีปริมาณฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมในดินมีปริมาณสูงมาก อาจเนื่องจากการใช้ปุ๋ยเคมีติดต่อกันเป็นระยะเวลานานทำให้ยังมีตกค้างอยู่ในดิน

2. การทดสอบเทคโนโลยีการฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดินบนพื้นที่สูง

1) การทดสอบเทคโนโลยีการฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดินในแปลงข้าวไร่ ได้จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ (คูรับน้ำขอบเขา ร่วมกับปลูกหญ้าแฝกขวางความลาดชัน) การปลูกข้าวไร่ร่วมกับถั่วลันเตา การปลูกพืชตระกูลถั่วสลับกับปลูกข้าวไร่เพื่อลดรอบการหมุนเวียนพื้นที่ปลูกข้าวไร่ พบว่าแปลงที่ปลูกข้าวไร่ร่วมกับถั่วลันเตาส่งผลให้ผลผลิตข้าวไร่เพิ่มขึ้น

2) การทดสอบเทคโนโลยีการฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดินในแปลงมันสำปะหลัง โดยปลูกถั่ว 4 ชนิด (ถั่วเขียว ถั่วลิสง ถั่วดำ และถั่วพราง) ระหว่างแถวมันสำปะหลัง ซึ่งพบว่าการตัดต้นถั่วดำที่มีอายุ 45 วันคลุมแปลง และการปลูกถั่วพรางมีการเจริญเติบโตดี กว่ากรรมวิธีอื่น ๆ

3) การทดสอบเทคโนโลยีการฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดินในแปลงข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ได้จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ (คูรับน้ำขอบเขา ร่วมกับปลูกหญ้าแฝกขวางความลาดชัน) และปลูกข้าวโพดเหลืองด้วยพืชตระกูลถั่ว โดยแปลงนางอ้วน ผลผลิตข้าวโพดจากแปลงที่ปลูกถั่วนี้วางแดงให้ผลผลิตสูงสุด รองลงมาคือแปลงปลูกถั่วลันเตา และปลูกถั่วดำ ส่วนแปลงนายชัย พบว่าผลผลิตข้าวโพดจากแปลงที่ปลูกถั่วลันเตาให้ผลผลิตสูงสุด รองลงมาคือแปลงปลูกถั่วดำและปลูกถั่วนี้วางแดง

4) การทดสอบเทคโนโลยีการฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดินในแปลงหอมญี่ปุ่น โดยการจัดการธาตุอาหารให้เหมาะสมและการปลูกพืชตระกูลถั่วหลังปลูกหอมญี่ปุ่น ผลการทดสอบพบว่าผลผลิตจากแปลงทดสอบมีปริมาณผลผลิตเพิ่มจากแปลงควบคุม 10 - 38% หลังจากเก็บผลผลิตหอมญี่ปุ่นออกจากแปลงจึงปลูกถั่วดำเพื่อบำรุงดิน ซึ่งถั่วดำมีการเจริญเติบโตดีมาก

ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดำเนินการทดสอบในปีแรก จะดำเนินงานต่อเนื่องเพื่อเก็บข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของดินและผลผลิตพืช ในปี 2562 ต่อไป

3. ศึกษาวิธีการลดการปนเปื้อนโลหะหนัก (อาซินิก) ในดินเพาะปลูกพืชบนพื้นที่สูง

โดยนำวิธีการจากผลงานวิจัยโครงการศึกษาและทดสอบเทคโนโลยีการลดปริมาณโลหะหนักในดินบนพื้นที่สูง ของ ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์และคณะมาทดสอบ โดยการใช้เชื้อแบคทีเรีย ไอโซเลท Ars.29 ร่วมกับการใช้ปูนใส่ร่อนกันหลุมก่อนปลูก หลังปลูกพืช 7 วันใช้สารตรึงโลหะหนัก คือ เพอร์รัสซัลเฟต (FeSO_4) พบว่า ในดินปลูกมะเขือเทศยังพบอาซินิกในรูปอาซินิกทั้งหมด รองลงมาในรูปอาซินิกในรูปที่เสถียรจับกันอย่างแข็งแรง ส่วนอาซินิกที่ละลายน้ำได้ดีและเข้าสู่พืชได้ และอาซินิกที่ละลายน้ำได้ที่อยู่ในภาวะจำเพาะจับตัวกันอย่างหลวมๆพบปริมาณเพียงเล็กน้อย ในส่วนของพืชพบอาซินิกในรูปอาซินิกทั้งหมดในส่วนของรากมากที่สุด 3.19 mg/kg และลำต้นเพียง 0.1 mg/kg ส่วนในผลผลิตมะเขือเทศไม่พบปริมาณอาซินิกในผลผลิต ซึ่งจะเห็นได้ว่าการดูดอาซินิกจากดินขึ้นไปสู่พืชไม่มีผลต่อผลผลิตพืช ซึ่งมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค

