





























## ภาคผนวกที่ 1








รายชื่อพืชท้องถิ่นที่มีการใช้ประโยชน์ที่สำรวจพบบริเวณป่าชุมชนและพื้นที่การเกษตร







| ชื่อวิทยาศาสตร์                                   | UV   | ชื่อทั่วไป  | ชื่อท้องถิ่น   | รูปภาพ  | ส่วนที่ใช้: การใช้ประโยชน์   | ประเภท |         |          |       |       |
|---|------|-------------|----------------|---|--|--------|---------|----------|-------|-------|
|   |      |             |                |   |  | อาหาร  | สมุนไพร | เศรษฐกิจ | วัสดุ | อื่นๆ |
| <b>1. วงศ์ Acanthaceae</b>                        |      |             |                |   |  |        |         |          |       |       |
| <i>Peristrophe</i> sp.                            | 1.00 |             | เนาะ จีเดาะ    |    | ใบ และยอด: แกง หรือใส่ข้าวเบาะ   | √      |         |          |       |       |
| <i>Pseuderanthemum graciliflorum</i> (Nees) Ridt. | 1.00 |             | เดาะ ปือเดาะ   |    | ใบ และยอด: แกง หรือใส่ข้าวเบาะ   | √      |         |          |       |       |
| <i>Thunbergia laurifolia</i> Lindl.               | 1.67 | รางจืด      | เจ้าชะลอ ตีเดอ |   | เถาสด: มัดเหนือบริเวณที่ถูกกัด จะทำให้พืชงอหายไป<br>ลำต้น: ตัดเป็นท่อนๆ แล้วนํานํ้าหยอดใส่ตา แก้กตาอักเสบ มีฝิ่นผงเข้าตา และต้มดื่มแก้ปวดเมื่อยร่างกาย | √      |         |          |       |       |
| <b>2. วงศ์ Actinidiaceae</b>                      |      |             |                |   |  |        |         |          |       |       |
| <i>Saurauia roxburghii</i> Wall.                  | 1.00 | ล้านเห็บ    | โชะแปะที่ ปอ   |  | ทุกส่วนของต้น โดยเฉพาะราก และลำต้น ใช้ต้มนํ้าดื่ม ร่วมกับต้นอื่นๆ แก้ปวดเมื่อยตามร่างกาย ผลสุบรับประทานเป็นผลไม้ มีรสหวาน                              | √      |         |          |       |       |
| <b>3. วงศ์ Alangiaceae</b>                        |      |             |                |   |  |        |         |          |       |       |
| <i>Alangium chinense</i> Rehder                   | 1.00 | ผีเสื้อ     | พอ ลีจ้อ       |  | ลำต้น: ใช้สร้างบ้าน  |        |         |          | √     |       |
| <b>4. วงศ์ Alliaceae</b>                          |      |             |                |   |  |        |         |          |       |       |
| <i>Allium chinense</i> G.Don                      | 1.00 | กระเทียมจีน | เต้อะเกลอ      |  | ใบ และหัว: ใช้เป็นเครื่องเทศ ให้กลิ่นหอม   | √      |         |          |       |       |
| <i>Allium hookeri</i> Thwaites                    | 1.00 | หอมชู       | หล่ากา         |  | ราก และใบ: ใช้ตำนํ้าพริก   | √      |         |          |       |       |
| <i>Allium sativum</i> L.                          | 1.71 | กระเทียม    | เหมอะเซอชะ     |  | หัว: คั้นนํ้าแล้วใช้หยอดแก้อาการคัน หรือนํ้าไปผสมกับเกลือ ทานเป็นยาแก้ท้องอืด ใช้เป็นเครื่องเทศ ให้กลิ่นหอม และมีสรรพคุณลดความดันโลหิต                 | √      | √       |          |       |       |







| ชื่อวิทยาศาสตร์  | UV   | ชื่อทั่วไป  | ชื่อท้องถิ่น | รูปภาพ  | ส่วนที่ใช้: การใช้ประโยชน์   | ประเภท |         |              |       |       |
|--|------|-------------|--------------|---|--|--------|---------|--------------|-------|-------|
|  |      |             |              |   |  | อาหาร  | สมุนไพร | เครื่องสำอาง | วัสดุ | อื่นๆ |
| <b>5. วงศ์ Amaranthaceae</b>                                   |      |             |              |   |  |        |         |              |       |       |
| <i>Iresine herbstii</i> Hooker ex Lindley                      | 1.00 | ผักแพวแดง   |              |    | ใบสด: นำมาคั้น ใช้ น้ำที่ได้ใส่แผลสด หรือแผลไฟไหม้   |        | √       |              |       |       |
| <b>6. วงศ์ Anacardiaceae</b>                                   |      |             |              |   |  |        |         |              |       |       |
| <i>Gluta usitata</i> (Wall.) Ding Hou                          | 1.00 | รัก         | ชู           |    | น้ำยาง: ใช้เคลือบภาชนะ และเครื่องใช้ต่างๆ ให้มีสีตา เพื่อให้มีความทนทานมากยิ่งขึ้น   |        |         |              | √     |       |
| <i>Mangifera indica</i> L.                                     | 1.14 | มะม่วงง     | ตะเคาะ       |    | เปลือก: นำมาใช้ทำสีย้อมผ้า ให้สีเขียวอ่อน และนำมาอังไฟให้ร้อน ใช้พอกบริเวณที่เป็นตุ่มหนอง ใช้ได้ทั้งในคน และสัตว์เลี้ยง<br>ผลสุก: รับประทานเป็นผลไม้ มีรสเปรี้ยว           |        | √       |              | √     |       |
| <i>Mangifera odorata</i> Griff.                                | 1.43 | มะม่วงป่า   | ตะเคาะชี     |   | ผลสุก: รับประทานเป็นผลไม้ มีรสเปรี้ยว<br>ลำต้น: ใช้สร้างบ้าน   | √      |         |              | √     |       |
| <b>7. วงศ์ Anacardiaceae</b>                                   |      |             |              |   |  |        |         |              |       |       |
| <i>Rhus javanica</i> L. var. <i>chinensis</i> (Mill.) T.Yamaz. | 1.43 | ส้มผด       | เสะลี        |  | ลำต้น: ใช้ทำเครื่องดนตรี ประเภทเครื่องเป่า เช่น แตร และขลุ่ย<br>ผลสุก: รับประทานเป็นผลไม้ มีรสเปรี้ยว  | √      |         |              | √     |       |
| <b>8. วงศ์ Annonaceae</b>                                      |      |             |              |   |  |        |         |              |       |       |
| <i>Desmos macrocarpus</i> Ban                                  | 1.60 | สายหยุตใหญ่ | พอเตอะก้วยมี |  | ราก: ต้มน้ำดื่ม รักษาอาการไอ แน่นหน้าอก หรือหายใจขัด<br>ลำต้น: ต้มน้ำดื่ม แก้อาการปัสสาวะขัด และต้มน้ำดื่ม แก้อาการร้อนใน  |        | √       |              | √     |       |
| <b>9. วงศ์ Apiaceae</b>  |      |             |              |   |  |        |         |              |       |       |
| <i>Hydrocotyle javanica</i> Thunb.                             | 2.00 | ใบบัวบกคอย  | เกอชอโพเด    |  | ทั้งต้น: ต้มน้ำดื่ม แก้อาการปวดเมื่อยตามร่างกาย แก้อาการท้องอืด และแก้อาการวิงเวียนศีรษะ<br>ใบ: ใช้เป็นผักเคียงน้ำพริก และตำให้ละเอียด แล้วคั้นเอาน้ำใส่แผล ตอนตัดสายสะดือ |        | √       |              | √     |       |
| <i>Trachyspermum roxburghianum</i> (de Candolle) H. Wolff      | 1.14 | ผักชีล้อม   | พะอโต๊ะ      |  | ทั้งต้น: เป็นอาหารสุกร<br>ใบ: ใส่ในแกงให้มีกลิ่นหอม และดับคาวหรือรับประทานเป็นผักเคียงน้ำพริก  | √      |         |              |       | √     |







| ชื่อวิทยาศาสตร์                          | UV   | ชื่อทั่วไป | ชื่อท้องถิ่น | รูปภาพ  | ส่วนที่ใช้: การใช้ประโยชน์   | ประเภท |         |              |       |       |
|--|------|------------|--------------|---|--|--------|---------|--------------|-------|-------|
|  |      |            |              |   |  | อาหาร  | สมุนไพร | เครื่องสำอาง | วัสดุ | อื่นๆ |
| <b>10. วงศ์ Apocynaceae</b>              |      |            |              |   |  |        |         |              |       |       |
| <i>Alstonia rostrata</i> Fischer         | 1.71 | น้องขาว    | โน           |    | น้ำยางสด: ต้มแก้ปวดหลัง และปวดเอว<br>เปลือกมาแช่น้ำ ต้มแก้ปวดหลัง และปวดเอว แก้ไข้<br>ลำต้น ใช้สร้างบ้าน             |        | ✓       |              |       | ✓     |
| <b>11. วงศ์ Araceae</b>                  |      |            |              |   |  |        |         |              |       |       |
| <i>Acorus calamus</i> L.                 | 1.17 | ว่านน้ำ    | พ้อ ปือละ    |    | ทั้งต้น: ต้มน้ำ แล้วนำมาพันรอบมือ และเท้าเด็ก เพื่อแก้ไข้ หรือทุบแล้วแช่น้ำ ให้เด็กอาบ เพื่อแก้ไข้                   |        | ✓       |              |       |       |
| <i>Amorphophallus</i> sp. 1              | 1.00 | บุก        | เคอ ตี       |   | หัว: ใช้เป็นอาหารสุกร และนำมาประกอบอาหาร   | ✓      |         |              |       | ✓     |
| <i>Amorphophallus</i> sp. 2              | 1.00 |            | เบ้าะพ้อ     |  | ซอดดอก: แกงเป็นอาหาร   | ✓      |         |              |       |       |
| <b>12. วงศ์ Araceae</b>                  |      |            |              |   |  |        |         |              |       |       |
| <i>Colocasia esculenta</i> Schott var. 1 | 1.43 |            | กะทีกะเนอ    |  | ดอก และหัว: แกงเป็นอาหาร แต่ต้องใส่พืชที่มีรสเปรี้ยวลงไปด้วย เพื่อป้องกันอาการคัน<br>ลำต้นใต้ดิน เป็นอาหารเลี้ยงสุกร | ✓      | ✓       |              |       | ✓     |
| <i>Pothos chinensis</i> (Raf.) Merr.     | 1.29 | ทองงูม     | จ้อจือมือ    |  | ทั้งต้น ใช้เป็นอาหารเลี้ยงสุกร หรือต้มน้ำ ต้มแก้โรคใบหวาน และแก้ปวดเมื่อยตามร่างกาย                                  |        | ✓       |              |       | ✓     |

| ชื่อวิทยาศาสตร์                             | UV   | ชื่อทั่วไป | ชื่อท้องถิ่น | รูปภาพ  | ส่วนที่ใช้: การใช้ประโยชน์   | ประเภท |         |              |       |       |  |   |  |   |
|---|------|------------|--------------|---|--|--------|---------|--------------|-------|-------|--|---|--|---|
|   |      |            |              |   |  | อาหาร  | สมุนไพร | เครื่องสำอาง | วัสดุ | อื่นๆ |  |   |  |   |
| <b>13. วงศ์ Araliaceae</b>                  |      |            |              |   |  |        |         |              |       |       |  |   |  |   |
| <i>Schefflera</i> sp.                       | 1.00 |            | เซะ จี โกะ   |    | ยอดอ่อน: แกงเป็นอาหาร  | √      |         |              |       |       |  |   |  |   |
| <i>Trevesia palmata</i> Vis.                | 1.00 | ต่าง หลวง  | กี ลอ        |    | ดอกอ่อน: แกงเป็นอาหาร หรือต้มเป็นผักเคียงน้ำพริก                                       | √      |         |              |       |       |  |   |  |   |
| <b>14. วงศ์ Arecaceae</b>                   |      |            |              |   |  |        |         |              |       |       |  |   |  |   |
| <i>Livistona speciosa</i> Kurz              | 2.14 | ค้อ        | โล ละ        |   | ใบ: ใช้ทำหลังคา<br>ผล: ต้มให้สุก ใช้เนื้อผล ทานคู่กับหมาก                              | √      |         |              |       |       |  | √ |  |   |
| <b>15. วงศ์ Aspleniaceae</b>                |      |            |              |   |  |        |         |              |       |       |  |   |  |   |
| <i>Asplenium unilaterale</i> Lamk.          | 1.14 |            | นอ ที ละ     |  | ใบ: นำมาใส่อาหารประเภทแกง หรือต้มเพื่อให้มีรสหวาน                                      | √      |         |              |       |       |  |   |  |   |
| <b>16. วงศ์ Asteraceae</b>                  |      |            |              |   |  |        |         |              |       |       |  |   |  |   |
| <i>Acmella oleracea</i> (L.) R.K.Jansen     | 1.71 | ผักคราด    | เนาะ เตอ มี  |  | ทั้งต้น: ใช้เป็นอาหารเลี้ยงสุกร<br>ใบ: ต้มเป็นผักเคียงน้ำพริก<br>รากสด: ใช้อมแก้ปวดฟัน | √      |         |              | √     |       |  |   |  | √ |
| <i>Acmella cf. oleracea</i> (L.) R.K.Jansen | 1.14 |            | เนาะ เตอ โตะ |  | ยอด: แกงเป็นอาหาร หรือลวก เป็นผักเคียงน้ำพริก<br>รากสด: ใช้อมแก้ปวดฟัน                 | √      |         |              |       | √     |  |   |  |   |







| ชื่อวิทยาศาสตร์   | UV   | ชื่อทั่วไป  | ชื่อท้องถิ่น   | รูปภาพ  | ส่วนที่ใช้: การใช้ประโยชน์   | ประเภท |         |              |       |       |
|---|------|-------------|----------------|---|--|--------|---------|--------------|-------|-------|
|   |      |             |                |   |  | อาหาร  | สมุนไพร | เครื่องสำอาง | วัสดุ | อื่นๆ |
| <i>Ageratina adenophora</i> (Spreng.) R.M.King & H.Rob. | 1.71 | สาบหมา      | เซะโพะยกวี ก้อ |    | ใบ: ลนไฟ แล้วนำมาประคบศีรษะ แก้ อาการปวด หรือวิงเวียน หรือทุบคั้นเอาน้ำ เพื่อใส่แผลสด เพื่อห้ามเลือด ราก: ต้มน้ำดื่มแก้ปวดเมื่อยตามร่างกาย   |        | ✓       |              |       |       |
| <i>Blumea balsamifera</i> (L.) DC.                      | 1.57 | หนาดหลวง    | พอป่า ล๊ะ      |    | ทั้งต้น: นำมาแช่น้ำ หรือต้มน้ำ ดื่มแก้ปวดหลัง ปวดเอว<br>ใบ: นำมาตำให้ละเอียด แล้วคั้นน้ำดื่ม แก้ ไข้ และหวัด หรือนำมาอังไฟ แล้วปูพื้น นอนทับ แก้อาการปวดหลัง หากนำมา ประคบศีรษะ จะช่วยแก้อาการวิงเวียน |        | ✓       |              |       |       |
| <i>Crassocephalum crepidioides</i> (Benth.) S.Moore     | 1.67 | ผักกาดช้าง  | เนาะเซาะแบล    |    | ทั้งต้น: ใช้เป็นอาหารสุกร<br>ยอดอ่อน: รับประทานสดเป็นผักเคียง น้ำพริก  | ✓      |         |              |       | ✓     |
| <i>Elaphantopus scaber</i> L.                           | 1.00 | โตไม่รู้ล้ม | สี่พ้อแกร      |   | ราก: ต้มน้ำดื่ม รักษาอาการปัสสาวะขัด และนิ่ว   |        | ✓       |              |       |       |
| <i>Gochnatia decora</i> (Kurz) Cabr.                    | 1.00 | ยาแก้       |                |  | ใบ: คั้นน้ำ<br>ใส่แผลสด เพื่อห้ามเลือด   |        | ✓       |              |       |       |
| <i>Praxelis clematidea</i> (Griseb.) R.M.King & H.Rob   | 1.60 | สาบแมว      | ชีโพ ก้วย      |  | ใบ: เป็นส่วนประกอบของยาต้ม เพื่อรักษา อาการปวดหลัง ปวดเอว  |        | ✓       |              |       |       |
| <i>Vernonia</i> sp.                                     | 1.00 |             | ตยะ ชีคยะ      |  | ลำต้น: ต้มน้ำดื่ม เป็นยาเจริญอาหาร   |        | ✓       |              |       |       |









| ชื่อวิทยาศาสตร์                               | UV   | ชื่อทั่วไป              | ชื่อท้องถิ่น          | รูปภาพ  | ส่วนที่ใช้: การใช้ประโยชน์   | ประเภท |         |              |       |       |
|---|------|-------------------------|-----------------------|---|--|--------|---------|--------------|-------|-------|
|   |      |                         |                       |   |  | อาหาร  | สมุนไพร | เครื่องสำอาง | วัสดุ | อื่นๆ |
| <b>17. วงศ์ Begoniaceae</b>                   |      |                         |                       |   |  |        |         |              |       |       |
| <i>Begonia</i> sp.                            | 1.00 |                         | สะ<br>ปลอ ชี          |    | ใบอ่อน: รับประทานสด หรือนำมาใส่แกง<br>มีรสเปรี้ยว  | √      |         |              |       | √     |
| <b>18. วงศ์ Betulaceae</b>                    |      |                         |                       |   |  |        |         |              |       |       |
| <i>Betula alnoides</i> Buch.-Ham. ex<br>G.Don | 1.29 | กำลัง<br>เสื่อ<br>โคร่ง | ชะ<br>กอ เว           |    | ราก หรือเปลือกต้น: ตองเหล้า ต้มเป็นยา<br>แก้อาการปวดเมื่อยตามร่างกาย และเป็น<br>ยาบำรุงกำลัง   |        | √       |              |       |       |
| <b>19. วงศ์ Bignoniaceae</b>                  |      |                         |                       |   |  |        |         |              |       |       |
| <i>Markhamia stipulata</i> Seem.              | 1.00 | แค<br>หาง<br>ค้าง       | หมะ<br>แควีระ         |   | ผลแก่: นำมาลวก เพื่อรับประทานเมล็ด<br>ด้านใน เป็นผักเคียงน้ำพริก<br>ดอก: ลวกรับประทานเป็นผักเคียงน้ำพริก   | √      |         |              |       |       |
| <i>Oroxylum indicum</i> (L.) Kurz             | 1.71 | เพกา                    | ดอ กะ                 |  | เปลือก และดอก: ให้โค หรือกระป๋อกิน<br>ช่วยถ่ายพยาธิ<br>ผล: ย่างไฟ รับประทานผักเคียงน้ำพริก<br>หรือลาบ<br>ดอก: ลวก หรือย่างไฟ ใช้เหมือนกับผล<br>ลำต้น: ต้มดื่มแก้โรคลงท้องในเด็ก<br>และใช้ เป็นยารักษาโรคมะเร็ง |        | √       |              | √     | √     |
| <b>20. วงศ์ Boraginaceae</b>                  |      |                         |                       |   |  |        |         |              |       |       |
| <i>Heliotropium indicum</i> L.                | 1.00 | หญ้า<br>วงช้าง          | เนาะ<br>ชอ ตีม<br>ล่อ |  | ทั้งต้น: ปล่อยให้ขึ้นในนา เพื่อให้ชาวมีย<br>ผลผลิตดี   |        |         |              |       | √     |
| <b>21. วงศ์ Brassicaceae</b>                  |      |                         |                       |   |  |        |         |              |       |       |
| <i>Brassica chinensis</i> L.                  | 1.00 | ผักก<br>วางตุ้ง         | บา<br>โต๊ะ            |  | ใบ: ใช้ประกอบอาหาร   | √      |         |              |       |       |









| ชื่อวิทยาศาสตร์                          | UV   | ชื่อทั่วไป | ชื่อท้องถิ่น | รูปภาพ  | ส่วนที่ใช้: การใช้ประโยชน์   | ประเภท |         |              |       |       |
|--|------|------------|--------------|---|--|--------|---------|--------------|-------|-------|
|  |      |            |              |   |  | อาหาร  | สมุนไพร | เครื่องสำอาง | วัสดุ | อื่นๆ |
| <i>Raphanus sativus</i> L.               | 1.00 | ผักกาดขาว  | พะ บี        |    | ใบ: ใช้เป็นผักประกอบอาหาร  | √      |         |              |       |       |
| <b>22. วงศ์ Bromeliaceae</b>             |      |            |              |   |  |        |         |              |       |       |
| <i>Ananas comosus</i> (L.) Merr.         | 1.14 | สับปะรด    | แห้ว สะ      |    | แกนผล: เป็นส่วนประกอบของยาต้มรักษาโรคตาลขมในเด็ก<br>ผลสุก: รับประทานเป็นผลไม้                  | √      | √       |              |       |       |
| <b>23. วงศ์ Campanulaceae</b>            |      |            |              |   |  |        |         |              |       |       |
| <i>Lobelia nummularia</i> Lam.           | 1.33 |            |              |   | ใบ: รับประทานเป็นผักเคียงน้ำพริก หรือนำไปใส่ ข้าวเบอะ  | √      |         |              |       |       |
| <b>24. วงศ์ Cannaceae</b>                |      |            |              |   |  |        |         |              |       |       |
| <i>Canna edulis</i> L.                   | 1.14 | สาธุ       | แอ โระ       |  | ใบ: ใช้สำหรับห่อข้าว<br>ลำต้นใต้ดิน: นำมาต้ม หรือนึ่ง รับประทานได้                             | √      | √       |              |       |       |
| <b>25. วงศ์ Capparaceae</b>              |      |            |              |   |  |        |         |              |       |       |
| <i>Crateva magna</i> (Lour.) DC.         | 1.00 | กุ่มน้ำ    | เนาะ ถาชี    |  | ยอด: นำไปตากแดดพอให้เหี่ยวแล้วนำมาแช่น้ำใส่เกลือลงไป สามารถนำมาจิ้ม น้ำพริกกิน หรือยำเป็นอาหาร | √      |         |              |       |       |
| <b>26. วงศ์ Caprifoliaceae</b>           |      |            |              |   |  |        |         |              |       |       |
| <i>Sambucus javanica</i> Reinw. ex Blume | 1.00 | สะพ้านกั๊น | เซ กลา จัง   |  | ใบ: นำมาลนไฟแล้วประคบบริเวณที่มีอาการปวด หรือใช้ทั้งต้นลนไฟแล้วนำมาปูนอน รักษาอาการปวดเช่นกัน  |        | √       |              |       |       |









| ชื่อวิทยาศาสตร์  | UV   | ชื่อทั่วไป  | ชื่อท้องถิ่น  | รูปภาพ  | ส่วนที่ใช้: การใช้ประโยชน์  | ประเภท |         |              |       |       |
|--|------|-------------|---------------|---|---|--------|---------|--------------|-------|-------|
|  |      |             |               |   |   | อาหาร  | สมุนไพร | เครื่องสำอาง | วัสดุ | อื่นๆ |
| <b>27. วงศ์ Caricaceae</b>                                       |      |             |               |   |   |        |         |              |       |       |
| <i>Carica papaya</i> L.  | 1.86 | มะละกอ      | โก จี สะ      |    | ใบ: ตากแห้ง เพื่อเป็นส่วนผสมในการทำหัวเชื้อเห็ด<br>ผลดิบ: เป็นอาหารสุกร หรือนำมาขูดไฟแล้วคั้นน้ำดื่มแก้อาการตัวบวม<br>ผลสุก: รับประทานเป็นผลไม้ | ✓      | ✓       | ✓            |       |       |
| <b>28. วงศ์ Chloranthaceae</b>                                   |      |             |               |   |   |        |         |              |       |       |
| <i>Sarcandra glabra</i> (Thunb.) Nakai spp. <i>brachystachys</i> | 1.00 | กระตูดกลิ้ง | พอ กอ ยี่     |    | ราก: ต้มน้ำดื่ม รักษาอาการหน้ามืด และเป็นส่วนผสมของการทำหัวเชื้อเห็ด  |        | ✓       |              |       | ✓     |
| <b>29. วงศ์ Clusiaceae</b>                                       |      |             |               |   |   |        |         |              |       |       |
| <i>Cratoxylum formosum</i> (Jack) Dyer                           | 1.00 | ตัวขาว      | ชะงอ ก้อย โฉว |   | ลำต้น: ใช้สร้างบ้าน   |        |         |              |       | ✓     |
| <i>Garcinia</i> sp.1   | 1.00 |             | เต๊าะ กว๊ะ    |  | ผลสุก: รับประทานเป็นผลไม้ มีรสเปรี้ยว แต่บางคนอาจแพ้ จะอาการเมาหัว  | ✓      |         |              |       |       |
| <b>30. วงศ์ Combretaceae</b>                                     |      |             |               |   |   |        |         |              |       |       |
| <i>Combretum</i> sp.   | 1.00 |             | กอ บอ เต๊าะ   |  | ราก: ต้มน้ำให้เด็กดื่ม รักษาอาการไข้  |        | ✓       |              |       |       |
| <b>31. วงศ์ Commelinaceae</b>                                    |      |             |               |   |   |        |         |              |       |       |
| <i>Commelina</i> sp.   | 1.43 |             | เตอ ไป เตาะ   |  | ทั้งต้น: ใช้เป็นอาหารเลี้ยงสุกร ยอด: แกงเป็นอาหาร   | ✓      |         |              |       | ✓     |




















| ชื่อวิทยาศาสตร์                       | UV       | ชื่อทั่วไป           | ชื่อท้องถิ่น           | รูปภาพ  | ส่วนที่ใช้: การใช้ประโยชน์   | ประเภท |         |              |       |       |
|---------------------------------------|----------|----------------------|------------------------|---|--|--------|---------|--------------|-------|-------|
|                                       |          |                      |                        |   |  | อาหาร  | สมุนไพร | เครื่องสำอาง | วัสดุ | อื่นๆ |
| <b>32. วงศ์ Convallariaceae</b>       |          |                      |                        |   |  |        |         |              |       |       |
| <i>Aspidistra</i> sp.                 | 1.5<br>0 |                      | หล้า<br>ปอ             |    | ช่อดอก: แกงเป็นอาหาร<br>ราก: ต้มน้ำดื่ม รักษาอาการปวดกล้ามเนื้อ<br>หัว: ต้มน้ำดื่ม แก้อาการปวดหัว และเป็น<br>ส่วนประกอบของยารักษาโรคมะเร็ง                   | ✓      | ✓       |              |       |       |
| <i>Tupistra albiflora</i> K.Larsen    | 1.5<br>0 | นาง<br>แลว           | รู มิ                  |    | ช่อดอก: แกงเป็นอาหาร<br>ใบ และราก: ทูบ แล้วลนไฟ ใช้ประคบบริเวณที่<br>เคล็ด ชัดยอก หรือกระดูกหัก  | ✓      | ✓       |              |       |       |
| <b>33. วงศ์ Convolvulaceae</b>        |          |                      |                        |   |  |        |         |              |       |       |
| <i>Cuscuta</i> sp.                    | 1.0<br>0 |                      | ซี คลิ<br>ป            |   | ทั้งต้น: ต้มน้ำดื่ม รักษาอาการดีซ่าน และรักษา<br>อาการท้องเสีย   |        | ✓       |              |       |       |
| <b>34. วงศ์ Costaceae</b>             |          |                      |                        |   |  |        |         |              |       |       |
| <i>Costus lacerus</i> Gagnep.         | 1.1<br>7 | เอื้อง<br>หมาย<br>นา | ชู เล<br>โบ ทู ชิ      |  | ลำต้นเทียม: ย่างไฟ แล้วบิดเอาน้ำหยอดหู แก้อูหู<br>น้ำหนวก หรือนำไปฉีดยา ทั้งไว้บนเตา จะทำให้หาย<br>เจ็บหู โดยต้องตัดให้มีความยาวเท่ากับส่วนสูงของ<br>ผู้ป่วย |        | ✓       |              |       |       |
| <i>Costus speciosus</i> (J.Konig) Sm. | 1.0<br>0 | เอื้อง<br>หมาย<br>นา | ชู เล<br>โบ ทู<br>โต๊ะ |  | ลำต้นเทียม: ย่างไฟ แล้วบิดเอาน้ำหยอดหู แก้อูหู<br>น้ำหนวก หรือนำไปฉีดยา ทั้งไว้บนเตา จะทำให้หาย<br>เจ็บหู โดยต้องตัดให้มีความยาวเท่ากับส่วนสูงของ<br>ผู้ป่วย |        | ✓       |              |       |       |
| <b>35. วงศ์ Cucurbitaceae</b>         |          |                      |                        |   |  |        |         |              |       |       |
| <i>Cucumis hystrix</i> Chakrav.       | 1.0<br>0 |                      | ซา กอ<br>แฮ            |  | ผลสด: รับประทานเป็นผักเคียงน้ำพริก หรือนำไป<br>ยำ มีรสเปรี้ยว  | ✓      |         |              |       |       |










| ชื่อวิทยาศาสตร์  | UV       | ชื่อทั่วไป               | ชื่อท้องถิ่น         | รูปภาพ  | ส่วนที่ใช้: การใช้ประโยชน์  | ประเภท |         |              |       |       |
|--|----------|--------------------------|----------------------|---|---|--------|---------|--------------|-------|-------|
|  |          |                          |                      |   |   | อาหาร  | สมุนไพร | เครื่องสำอาง | วัสดุ | อื่นๆ |
| <i>Cucumis sativus</i> L.  | 1.0<br>0 | แตง<br>อ่อม              | ตี่                  |    | ผล: รับประทานเป็นผักเคียงน้ำพริก หรือนำไปแกง  | ✓      |         |              |       |       |
| <i>Hodgsonia heteroclita</i> (Roxb.)<br>Hook.f. & Thomson subsp.<br><i>indochinensis</i> W. J. de Wilde &<br>Duyfjes | 1.0<br>0 | มะกั้ง                   | กะตะ                 |    | เมล็ดแก่: เผาไฟให้สุก แล้วนำเนื้อด้านใน (ใบเลี้ยง)<br>มาตำน้ำพริก                                       | ✓      |         |              |       |       |
| <i>Luffa aegyptiaca</i> Miller   | 1.4<br>3 | บวบ                      | ตะ โก<br>สะ          |    | ผล: ใช้ประกอบอาหาร<br>เส้นใย: จากผลแห้ง ใช้ล้างจาน  | ✓      |         |              | ✓     |       |
| <i>Mukia maderasptana</i> (L.)<br>M.Roem.  | 1.0<br>0 | แตง<br>หนุ<br>ป่อ<br>แกะ | โค๊ะ                 |   | ยอด หรือ ผลอ่อน: ต้มเป็นผักเคียงน้ำพริก   | ✓      |         |              |       |       |
| 36. วงศ์ Dilleniaceae  |          |                          |                      |   |   |        |         |              |       |       |
| <i>Dillenia</i> sp.  | 1.8<br>3 |                          | โค๊ะ                 |  | กลีบเลี้ยง: ใส่แกงเพื่อให้มีรสเปรี้ยว<br>ผลสุก: ใช้เป็นอาหารสุกร วัว และกระบือ<br>ลำต้น: ใช้สร้างบ้าน   | ✓      |         |              | ✓     | ✓     |
| 37. วงศ์ Dioscoreaceae   |          |                          |                      |   |   |        |         |              |       |       |
| <i>Dioscorea atata</i> L.  | 1.0<br>0 | มันเสา                   | น้อย<br>โพ โบ<br>ล๊ะ |  | ลำต้นใต้ดิน: ต้มให้สุกรับประทานเป็นอาหาร  | ✓      |         |              |       |       |
| <i>Dracaena angustifolia</i> Roxb  | 1.4<br>3 | ค้อน<br>หมา<br>ขาว       | เต้ เย               |  | ดอก และแกนของต้นอ่อน: มีรสขมเล็กน้อย นิยม<br>แกงเป็นอาหาร หรือใส่ข้าวเบอะ<br>ยอด: นิยมนำมาประดับหิ้งพระ | ✓      |         |              |       | ✓     |
| 38. วงศ์ Ebenaceae   |          |                          |                      |   |   |        |         |              |       |       |
| <i>Diospyros glandulosa</i> Lace   | 1.1<br>7 | กล้วย<br>ถาชี            | ล่อ คุ<br>เม้าะ      |  | ผลสุก: ใช้เลี้ยงสุกร<br>ลำต้น: ใช้ทำฟืนและสร้างบ้าน   |        |         |              | ✓     | ✓     |









| ชื่อวิทยาศาสตร์  | UV       | ชื่อทั่วไป          | ชื่อท้องถิ่น     | รูปภาพ  | ส่วนที่ใช้: การใช้ประโยชน์   | ประเภท |         |              |       |       |
|--|----------|---------------------|------------------|---|--|--------|---------|--------------|-------|-------|
|  |          |                     |                  |   |  | อาหาร  | สมุนไพร | เครื่องสำอาง | วัสดุ | อื่นๆ |
| <b>39. วงศ์ Elaeagnaceae</b>   |          |                     |                  |   |  |        |         |              |       |       |
| <i>Elaeagnus latifolia</i> L.  | 1.0<br>0 | สลอด<br>เถา         | เกาะ<br>หู       |    | ผลสุก: รับประทานเป็นผลไม้ มีรสเปรี้ยว  | ✓      |         |              |       |       |
| <b>40. วงศ์ Euphorbiaceae</b>  |          |                     |                  |   |  |        |         |              |       |       |
| <i>Aporosa octandra</i> (Buch.-Ham. ex E. Don) Vickery var. <i>yunnanensis</i>     | 1.6<br>7 | น้ำผึ้ง<br>ขาว      | หม้อ<br>คลี      |    | เนื้อไม้: นำมาบดแล้วสูบ หรือใส่ปนกับยาสูบ<br>ผลสุก: รับประทานเป็นผลไม้ มีรสชาติหวานปนขม                                      | ✓      |         |              |       | ✓     |
| <i>Baccaurea ramiflora</i> Lour.   | 1.0<br>0 | มะไฟ                | สะ มื่อ<br>จะ    |    | ผลสุก: รับประทานเป็นผลไม้  | ✓      |         |              |       |       |
| <i>Macalanca denticulata</i> (Blume) Mull.Arg.                                     | 1.4<br>0 | ตอง<br>แตบ          | ปะ ตะ            |   | ใบ: ใช้ห่อข้าว<br>ลำต้น: ใช้สร้างบ้าน  |        |         |              | ✓     | ✓     |
| <b>41. วงศ์ Euphorbiaceae</b>  |          |                     |                  |   |  |        |         |              |       |       |
| <i>Manihot esculenta</i> Crantz  | 1.0<br>0 | มัน<br>สำปะ<br>หลัง | น้อย<br>โปะ กิ   |  | ผลอ่อน และยอดอ่อน: ใช้ประกอบอาหาร ราก<br>สะสมอาหาร: นำมาต้มรับประทานได้  | ✓      |         |              |       |       |
| <i>Ostodes paniculata</i> Blume var. <i>katharinae</i> (Pax) Chakrab. & N.P.Balacr | 1.0<br>0 | มะคัง<br>ดง         | เซตะ<br>โอ       |  | ผลสุก: รับประทานเป็นผลไม้ มีรสชาติเปรี้ยวอม<br>หวาน  | ✓      |         |              |       |       |
| <i>Phyllanthus emblica</i> L.  | 1.8<br>6 | มะขาม<br>มป้อม      | ตะ<br>หย่า<br>ชะ |  | เปลือกต้น: ถากใส่ลาบป้องกันท้องเสีย<br>ผล: รับประทานสด เป็นยาแก้หวัด<br>ราก และเปลือกต้น: ต้มน้ำดื่มแก้หวัด                  | ✓      | ✓       |              | ✓     |       |
| <b>42. วงศ์ Euphorbiaceae</b>  |          |                     |                  |   |  |        |         |              |       |       |
| <i>Ricinus communis</i> L.   | 1.5<br>0 | ละหุ่ง              | ตึก ตี           |  | ก้านใบ: นำมาเป่าลมใส่หู แก้อาการหูอื้อ หนามืด<br>หรือเมาศีรษะ<br>ผลอ่อน: นำมาต้มรับประทาน แก้อักเสบ มี<br>สรรพคุณเป็นยาระบาย |        | ✓       |              |       | ✓     |

| ชื่อวิทยาศาสตร์   | UV       | ชื่อทั่วไป | ชื่อท้องถิ่น     | รูปภาพ  | ส่วนที่ใช้: การใช้ประโยชน์   | ประเภท |         |              |       |       |
|---|----------|------------|------------------|---|--|--------|---------|--------------|-------|-------|
|   |          |            |                  |   |  | อาหาร  | สมุนไพร | เครื่องสำอาง | วัสดุ | อื่นๆ |
| <b>43. วงศ์ Fabaceae</b>  |          |            |                  |   |  |        |         |              |       |       |
| <i>Acacia concinna</i> DC.  | 2.3<br>3 | ส้มป่อย    | ป้อ ชี           |    | ผลแห้ง: แขน้ำให้คนที่เมาเหล้าอาวอดดื่ม และนำมาแช่น้ำสำหรับสระผม ทำให้ผมเงางาม เมล็ด นำมาผ่าแล้วแปะไว้บริเวณที่ถูกสัตว์มีพิษกัด ยอดอ่อน: ใส่แกง หรือต้มให้มีรสเปรี้ยว | ✓      | ✓       |              |       | ✓     |
| <i>Acacia pennata</i> (L.) Willd. subsp. <i>insuavis</i> (Lace) I.C.Nielsen | 1.0<br>0 | ชะอม       | พอ ชูย เต้าชะ    |    | ยอด: ใช้ประกอบอาหาร  | ✓      |         |              |       |       |
| <b>44. วงศ์ Fabaceae</b>  |          |            |                  |   |  |        |         |              |       |       |
| <i>Archidendron clypearia</i> (Jack) I.C.Nielsen                            | 2.0<br>0 | มะขามแป    | ชอ แมลูล         |   | ยอดอ่อน: นำมาช้อนกับอาหารให้ไก่กิน นำใบไปไว้ในเล้าไก่ และนำมาคลุมไฟรมควนไก่ใช้รักษาโรคฝีดาษที่ตาไก่ โดยใบ: ต้มประคบที่ตาเด็กแรกเกิด รักษาอาการเจ็บตา                 | ✓      | ✓       |              |       |       |
| <i>Archidendron jiringa</i> (Jack) I.C.Nielsen                              | 1.0<br>0 | ชะเนียง    |                  |  | ดอก และเมล็ด: นำมาต้ม หรือคองเป็นผักเคียง น้ำพริก  | ✓      |         |              |       |       |
| <i>Archidendron</i> sp.   | 1.0<br>0 |            | กะเหม่น ทอ อิก้อ |  | ลำต้น: ใช้ทำฟืน  |        |         |              |       | ✓     |
| <b>45. วงศ์ Fabaceae</b>  |          |            |                  |   |  |        |         |              |       |       |
| <i>Bauhinia ornata</i> Kurz var. <i>kerrii</i> (Gagnep.) K.&S.S.Larsen      | 1.0<br>0 | โคคลาน     | ตะเบมี้          |  | ลำต้น: ใช้ทำเป็นเชือก  |        |         |              |       | ✓     |
| <i>Cajanus cajan</i> (L.) Millsp.   | 1.2<br>9 | ถั่วแระ    | เท้าชะเนาะ       |  | ผลอ่อน: รับประทานเป็นผักเคียงน้ำพริก ราก: ต้มให้สุนัขดื่ม รักษาโรคพิษสุนัขบ้า  | ✓      | ✓       |              |       |       |
| <i>Cajanus goensis</i> Dalz.  | 1.0<br>0 | แปบผี      | อีชะเฉอพอ        |  | ดอก: มีน้ำหวาน ใช้ทานเล่น  | ✓      |         |              |       |       |










| ชื่อวิทยาศาสตร์                             | UV       | ชื่อทั่วไป  | ชื่อท้องถิ่น | รูปภาพ  | ส่วนที่ใช้: การใช้ประโยชน์  | ประเภท |         |              |       |       |
|---|----------|-------------|--------------|---|---|--------|---------|--------------|-------|-------|
|   |          |             |              |   |   | อาหาร  | สมุนไพร | เครื่องสำอาง | วัสดุ | อื่นๆ |
| <i>Erythrina</i> sp.                        | 1.5<br>0 |             |              |    | เปลือก: ต้มผสมกับขมิ้น หรือนำไปลงไฟ ใส่เมล็ดบดเจ็บที่มือ จะทำให้แผลหายเร็วขึ้น ยอด ต้มน้ำดื่ม แก้ปวดท้อง และต้มรับประทานกับน้ำพริก ช่วยรักษาอาการเจ็บท้อง | ✓      | ✓       |              |       |       |
| <b>46. วงศ์ Fabaceae</b>                    |          |             |              |   |   |        |         |              |       |       |
| <i>Mimosa pudica</i> L.                     | 1.0<br>0 | หญ้าปิ่นยอด | เนาะ มีแค    |    | ทั้งต้น: ต้มกับน้ำตาล ต้มรักษาอาการปัสสาวะขัด และต้มน้ำดื่ม รักษาอาการท้องผูก   |        | ✓       |              |       |       |
| <i>Mucuna macrocarpa</i> Wall.              | 1.2<br>5 | สะบ้าลิง    | แม่แก        |    | เมล็ด: นำมาผนไฟเป็นแป้ง แล้วนำมาทาแกฝี เป็นของเล่นสำหรับเด็ก  |        | ✓       |              |       | ✓     |
| <i>Pachyrhizus erosus</i> (L.) Urb.         | 1.0<br>0 | มันแกว      | น้อยเซอ      |   | รากผสมอาหาร: รับประทานเล่น  | ✓      |         |              |       |       |
| <b>47. วงศ์ Fabaceae</b>                    |          |             |              |   |   |        |         |              |       |       |
| <i>Tadehagi triquetrum</i> (L.) Ohashi      | 1.1<br>4 | ข้าวเม่านก  | เนาะโจปี     |  | ช่อดอก: นำมาทำเป็นหวี ใบ: ขยี้ใส่แผลสัตว์เลี้ยงที่เป็นหนอง หัว: ต้มน้ำดื่ม รักษาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย  |        | ✓       |              |       | ✓     |
| <b>48. วงศ์ Fagaceae</b>                    |          |             |              |   |   |        |         |              |       |       |
| <i>Castanopsis argyrophylla</i> King        | 1.4<br>3 | ก้อหุยม     | เซลโอะ       |  | ผล: นำมาคั่ว รับประทานได้ ลำต้น: ใช้สร้างบ้าน   | ✓      |         |              |       | ✓     |
| <i>Castanopsis diversifolia</i> (Kurz) King | 2.0<br>0 | ก้อแป้น     | เซก้อ        |  | ผล: นำมาคั่ว รับประทานได้ ลำต้น: ใช้ทำเสาบ้าน   | ✓      |         |              |       | ✓     |
| <b>49. วงศ์ Fagaceae</b>                    |          |             |              |   |   |        |         |              |       |       |
| <i>Lithocarpus</i> sp.1                     | 1.0<br>0 |             |              |  | ผล: เป็นอาหารสุกร   |        |         |              |       | ✓     |









| ชื่อวิทยาศาสตร์   | UV       | ชื่อทั่วไป              | ชื่อท้องถิ่น        | รูปภาพ  | ส่วนที่ใช้: การใช้ประโยชน์  | ประเภท |         |              |       |        |
|---|----------|-------------------------|---------------------|---|---|--------|---------|--------------|-------|--------|
|   |          |                         |                     |   |   | อาหาร  | สมุนไพร | เครื่องสำอาง | วัสดุ | อื่นๆ  |
| <i>Lithocarpus</i> sp.2   | 1.0<br>0 |                         | เซ โป๊ะ<br>โละ๊ะ    |    | ผล: เป็นอาหารสุกร   |        |         |              |       | ✓      |
| <i>Lithocarpus</i> sp.3   | 1.0<br>0 |                         | เซ ค่ะ              |    | ผล: เป็นอาหารสุกร   |        |         |              |       | ✓      |
| <b>50. วงศ์ Hippocastanaceae</b>  |          |                         |                     |   |   |        |         |              |       |        |
| <i>Aesculus assamica</i> Griff.   | 1.6<br>0 | มะ<br>เนียง<br>น้ำ      | แกละ<br>ปี          |    | ดอก: ต้มร่วมกับต้น โมยราบ ( <i>Mimosa pudica</i> L.) รักษาอาการปัสสาวะขัด<br>ผล: นำไปฝน ใช้ทารักษาอาการตุ่มคัน และฝนกับน้ำ ใช้ทารักษาแผล ฟกช้ำ<br>เมล็ด: นำไปฝนแล้วทาบริเวณที่โรคคอกพอก |        | ✓       |              |       |        |
| <b>51. วงศ์ Lamiaceae</b>   |          |                         |                     |   |   |        |         |              |       |        |
| <i>Callicarpa arborea</i> Roxb.   | 1.0<br>0 | ข้าแป้<br>น             | หม่อ<br>คุย         |   | เปลือก: ใช้ย้อมผ้า ให้สีเหลือง  |        |         |              |       | ✓      |
| <i>Clerodendrum cotebrookianum</i> Walp.  | 1.0<br>0 | ปิ้ง<br>ขาว             | เนาะ<br>ช่อ<br>โด้ะ |  | ดอกและยอดอ่อน: นำไปต้ม รับประทานเป็นผักเคียงน้ำพริก   | ✓      |         |              |       |        |
| <i>Elsholtzia communis</i><br><i>Clerodendrum cotebrookianum</i> (Collett & Hemsl.) Diels | 1.4<br>3 | ผักอี<br>หลีน           | เนาะ<br>หว่อ        |  | ใบ: ขยี้ใส่แผลสด ทำให้เลือดหยุดไหล และใส่แกงหรือน้ำพริก ให้มีกลิ่นหอม   |        | ✓       |              |       | ✓      |
| <b>52. วงศ์ Lamiaceae</b>   |          |                         |                     |   |   |        |         |              |       |        |
| <i>Gmelina arborea</i> Roxb.  | 2.0<br>0 | ซ้อ                     | กะ มะ               |  | ดอก: ใช้ทำขนม และใช้เป็นยาฆ่าพยาธิในเด็ก โดยนำไปคั่วกับข้าว ให้เด็กรับประทาน<br>ลำต้น: ใช้สร้างบ้าน ทำกลอง  | ✓      | ✓       |              |       | ✓      |
| <i>Tectona grandis</i> L.   | 1.5<br>7 | สัก                     | เซ บะ<br>อี         |  | เปลือก: ใช้ย้อมผ้า ให้สีน้ำตาล<br>ลำต้น: ใช้สร้างบ้าน   |        |         |              |       | ✓<br>✓ |
| <b>53. วงศ์ Lauraceae</b>   |          |                         |                     |   |   |        |         |              |       |        |
| <i>Cassytha filiformis</i> L.   | 1.0<br>0 | สังวาล<br>พระ<br>อินทร์ | โทะ โท<br>เคาะ ก็   |  | ทั้งต้น: ต้มน้ำดื่มแก้ปวดท้อง และนำไปต้มรับประทานเป็นผักเคียงน้ำพริก  | ✓      | ✓       |              |       |        |








| ชื่อวิทยาศาสตร์                          | UV       | ชื่อทั่วไป    | ชื่อท้องถิ่น       | รูปภาพ  | ส่วนที่ใช้: การใช้ประโยชน์   | ประเภท |         |              |       |       |
|--|----------|---------------|--------------------|---|--|--------|---------|--------------|-------|-------|
|  |          |               |                    |   |  | อาหาร  | สมุนไพร | เครื่องสำอาง | วัสดุ | อื่นๆ |
| <b>54. วงศ์ Lauraceae</b>                |          |               |                    |   |  |        |         |              |       |       |
| <i>Cinamomum</i> sp.                     | 1.3<br>3 |               | ซี ซอ<br>เปะ       |    | เปลือกต้น: เคี้ยวกินกับหมาก หรือนำไปทำไส้บุหรี   |        |         |              |       | √     |
| <i>Litsea cubeba</i> Pers.               | 1.7<br>1 | ตะไคร้<br>ต้น | กะ ลี<br>สะ        |    | ผลดิบ: ใช้แก้พิษงู<br>ผลดิบ ใช้รักษาโรคมมาลาเรีย, ใช้ใส่แกง ให้กลิ่นหอม<br>และต้มรับประทานเป็นผักเคียงน้ำพริก<br>ราก: ต้มน้ำดื่ม แก้อาการแน่นอกและ แก้อาการ<br>ปวดท้อง |        | √       |              |       | √     |
| <i>Litsea</i> sp. 1                      | 1.0<br>0 |               | โม โม<br>บะ<br>ฮอง |    | ลำต้น: ใช้สร้างบ้าน  |        |         |              |       | √     |
| <i>Litsea</i> sp. 5                      | 1.0<br>0 |               | โม โม<br>บอ        |    | ลำต้น: ใช้สร้างบ้าน  |        |         |              |       | √     |
| <i>Litsea</i> sp.6                       | 1.0<br>0 |               | เตอะ<br>วอ         |   | ยอด: รับประทานเป็นผักเคียงลาบ<br>ลำต้น: ใช้สร้างบ้าน   | √      |         |              |       | √     |
| <i>Nothaphoebe umbelliflora</i><br>Blume |          |               | ทั้งใบ<br>ช่อ      |  | ลำต้น: ใช้สร้างบ้าน  |        |         |              |       | √     |
| <i>Phoebe</i> sp.2                       | 1.0<br>0 |               | แซะ                |  | ลำต้น: ใช้สร้างบ้าน  |        |         |              |       | √     |
| <b>55. วงศ์ Leeaceae</b>                 |          |               |                    |   |  |        |         |              |       |       |
| <i>Leea</i> sp.                          | 1.0<br>0 |               | กะ หมี<br>โม๊ะ     |  | ราก: ต้มน้ำดื่ม แก้ท้องเสีย<br>ราก: เป็นส่วนผสมของยาต้ม รักษาอาการปวดหลัง  |        | √       |              |       |       |
| <b>56. วงศ์ Lythraceae</b>               |          |               |                    |   |  |        |         |              |       |       |
| <i>Lagerstroemia</i> sp. 1               | 1.0<br>0 |               | จี กล่อ            |  | ลำต้น: ใช้สร้างบ้าน  |        |         |              |       | √     |









| ชื่อวิทยาศาสตร์                                       | UV       | ชื่อทั่วไป           | ชื่อท้องถิ่น             | รูปภาพ  | ส่วนที่ใช้: การใช้ประโยชน์   | ประเภท |         |              |       |       |
|---|----------|----------------------|--------------------------|---|--|--------|---------|--------------|-------|-------|
|   |          |                      |                          |   |  | อาหาร  | สมุนไพร | เครื่องสำอาง | วัสดุ | อื่นๆ |
| <b>56. วงศ์ Malvaceae</b>                             |          |                      |                          |   |  |        |         |              |       |       |
| <i>Sida acuta</i> Burm.f.                             | 1.1<br>4 | หญ้า<br>ขัดใบ<br>ยาว | เนาะ<br>แค<br>แม่        |    | ลำต้น: ตากแห้งใช้ทำเป็นไม้กวาดสำหรับกวาดลานบ้าน และเป็นส่วนผสมของยาต้ม รักษาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย   |        | ✓       |              | ✓     |       |
| <b>57. วงศ์ Melastomataceae</b>                       |          |                      |                          |   |  |        |         |              |       |       |
| <i>Melastoma sanguineum</i> Sims                      | 1.6<br>0 | ม้ง<br>เคร่ซ้าง      | เสะ<br>ชู<br>เปล         |    | เชื่อว่า: ถ้าขึ้นในไร่ข้าวโพด จะทำให้ข้าวโพดมีผลผลิตไม่ดี<br>ผลสุก: รับประทานเป็นผลไม้<br>ราก: เป็นส่วนผสมของยาต้ม รักษาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย |        | ✓       |              |       | ✓     |
| <i>Memexylon</i> sp.                                  | 1.0<br>0 |                      | หลี่<br>ไค้<br>คลี่      |    | เนื้อไม้: ซอยให้ละเอียด ใส่ผสมกับยาสูบ ยอด: รับประทานเป็นผักเคียงลาบ<br>ลำต้น: ใช้ทำด้ามไม้กวาด ด้ามมีด หรือด้ามขวาน                             |        | ✓       |              | ✓     |       |
| <b>58. วงศ์ Meliaceae</b>                             |          |                      |                          |   |  |        |         |              |       |       |
| <i>Chukrasia tabularis</i> A.Juss                     | 1.0<br>0 | ยมหิน                | หะ<br>รี                 |   | เปลือก: ต้มน้ำดื่ม แก้ปวดเมื่อย<br>ลำต้น: ใช้สร้างบ้าน   |        | ✓       |              | ✓     |       |
| <i>Heynea trijuga</i> Roxb. ex Sims                   | 1.0<br>0 | ยม<br>แดง            | เซ<br>บะ<br>หยอง<br>เอ๊ะ |  | ลำต้น: ใช้ทำฟืน<br>ลำต้น: ใช้สร้างบ้าน   |        |         |              | ✓     | ✓     |
| <b>59. วงศ์ Menispermaceae</b>                        |          |                      |                          |   |  |        |         |              |       |       |
| <i>Tinospora crispa</i> (L.) Miers ex Hook.f.&Thomson | 1.0<br>0 | บอระ<br>พืด          | โท<br>โพ<br>คอก<br>กิ    |  | ลำต้น: ต้มน้ำดื่ม รักษาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ  |        | ✓       |              |       |       |
| <b>60. วงศ์ Moraceae</b>                              |          |                      |                          |   |  |        |         |              |       |       |
| <i>Artocarpus</i> cf. <i>lanceifolius</i> Roxb.       | 1.2<br>9 |                      | คะ<br>หละ<br>เป๊ะ        |  | เปลือก: เคี้ยวกินกับหมาก<br>ผลสุก: รับประทานเป็นผลไม้  |        | ✓       |              |       |       |
| <b>61. วงศ์ Moraceae</b>                              |          |                      |                          |   |  |        |         |              |       |       |
| <i>Artocarpus heterophyllus</i> Lam.                  | 1.0<br>0 | ขนุน                 | บะ<br>นอย<br>ซ๊ะ         |  | ผลสุก: รับประทานเป็นผลไม้<br>ผลดิบ: ใช้ประกอบอาหาร   |        | ✓       |              |       |       |











| ชื่อวิทยาศาสตร์                            | UV       | ชื่อทั่วไป    | ชื่อท้องถิ่น | รูปภาพ  | ส่วนที่ใช้: การใช้ประโยชน์  | ประเภท |         |              |       |       |
|--|----------|---------------|--------------|---|---|--------|---------|--------------|-------|-------|
|  |          |               |              |   |   | อาหาร  | สมุนไพร | เครื่องสำอาง | วัสดุ | อื่นๆ |
| <i>Ficus auriculata</i> Lour.              | 1.0<br>0 | มะเดื่อหัวว่า | ตะกั่ว       |    | ผลดิบ: รับประทานเป็นผลไม้<br>ยอด: รับประทานเป็นผักเคียงน้ำพริก ผลสามารถรับประทานสดได้ทันที แต่ยอดต้องนำไปลวกก่อน                                  | ✓      | ✓       |              |       |       |
| <i>Ficus fistulosa</i> Reinw. ex Blume     | 1.0<br>0 | ชิงช้า        | ตะกั่ว       |    | ผลดิบ: และยอดรับประทานสดเป็นผักเคียงน้ำพริก<br>ยาง: ใช้ทำรักษาโรคกลากเกลื้อน  | ✓      | ✓       |              |       |       |
| 62. วงศ์ Moraceae                          |          |               |              |   |   |        |         |              |       |       |
| <i>Ficus hispida</i> L.f.                  | 1.4<br>3 | มะเดื่อปล้อง  | ตะกั่วโพ     |    | ยอด: ต้มเป็นผักเคียงน้ำพริก ผลตำกับน้ำพริก<br>ยาง: ใช้ทำกับดักสัตว์   | ✓      |         |              |       | ✓     |
| <i>Ficus semicordata</i> Buch.-Ham. ex Sm. | 1.5<br>7 | มะเดื่อสาย    |              |   | ใบ: ใช้ถูไม้ให้เรียบ<br>ผลสุก: รับประทานเป็นผลไม้<br>ราก: ต้มดื่มแก้ รักษาอาการปวดกล้ามเนื้อ  |        | ✓       |              |       | ✓     |
| <i>Ficus</i> sp.                           | 1.2<br>0 |               | เต๋อเอื้อะนา |  | ใบ: ใช้ทำพืธภัณฑ์สัตว์เลี้ยงมีผลเป็นหนอง<br>ผลสุก: รับประทานเป็นผลไม้   |        | ✓       |              |       | ✓     |
| 63. วงศ์ Moraceae                          |          |               |              |   |   |        |         |              |       |       |
| <i>Ficus subincisa</i> Bunch. Ham. ex Sm.  | 1.0<br>0 | มะเดื่อน้อย   | เคอะแคะ      |  | ผลสุก: รับประทานเป็นผลไม้   | ✓      |         |              |       |       |
| <i>Morus macroura</i> Miq.                 | 1.0<br>0 | หม่อนหลวง     | เคอะแซะ      |  | ผลสุก: รับประทานเป็นผลไม้   | ✓      |         |              |       |       |
| 64. วงศ์ Musaceae                          |          |               |              |   |   |        |         |              |       |       |
| <i>Ensete superbum</i> (Roxb.) Cheesman    | 1.7<br>1 |               | หย่าปล๊ะ     |  | น้ำจากลำต้น: นำมาทาร่างกาย แก้อาการตัวเหลือง<br>เมล็ด: นำมาร้อยเป็นสร้อยคอ ทำเครื่องประดับ<br>เมล็ด: นำมาร้อยเป็นสร้อยคอ สวมเพื่อรักษาอาการผดผื่น |        | ✓       |              |       | ✓     |
| <i>Musa x paradisiaca</i> L. cav.1         | 1.8<br>6 |               | ตะกั่ว       |  | ปลี: แกงเป็นอาหารให้แม่ลูกอ่อนรับประทาน เพื่อเร่งน้ำนม<br>ผลสุก: รับประทานเป็นผลไม้<br>ลำต้น: ใช้เป็นอาหารสำหรับสุกร                              |        | ✓       |              |       | ✓     |








| ชื่อวิทยาศาสตร์                    | UV       | ชื่อทั่วไป | ชื่อท้องถิ่น                      | รูปภาพ  | ส่วนที่ใช้: การใช้ประโยชน์   | ประเภท |         |              |       |       |
|------------------------------------|----------|------------|-----------------------------------|---|--|--------|---------|--------------|-------|-------|
|                                    |          |            |                                   |   |  | อาหาร  | สมุนไพร | เครื่องสำอาง | วัสดุ | อื่นๆ |
| <b>65. วงศ์ Musaceae</b>           |          |            |                                   |   |  |        |         |              |       |       |
| <i>Musa x paradisiaca</i> L. cav.2 | 1.0<br>0 |            | ตะ กุย<br>ถ่อ                     |    | ผลสุก: รับประทานเป็นผลไม้  | ✓      |         |              |       |       |
| <i>Musa x paradisiaca</i> L. cav.3 | 1.4<br>0 |            |                                   |    | ปลี: แกงเป็นอาหารให้แมลงอ่อนรับประทาน เพื่อ<br>เร่งน้ำนม<br>ผลสุก: รับประทานเป็นผลไม้<br>ผลอ่อน: นำมาซอยเป็นแว่น แช่น้ำดื่มน้ำแก้มักต้องเสีย | ✓      | ✓       |              |       |       |
| <i>Musa x paradisiaca</i> L. cav.4 | 1.0<br>0 |            | หยะ<br>วา                         |    | ปลี และหอยวก: ประกอบอาหาร  | ✓      |         |              |       |       |
| <b>66. วงศ์ Myrsinaceae</b>        |          |            |                                   |   |  |        |         |              |       |       |
| <i>Musa</i> sp.                    | 1.1<br>4 |            | หยะ                               |  | ปลี และหอยวก: นำมาประกอบอาหาร  | ✓      |         |              |       |       |
| <i>Ardisia</i> sp.                 | 1.0<br>0 |            | หลื่อ<br>เบ้าะ<br>เด/ ซอ<br>กั ตึ |  | ผล และยอด: รับประทานเป็นผักเคียงน้ำพริก  | ✓      |         |              |       |       |
| <i>Embelia sessiliflora</i> Kurz   | 1.0<br>0 |            | เบ<br>เปราะ                       |  | ผลสุก: รับประทานเป็นผลไม้<br>ยอด: รับประทานเป็นผักเคียงน้ำพริก   | ✓      |         |              |       |       |
| <b>67. วงศ์ Myrtaceae</b>          |          |            |                                   |   |  |        |         |              |       |       |
| <i>Psidium guajava</i> L.          | 2.5<br>7 | ฝรั่ง      | เซะ<br>หว่า<br>ล่อ                |  | เปลือก: ถากใส่ลาบเพื่อป้องกันท้องเสีย<br>ผล: รับประทานเป็นผลไม้<br>ยอด: ต้มน้ำดื่ม แก้มักต้องร่วง หรือรับประทานสด แก้มัก<br>ไอ               | ✓      | ✓       |              |       | ✓     |
| <i>Syzygium cumini</i> (L.) Skeels | 1.6<br>0 | หว่า       | ตะ หมี่                           |  | ผลสุก: รับประทานเป็นผลไม้<br>ยอด: ใช้สำหรับทำบุญ<br>ลำต้น: ใช้สร้างบ้าน  | ✓      |         |              | ✓     | ✓     |









| ชื่อวิทยาศาสตร์                   | UV       | ชื่อทั่วไป | ชื่อท้องถิ่น     | รูปภาพ  | ส่วนที่ใช้: การใช้ประโยชน์  | ประเภท |         |              |       |       |
|-----------------------------------|----------|------------|------------------|---|---|--------|---------|--------------|-------|-------|
|                                   |          |            |                  |   |   | อาหาร  | สมุนไพร | เครื่องสำอาง | วัสดุ | อื่นๆ |
| <b>68. วงศ์ Olacaceae</b>         |          |            |                  |   |   |        |         |              |       |       |
| <i>Erythralium scandens</i> Blume | 1.0<br>0 | ฝักรต      | เนาะ ลี<br>นา    |    | ยอดอ่อน: ใช้ใส่ข้าวเบาะ   | ✓      |         |              |       |       |
| <b>69. วงศ์ Orchidaceae</b>       |          |            |                  |   |   |        |         |              |       |       |
| <i>Zeuxine membranacea</i> Lindl. | 1.0<br>0 |            | นอ ลอ<br>ดิง     |    | ราก: ต้มน้ำ ต้มเป็นยาแก้ปวดเมื่อยตามร่างกาย                                     |        | ✓       |              |       |       |
| <b>70. วงศ์ Oxalidaceae</b>       |          |            |                  |   |   |        |         |              |       |       |
| <i>Oxalis corniculata</i> L.      | 1.0<br>0 | ผักแว่น    | พอ<br>โค๊ะ ชิ    |   | ยอด: รับประทานเป็นผักเคียงน้ำพริก มีรสเปรี้ยว                                   | ✓      |         |              |       |       |
| <b>71. วงศ์ Pandanaceae</b>       |          |            |                  |   |   |        |         |              |       |       |
| <i>Pandanus</i> sp.               | 1.8<br>6 |            | เหนะ             |  | ยอด: อ่อนใช้ประกอบอาหาร<br>ใบ: ใช้ห่อเทียน<br>ผล: ใช้เป็นหวีสำหรับล้างฝ้าย      | ✓      |         |              | ✓     | ✓     |
| <b>72. วงศ์ Piperaceae</b>        |          |            |                  |   |   |        |         |              |       |       |
| <i>Piper boehmerifolium</i> Wall. | 1.0<br>0 |            | ตะ ชิ<br>โล้ว แล |  | ผล ให้เติกรับประทาน เพื่อเป็นยาถ่ายพยาธิ<br>รากสด อมเพื่อแก้อาการปวดฟัน         |        | ✓       |              |       | ✓     |
| <i>Piper</i> sp.                  | 1.0<br>0 |            | ซา คอ<br>เปล     |  | ลำต้น ต้มน้ำ แก้ปวดหัวในช่วงเวลาที่อยู่ที่ไฟ                                    |        | ✓       |              |       |       |
| <b>73. วงศ์ Poaceae</b>           |          |            |                  |   |   |        |         |              |       |       |
| <i>Coix tachyma-jobi</i> L.       | 1.2<br>9 | เด็ย       | เบอะ<br>ที       |  | ผล: ใช้ประดับเสื้อผ้า<br>ราก: เป็นส่วนผสมของยาต้ม รักษาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย |        | ✓       |              |       | ✓     |

| ชื่อวิทยาศาสตร์                      | UV       | ชื่อทั่วไป   | ชื่อท้องถิ่น    | รูปภาพ  | ส่วนที่ใช้: การใช้ประโยชน์   | ประเภท |         |              |       |       |   |
|--------------------------------------|----------|--------------|-----------------|---|--|--------|---------|--------------|-------|-------|---|
|                                      |          |              |                 |   |  | อาหาร  | สมุนไพร | เครื่องสำอาง | วัสดุ | อื่นๆ |   |
| <b>74. วงศ์ Poaceae</b>              |          |              |                 |   |  |        |         |              |       |       |   |
| <i>Imperata cylindrica</i> P. Beauv. | 1.2<br>9 | หญ้าคา       | ติยี่<br>ละ     |    | ใบ: ใช้มุงหลังคา และใช้ฟืนเลี้ยงผี   |        |         |              |       | ✓     | ✓ |
| <i>Saccharum officinarum</i> L.      | 1.1<br>7 | อ้อย         | เกอ<br>ที่      |    | น้ำเลี้ยง: จากลำต้นรับประทานได้ มีรสหวาน<br>ลำต้น: ต้มน้ำดื่ม แก้ปวดท้อง (เฉพาะต้นที่มีสีน้ำตาล) | ✓      |         | ✓            |       |       |   |
| <b>75. วงศ์ Poaceae</b>              |          |              |                 |   |  |        |         |              |       |       |   |
| <i>Sorghum bicolor</i> (L.) Moench   | 1.1<br>4 | ข้าว<br>ฟ่าง | เซ<br>ตี<br>แป  |   | ผล: ทำข้าวตอก<br>ลำต้น: มีน้ำเลี้ยง มีรสชาติดหวาน  | ✓      |         |              |       |       | ✓ |
| <i>Thysanolaena maxima</i> Kuntze    | 1.2<br>9 | ตอง<br>กง    | เค<br>เม        |  | ช่อดอก: ตากแห้งให้ทำเป็นไม้กวาด<br>ใบ: ใช้ห่อทำข้าวต้ม<br>ต้น: ต้มน้ำดื่ม แก้ปวดท้อง             |        | ✓       |              | ✓     | ✓     |   |
| <i>Zea mays</i> L.                   | 1.4<br>3 | ข้าวโพ<br>ด  | บือ<br>เค<br>ชะ |  | ผล: ใช้เป็นอาหารสุกร<br>ผล: รับประทานได้   | ✓      |         |              |       |       | ✓ |
| <b>76. วงศ์ Podocarpaceae</b>        |          |              |                 |   |  |        |         |              |       |       |   |
| <i>Podocarpus neriifolius</i> D.Don  | 1.2<br>9 | พญาไ<br>ม้   | เซ<br>วา<br>ละ  |  | ลำต้น: ใช้ทำไม้พายเป็นไม้รับคนข้าว เชื่อว่าจะทำให้เจริญอาหาร<br>ลำต้น: ใช้สร้างบ้าน              |        | ✓       |              |       |       | ✓ |
| <b>77. วงศ์ Polygalaceae</b>         |          |              |                 |   |  |        |         |              |       |       |   |
| <i>Polygala chinensis</i> L.         | 1.0<br>0 |              | ลา<br>ชะ        |  | ทั้งต้น: ต้มน้ำดื่ม มีกลิ่นหอม เป็นยาแก้ปวดเมื่อย  | ✓      |         |              |       |       |   |
| <b>78. วงศ์ Polygonaceae</b>         |          |              |                 |   |  |        |         |              |       |       |   |
| <i>Persicaria</i> sp.                | 1.5<br>7 |              | กะ<br>ดอ<br>ชื  |  | ใบ: เป็นผักเคียงลาบ<br>ทั้งต้น: เป็นอาหารสำหรับสุกร  | ✓      |         |              |       |       | ✓ |









| ชื่อวิทยาศาสตร์   | UV       | ชื่อทั่วไป  | ชื่อท้องถิ่น | รูปภาพ  | ส่วนที่ใช้: การใช้ประโยชน์   | ประเภท |         |          |       |       |
|---|----------|-------------|--------------|---|--|--------|---------|----------|-------|-------|
|   |          |             |              |   |  | อาหาร  | สมุนไพร | เศรษฐกิจ | วัสดุ | อื่นๆ |
| <i>Polygonum odoratum</i> Lour.                           | 1.0<br>0 | ผักแพว      | ผัก จี       |    | ใบ: รับประทานเป็นผักเคียงลาบ ใส่แกงปลา ให้มีกลิ่นหอม                                       | ✓      |         |          |       |       |
| <b>79. วงศ์ Polygonaceae</b>                              |          |             |              |   |  |        |         |          |       |       |
| <i>Rumex</i> sp.  | 1.0<br>0 |             | บา ซิ        |    | ใบ: รับประทานเป็นผักเคียงลาบ หรือใส่แกงให้รสเปรี้ยว  | ✓      |         |          |       |       |
| <b>80. วงศ์ Pontederiaceae</b>                            |          |             |              |   |  |        |         |          |       |       |
| <i>Monochoria vaginatis</i> (Burm.f.)<br>C.Prest ex Kunth | 1.0<br>0 |             | นยะโต๊ะ      |    | ลำต้น: เป็นผักสำหรับแกง  | ✓      |         |          |       |       |
| <b>81. วงศ์ Proteaceae</b>                                |          |             |              |   |  |        |         |          |       |       |
| <i>Helicia</i> sp.  | 1.0<br>0 |             | แซ๊ะซุย      |  | ลำต้น: ทำไม้พายคนข้าว  |        |         |          |       | ✓     |
| <b>82. วงศ์ Pteridaceae</b>                               |          |             |              |   |  |        |         |          |       |       |
| <i>Pteris</i> sp.   | 1.0<br>0 |             | โทง          |  | ก้าน: ทำหลอดดูดเหล้า   |        |         |          |       | ✓     |
| <b>83. วงศ์ Rosaceae</b>                                  |          |             |              |   |  |        |         |          |       |       |
| <i>Rubus rufus</i> Focke                                  | 1.0<br>0 |             | ซุย मामี     |  | ผลสุก: รับประทานเป็นผลไม้  | ✓      |         |          |       |       |
| <i>Rubus ellipticus</i> J.E. Smith                        | 1.4<br>3 | หนามไข่กึ่ง | ยะโพติ       |  | ผลสุก: รับประทานเป็นผลไม้<br>ราก: ต้มน้ำดื่ม บรรเทาอาการเมื่อยล้า<br>ราก ต้มน้ำดื่มแก้หวัด | ✓      | ✓       |          |       |       |
| <b>84. วงศ์ Rubiaceae</b>                                 |          |             |              |   |  |        |         |          |       |       |
| <i>Ixora</i> sp.  | 1.1<br>4 |             | ลิโคคลีลา    |  | ใบ: ต้มน้ำดื่ม แก้ปวดหัว แก้อาการปวดเมื่อย รักษาโรคมะลาเรีย                                |        | ✓       |          |       |       |








| ชื่อวิทยาศาสตร์   | UV       | ชื่อทั่วไป | ชื่อท้องถิ่น    | รูปภาพ  | ส่วนที่ใช้: การใช้ประโยชน์   | ประเภท |         |              |       |       |
|---|----------|------------|-----------------|---|--|--------|---------|--------------|-------|-------|
|   |          |            |                 |   |  | อาหาร  | สมุนไพร | เครื่องสำอาง | วัสดุ | อื่นๆ |
| <i>Morinda angustifolia</i> Roxb. var. <i>scabridula</i>  | 1.0<br>0 | ยอหิน      | โค๊ะ            |    | ราก: ใช้ย้อมผ้า ได้สีแดงอูฐ  |        |         |              | ✓     |       |
| <i>Schizomussaenda henryi</i> (Hutch.) X.F.Deng&D.X.Zhang | 2.0<br>0 | กำเน้อตัน  | โท โท บ่อ นะ    |    | ดอก: มีน้ำหวาน ใช้ทานเล่น<br>ลำต้น ใช้สร้างบ้าน                            | ✓      |         |              | ✓     |       |
| <b>85. วงศ์ Rubiaceae</b>                                 |          |            |                 |   |  |        |         |              |       |       |
| <i>Spermacoce</i> sp.                                     | 1.0<br>0 |            |                 |    | ทั้งต้น: นำมาต้มเป็นอาหารสำหรับสุกร  |        |         |              |       | ✓     |
| <i>Wendlandia tinctoria</i> DC.                           | 2.0<br>0 | แซ้ง กวาง  | ไม้ คอบอ        |   | ดอก: มีน้ำหวาน ใช้ทานเล่น<br>ลำต้น: ใช้สร้างบ้าน                           | ✓      |         |              | ✓     |       |
| <b>86. วงศ์ Rutaceae</b>                                  |          |            |                 |   |  |        |         |              |       |       |
| <i>Citrus maxima</i> (Burm.f.) Merr.                      | 1.1<br>4 |            | สะ ชุย ค่ะ      |  | ผล: นำมาคั้นน้ำ ใช้สระผม<br>ผล: รับประทานเป็นผลไม้                         | ✓      |         |              | ✓     |       |
| <i>Clausena</i> sp.                                       | 1.0<br>0 |            | เซ เนอ สี       |  | ใบ: เป็นสมุนไพรสำหรับอบไอน้ำ ใช้หลังจากช่วยฟื้นไข้<br>ผลอ่อน: รับประทานได้ | ✓      | ✓       |              |       |       |
| <i>Euodia tepta</i> (Spreng.) Merr.                       | 1.0<br>0 |            | เส๊ะ คะ         |  | ยอด: นำมาตากแห้ง แล้วลนไฟ รับประทานกับน้ำพริก หรือใส่ข้าวเบอะ              | ✓      |         |              |       |       |
| <i>Toddalia asiatica</i> (L.) Lam.                        | 1.0<br>0 |            | ตะ ชั่วะ อี ค่ะ |  | ยอด: รับประทานสด แก้ก้อฮัด ท้องเฟ้อ และรับประทานเป็น เป็นผักเคียงน้ำพริก   | ✓      | ✓       |              |       |       |
| <b>87. วงศ์ Salicaceae</b>                                |          |            |                 |   |  |        |         |              |       |       |
| <i>Salix tetrasperma</i> Roxb.                            | 1.4<br>3 | สนุ่น      | ปัด ตะโล        |  | เปลือก: ใช้ย้อมผ้าให้สีชมพู ใช้อมแก้ปวดฟัน                                 |        |         |              | ✓     |       |
| <b>88. วงศ์ Santalaceae</b>                               |          |            |                 |   |  |        |         |              |       |       |
| <i>Dufrenoya sessilis</i> (Craib) Stapf.                  | 1.1<br>4 | กาฬากก่อ   | รา ฉะ           |  | ลำต้น: ต้มาแล้วประกบ ต้มดื่ม แก้แขนขาหัก ขาพลิก<br>ปวดเมื่อยตามร่างกาย     |        | ✓       |              |       |       |

| ชื่อวิทยาศาสตร์                       | UV       | ชื่อทั่วไป                   | ชื่อท้องถิ่น          | รูปภาพ  | ส่วนที่ใช้: การใช้ประโยชน์  | ประเภท |         |              |       |       |
|---------------------------------------|----------|------------------------------|-----------------------|---|---|--------|---------|--------------|-------|-------|
|                                       |          |                              |                       |   |   | อาหาร  | สมุนไพร | เครื่องสำอาง | วัสดุ | อื่นๆ |
| <b>89. วงศ์ Sapindaceae</b>           |          |                              |                       |   |   |        |         |              |       |       |
| <i>Sapindus rarak</i> DC.             | 1.5<br>7 | มะขัก                        | ซา เล<br>เด           |    | ผล: แขน้ำเกิดฟอง ใช้ซักผ้า ใช้เป็นยาเบื่อปลา<br>ยอด: รับประทาน มีฤทธิ์เป็นยาระบายอ่อนๆ  |        | √       |              |       | √     |
| <b>90. วงศ์ Saururaceae</b>           |          |                              |                       |   |   |        |         |              |       |       |
| <i>Houttuynia cordata</i> Thunb.      | 1.4<br>3 | ผัก<br>คาวต<br>อง            | ตะ เน<br>ซี เต้า<br>ง |    | ใบ: ขยี้ดม หรือรับประทาน เป็นยาแก้หวัด และแก้<br>ไข้ รับประทานเป็นผักเคียงลาบ   | √      | √       |              |       |       |
| <b>91. วงศ์ Schizaeaceae</b>          |          |                              |                       |   |   |        |         |              |       |       |
| <i>Lygodium cf flexuosum</i> (L.) Sw. | 1.6<br>7 | ย่านลิ<br>ภา                 | ก๊ โก<br>มือ          |    | ทั้งต้น: ใช้ทำพิธีเลี้ยงยุงฉาง หลังเกี่ยวข้าวเสร็จ และ<br>ใช้คนน้ำในพิธีเลี้ยงผี ใบสด: ขยี้ใส่ผสมสด ช่วย<br>หยุดเลือด<br>ยอด: รับประทานสด หรือต้มให้สุก เป็นผักเคียง<br>น้ำพริก | √      | √       |              |       | √     |
| <b>92. วงศ์ Scrophulariaceae</b>      |          |                              |                       |   |   |        |         |              |       |       |
| <i>Torenia</i> sp.                    | 1.0<br>0 |                              | เนาะ<br>ปือ เค        |  | ยอด: ใช้ประกอบอาหาร หรือรับประทานสดเป็นผัก<br>เคียงน้ำพริก  | √      |         |              |       |       |
| <b>93. วงศ์ Smilacaceae</b>           |          |                              |                       |   |   |        |         |              |       |       |
| <i>Smitax glabra</i> Wall. ex Roxb.   | 1.2<br>9 |                              | ละ ปอ                 |  | ลำต้นใต้ดิน: ต้มน้ำดื่มเป็นยารักษาโรคมะเร็ง และ<br>เป็นส่วนประกอบของยาต้ม รักษาอาการปวดเมื่อย<br>ตามร่างกาย   |        | √       |              |       |       |
| <i>Smitax cf ovalifolia</i> Roxb.     | 1.0<br>0 |                              | ฮอ กะ<br>อะ           |  | ราก: ต้มน้ำดื่ม รักษาอาการปวดท้อง ท้องเสีย<br>ลำต้นใต้ดิน: ต้มน้ำดื่มรักษาโรคริดสีดวงทวาร   |        | √       |              |       |       |
| <b>94. วงศ์ Smilacaceae</b>           |          |                              |                       |   |   |        |         |              |       |       |
| <i>Smitax corbularia</i> Kunth        | 1.5<br>0 | หัว<br>ข้าวเยี<br>นเหนี<br>อ | ละ ปอ                 |  | ผลสุก: รับประทานเป็นผลไม้<br>ลำต้นใต้ดิน: ต้มน้ำดื่มเป็นยารักษาโรคมะเร็ง และ<br>ใช้ส่วนประกอบของยาต้ม รักษาอาการปวดเมื่อย<br>ตามร่างกาย   | √      | √       |              |       |       |

| ชื่อวิทยาศาสตร์                                  | UV       | ชื่อทั่วไป     | ชื่อท้องถิ่น        | รูปภาพ  | ส่วนที่ใช้: การใช้ประโยชน์   | ประเภท |         |              |       |        |
|--|----------|----------------|---------------------|---|--|--------|---------|--------------|-------|--------|
|  |          |                |                     |   |  | อาหาร  | สมุนไพร | เครื่องสำอาง | วัสดุ | อื่นๆ  |
| <b>95. วงศ์ Solanaceae</b>                       |          |                |                     |   |  |        |         |              |       |        |
| <i>Capsicum frutescens</i> L.                    | 1.0<br>0 |                | บวย ชะ              |    | ผล: ใช้ปรุงอาหาร ให้รสเผ็ด   | √      |         |              |       |        |
| <i>Nicotiana tabacum</i> L.                      | 1.4<br>3 | ยาสูบ          | ยา สุ               |    | ใบ: ใช้ทำบุหรี่ ใบสด หรือแห้งที่แช่น้ำ ใช้ใส่แผลสด ช่วยห้ามเลือด   |        | √       |              |       | √      |
| <i>Solanum aethiopicum</i> L.                    | 1.0<br>0 |                | เต๋อ<br>ช่อ ชะ      |   | ผล: ใช้ประกอบอาหาร   | √      |         |              |       |        |
| <b>96. วงศ์ Solanaceae</b>                       |          |                |                     |   |  |        |         |              |       |        |
| <i>Solanum erianthum</i> D.Don                   | 1.5<br>0 | ดัด<br>ยาง     | เซะ ตี<br>กอ        |    | ใบ: ใช้ล้างจาน<br>ใบ และผล: ตากแห้ง เป็นส่วนผสมของหัวเชื้อเหล้า  |        |         |              |       | √<br>√ |
| <i>Solanum incanum</i> L.                        | 1.4<br>3 | มะเขือ<br>ขึ้น | ตะ ก่อ<br>ฮอ        |   | ผล: ใช้ประกอบอาหาร นำไปอังไฟ แล้วสุตควินอม<br>ไว้ในปาก<br>รักษาโรคฟันผุ<br>ราก: อมเพื่อบรรเทาอาการปวดฟัน | √      | √       |              |       | √      |
| <i>Solanum torvum</i> Sw.                        | 1.0<br>0 | มะเขือ<br>พวง  | สะ กอ<br>กะ         |  | ผล: ต้มน้ำดื่มแก้ปวดหลัง ปวดเอว หรือ ต้ม<br>รับประทานเป็นผักเคียงน้ำพริก                                 | √      | √       |              |       |        |
| <b>97. วงศ์ Sonneratiaceae</b>                   |          |                |                     |   |  |        |         |              |       |        |
| <i>Duabanga grandiflora</i> (Roxb. ex DC.) Walp. | 1.8<br>6 | ตุ้มเต๋<br>น   | โก๊ะ                |  | เนื้อไม้: ใช้สร้างบ้าน<br>เปลือก: ใช้ย้อมผ้า ให้สีน้ำตาล และใช้ ต้มน้ำดื่ม<br>เป็นยาแก้ช้ำใน             |        | √       |              |       | √<br>√ |
| <b>98. วงศ์ Sterculiaceae</b>                    |          |                |                     |   |  |        |         |              |       |        |
| <i>Pterospermum</i> sp.                          | 1.0<br>0 |                | แซะ<br>บลาละ        |  | เนื้อไม้: ใช้สร้างบ้าน   |        |         |              |       | √      |
| <b>99. วงศ์ Sterculiaceae</b>                    |          |                |                     |   |  |        |         |              |       |        |
| <i>Sterculia balanghas</i> L.                    | 1.0<br>0 | ปอ<br>ขนุน     | เซะ<br>ปือ คอ<br>สะ |  | เมล็ด: นำมาอย่างไรให้สุก รับประทานเล่น   | √      |         |              |       |        |



| ชื่อวิทยาศาสตร์  | UV       | ชื่อทั่วไป             | ชื่อท้องถิ่น     | รูปภาพ  | ส่วนที่ใช้: การใช้ประโยชน์  | ประเภท |         |          |       |       |
|--|----------|------------------------|------------------|---|---|--------|---------|----------|-------|-------|
|  |          |                        |                  |   |   | อาหาร  | สมุนไพร | เศรษฐกิจ | วัสดุ | อื่นๆ |
| <b>100. วงศ์ Styracaceae</b>                               |          |                        |                  |   |   |        |         |          |       |       |
| <i>Styrax benzoides</i> Craib                              | 1.0<br>0 |                        | เซะ<br>พอ บอ     |    | เนื้อไม้: ใช้สร้างบ้าน  |        |         |          | ✓     |       |
| <b>101. วงศ์ Theaceae</b>                                  |          |                        |                  |   |   |        |         |          |       |       |
| <i>Annestea fragans</i> Wall.                              | 1.0<br>0 | สารภี<br>ป่า           | เซะ<br>ตอ<br>เบะ |    | ลำต้น: ทำฟืน  |        |         |          |       | ✓     |
| <i>Camellia</i> sp.  | 1.0<br>0 |                        | นี่ เต้ายะ       |    | ใบ: นำมาหมักทำเป็นเมี่ยง<br>ผลสุก: รับประทานเป็นผลไม้   | ✓      |         |          |       | ✓     |
| <b>102. วงศ์ Theaceae</b>                                  |          |                        |                  |   |   |        |         |          |       |       |
| <i>Eurya acuminata</i> DC. var.<br><i>wallichiana</i> Dyer | 1.0<br>0 | ไคร้<br>มด             | เซะ โท<br>ลุย    |   | เนื้อไม้: ใช้สร้างบ้าน  |        |         |          | ✓     |       |
| <i>Schima wallichii</i> (DC.) Korth.                       | 1.0<br>0 | ทะโล้                  | ตยะ ฮือ<br>สะ    |  | เนื้อไม้: ใช้สร้างบ้าน ทำครกตำข้าว  |        |         |          | ✓     |       |
| <b>103. วงศ์ Ulmaceae</b>                                  |          |                        |                  |   |   |        |         |          |       |       |
| <i>Celtis</i> sp.  | 1.1<br>4 | แก้งซี่<br>พระ<br>ร่วง | เซ นา<br>ฮือ     |  | ใบ: แขน้ำดื่ม รักษาอาการหายใจขัด แน่นหน้าอก<br>เปลือก: แขน้ำให้เด็กดื่ม หรือใช้ลำต้นรมไฟ ให้เด็ก<br>สูดควันแก้หวัด หวี: ดิบใช้ทาน รักษาอาการตัวร้อน | ✓      |         |          |       |       |
| <b>104. วงศ์ Urticaceae</b>                                |          |                        |                  |   |   |        |         |          |       |       |
| <i>Dendrocide</i> sp.                                      | 1.2<br>5 |                        | หล่า<br>ซา       |  | ใบ: ต้มให้หมูกิน เป็นยาถ่ายพยาธิ<br>ราก: ต้มน้ำดื่มแก้ไข้ และเป็นส่วนผสมของยาต้ม<br>รักษาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย                                   | ✓      | ✓       |          |       |       |
| <b>105. วงศ์ Usneaceae</b>                                 |          |                        |                  |   |   |        |         |          |       |       |
| <i>Everniastrum</i> sp.                                    | 1.0<br>0 |                        | หมื่อ<br>คะ วา   |  | ทั้งต้น: ต้มน้ำดื่ม แก้หอบหืด หรือสูบ<br>สูบแก้ปวดหัว เป็นหวัด  | ✓      |         |          |       |       |


| ชื่อวิทยาศาสตร์                                 | UV       | ชื่อทั่วไป   | ชื่อท้องถิ่น | รูปภาพ  | ส่วนที่ใช้: การใช้ประโยชน์  | ประเภท |         |              |       |       |
|---|----------|--------------|--------------|---|---|--------|---------|--------------|-------|-------|
|   |          |              |              |   |   | อาหาร  | สมุนไพร | เครื่องสำอาง | วัสดุ | อื่นๆ |
| <b>106. วงศ์ Vitaceae</b>                       |          |              |              |   |   |        |         |              |       |       |
| <i>Cissus javana</i> DC.                        | 1.0<br>0 | ดาตตะกั่วป่า | ลี โม่ระมุย  |    | ใบ: ทูบแล้วพอกบริเวณที่ฟกช้ำ ห้อเลือด   |        | √       |              |       |       |
| <b>107. วงศ์ Vitaceae</b>                       |          |              |              |   |   |        |         |              |       |       |
| <i>Alpinia galanga</i> (L.) Willd.              | 1.5<br>7 | ข่า          | เซะ เอเคล    |    | ดอก: และผลสด รับประทานเป็นผักเคียงน้ำพริก<br>หัว: เป็นเครื่องเทศ ให้กลิ่นหอมในอาหาร และใช้เป็นส่วนผสมของหัวเชื้อเหล้า   | √      |         |              |       |       |
| <i>Alpinia malaccensis</i> (Burm.) Roscoe       | 1.5<br>7 |              | โป้ว คี      |    | ดอก: และหน่ออ่อน ลวกเป็นเคียงน้ำพริก<br>หัว: ต้มน้ำดื่ม เป็นยาแก้ไข้ และหวัด รับประทานสด รักษาอาการท้องอืด ใช้เป็นเครื่องเทศ ให้กลิ่นหอมในอาหาร เป็นส่วนผสมของหัวเชื้อเหล้า | √      | √       |              |       |       |
| <b>108. วงศ์ Zingiberaceae</b>                  |          |              |              |   |   |        |         |              |       |       |
| <i>Curcuma angustifolia</i> Roxb.               | 1.0<br>0 |              | โป๊ะพอ       |  | ช่อดอก: ใช้ประกอบอาหาร  | √      |         |              |       |       |
| <i>Curcuma</i> sp.                              | 2.0<br>0 |              | ติ ยอ        |  | ดอก และยอดอ่อน: ต้มรับประทานเป็นผักเคียงน้ำพริก<br>ลำต้นใต้ดินสด: ใช้ทาตัว แก้ตัวร้อน ทารักษาแมลงสัตว์กัดต่อย และ รับประทานแก้ท้องอืด                                       | √      |         | √            |       |       |
| <i>Hedycium</i> sp.                             | 1.0<br>0 |              | ป้อเคอะเต๊ะ  |  | ดอก: ลวกให้สุก รับประทานเป็นผักเคียงน้ำพริก   | √      |         |              |       |       |
| <b>109. วงศ์ Zingiberaceae</b>                  |          |              |              |   |   |        |         |              |       |       |
| <i>Zingiber cf. citriodorum</i> Theilade & Mood | 1.0<br>0 | ขิงเต่า      | โป ต๊ะเอ     |  | หัว และดอก: รับประทานสดกับน้ำพริก หรือแกง   | √      |         |              |       |       |


| ที่ | ชื่อ-สกุล |                           | ที่อยู่ | อายุ (ปี)                          | สมาชิกในครัวเรือน |      |     | พื้นที่ปลูกกาแฟ |     | อายุต้นกาแฟ (ปี) | ประมาณการผลิตปี 56/57 (กิโลกรัม) |       |
|-----|-----------|---------------------------|---------|------------------------------------|-------------------|------|-----|-----------------|-----|------------------|----------------------------------|-------|
|     |           |                           |         |                                    | ชาย               | หญิง | รวม | ไร่             | ตัน |                  |                                  |       |
| 1   | นาย       | ดาโพ เอกเอราวัฒน์         | 3       | ม.6 ต.แม่ตั้น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ | 34                | 1    | 5   | 6               | 3   | 1,000            | 2                                | 10    |
| 2   | น.ส.      | โฉมใจ ด้านภัยพาล          | 6       | ม.6 ต.แม่ตั้น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ | 35                |      | 1   | 1               | 1   | 350              | 1                                | 0     |
| 3   | น.ส.      | หน่อคา ชะรอย              | 11      | ม.6 ต.แม่ตั้น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ | 19                | 5    | 4   | 9               | 3   | 1,000            | 3                                | 250   |
| 4   | นาง       | ค้อยแบ ชะรอย              | 11      | ม.6 ต.แม่ตั้น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ | 38                | 3    | 2   | 5               | 1   | 350              | 3                                | 50    |
| 5   | ด.ช.      | ดีจ้อ ชะรอย               | 11      | ม.6 ต.แม่ตั้น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ | 13                | 3    | 2   | 5               | 2   | 800              | 2                                | 20    |
| 6   | นาย       | พลเชอร์ จิชี              | 17      | ม.6 ต.แม่ตั้น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ | 43                | 3    | 3   | 6               | 2   | 750              | 3                                | 30    |
| 7   | นาย       | พาดะ รีพอ                 | 24      | ม.6 ต.แม่ตั้น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ | 20                | 2    | 1   | 3               | 1   | 350              | 3                                | 50    |
| 8   | นาย       | ดีโหลโคะ รีพอ             | 30      | ม.6 ต.แม่ตั้น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ | 48                | 3    | 3   | 6               | 2   | 750              | 1                                | 0     |
| 9   | น.ส.      | เนาะซู รีพอ               | 30      | ม.6 ต.แม่ตั้น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ | 26                | 1    | 3   | 4               | 2   | 700              | 4                                | 80    |
| 10  | นาย       | วาที่ นวักสุนทร           | 39      | ม.6 ต.แม่ตั้น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ | 56                | 4    | 3   | 7               | 4   | 1,700            | 3                                | 100   |
| 11  | นาย       | ดีเข้ม มะพอ               | 41      | ม.6 ต.แม่ตั้น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ | 69                | 1    | 2   | 3               | 3   | 1,200            | 5                                | 300   |
| 12  | นาย       | พะเซ่ง เก่งไผ่ไล่         | 46      | ม.6 ต.แม่ตั้น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ | 19                | 6    | 2   | 8               | 3   | 1,500            | 3                                | 100   |
| 13  | น.ส.      | น้อเหลอะ เอกเอราวัฒน์     | 47      | ม.6 ต.แม่ตั้น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ | 18                | 0    | 1   | 1               | 2   | 700              | 2                                | 50    |
| 14  | นาย       | ตาเลอะ วาโพ               | 48      | ม.6 ต.แม่ตั้น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ | 33                | 4    | 2   | 6               | 2   | 750              | 3                                | 50    |
| 15  | นาง       | แสตี้ มะพอ                | 53      | ม.6 ต.แม่ตั้น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ | 45                | 1    | 3   | 4               | 3   | 1,500            | 2                                | 30    |
| 16  | นาย       | พาแบะ ดอนสกุลไพรขจี       | 70      | ม.6 ต.แม่ตั้น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ | 31                | 2    | 4   | 6               | 2   | 800              | 2                                | 20    |
| 17  | น.ส.      | หน่อแจ๊ะ เอกเอราวัฒน์     | 75      | ม.6 ต.แม่ตั้น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ | 24                | 3    | 2   | 5               | 4   | 1,200            | 1                                | 0     |
| 18  | นาย       | จะกา นวักสุนทร            | 99      | ม.6 ต.แม่ตั้น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ | 17                | 4    | 3   | 7               | 5   | 2,000            | 2                                | 30    |
| 19  | นาย       | เรว้า มะเซอพะ             | 103     | ม.6 ต.แม่ตั้น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ | 41                | 2    | 3   | 5               | 5   | 2,000            | 4                                | 500   |
| 20  | นาย       | พะพูเว พะเลนอย            | 115     | ม.6 ต.แม่ตั้น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ | 32                | 3    | 3   | 6               | 2   | 800              | 1                                | 0     |
| 21  | นาย       | ค้อจา น้อเซเจ             | 124     | ม.6 ต.แม่ตั้น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ | 38                | 3    | 3   | 6               | 1   | 400              | 5                                | 500   |
| 22  | นาย       | แบละคู รีพอ               | 141     | ม.6 ต.แม่ตั้น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ | 25                | 2    | 2   | 4               | 2   | 650              | 1                                | 0     |
| 23  | น.ส.      | พัตชา โคะเจ               | 141     | ม.6 ต.แม่ตั้น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ | 24                | 3    | 2   | 5               | 2   | 800              | 1                                | 0     |
| 24  | น.ส.      | มีปรีดี บูจ้อ             | 156     | ม.6 ต.แม่ตั้น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ | 29                | 3    | 2   | 5               | 1   | 300              | 2                                | 10    |
| 25  | นาย       | ตู่เซ วัฒนโรจน์           | 163     | ม.6 ต.แม่ตั้น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ | 35                | 3    | 3   | 6               | 3   | 1,200            | 2                                | 50    |
| 26  | น.ส.      | น้อแบล๊ะ เอกเอราวัฒน์     | 163     | ม.6 ต.แม่ตั้น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ | 28                | 2    | 3   | 5               | 2   | 90               | 1                                | 0     |
| 27  | นาย       | จอดู ดอนกุลไพรขจี         | 165     | ม.6 ต.แม่ตั้น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ | 31                | 3    | 3   | 6               | 6   | 3,000            | 4                                | 450   |
| 28  | นาย       | กุหวาว สายชลสวรรค์        | 174     | ม.6 ต.แม่ตั้น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ | 27                | 2    | 3   | 5               | 2   | 800              | 1                                | 0     |
| 29  | นาย       | สมศักดิ์ ด้านภัยพาล       | 196     | ม.6 ต.แม่ตั้น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ | 24                | 2    | 1   | 3               | 3   | 1,600            | 3                                | 300   |
| 30  | นาย       | สุดี รีพอ                 | 202     | ม.6 ต.แม่ตั้น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ | 28                | 2    | 2   | 4               | 1   | 350              | 1                                | 0     |
| 31  | นาง       | หน่อเซ รีพอ               | 204     | ม.6 ต.แม่ตั้น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ | 34                | 3    | 3   | 6               | 2   | 800              | 1                                | 0     |
| 32  | นาย       | พาด้า โคะเจ               | 206     | ม.6 ต.แม่ตั้น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ | 37                | 4    | 2   | 6               | 2   | 800              | 1                                | 0     |
| 33  | นาย       | พาแบล๊ะ ไพรงานแก้ว        | 257     | ม.6 ต.แม่ตั้น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ | 24                | 4    | 2   | 6               | 3   | 1,200            | 3                                | 100   |
| 34  | นาย       | เปื้อะเลื้อะ เอกเอราวัฒน์ | 327     | ม.6 ต.แม่ตั้น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ | 32                | 1    | 5   | 6               | 2   | 1,000            | 2                                | 0     |
| 35  | นาย       | สาธิต เด่นเดือน           | 2/1     | ม.6 ต.แม่ตั้น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ | 25                | 3    | 2   | 5               | 2   | 800              | 3                                | 30    |
| 36  | น.ส.      | มีลาทุ มะฮี่              | 2/1     | ม.6 ต.แม่ตั้น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ | 42                | 3    | 4   | 7               | 3   | 1,000            | 3                                | 50    |
| 37  | น.ส.      | อุสม มะพอ                 | 21/2    | ม.6 ต.แม่ตั้น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ | 22                | 3    | 3   | 6               | 5   | 2,000            | 1                                | 0     |
| 38  | นาย       | ปู่อ ดอนสกุลไพรขจี        | 21/2    | ม.6 ต.แม่ตั้น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ | 34                | 3    | 3   | 6               | 1   | 250              | 2                                | 10    |
| 39  | นาย       | ศักดิ์รินทร์ มะเซอพะ      | 103/2   | ม.6 ต.แม่ตั้น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ | 36                | 3    | 2   | 5               | 2   | 650              | 3                                | 400   |
| 40  | น.ส.      | จิตรา โคะเจ               | 53/2    | ม.6 ต.แม่ตั้น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ | 40                | 2    | 6   | 8               | 3   | 1,200            | 1                                | 300   |
| รวม |           |                           |         |                                    |                   | 105  | 108 | 213             | 100 | 39,090           |                                  | 3,870 |

| ที่ | ชื่อ-สกุล               | ที่อยู่                                 | อายุ | สมาชิกในครัวเรือน |      |     | พื้นที่ปลูก |       | อายุต้นกาแฟ (ปี) | ประมาณการผลผลิตปี 56/57 (ก.ก.) |     |
|-----|-------------------------|---|------|-------------------|------|-----|-------------|-------|------------------|--------------------------------|-----|
|     |                         |   |      | ชาย               | หญิง | รวม | ไร่         | ตัน   |                  |                                |     |
| 1   | นาย คีอเกล้า มะเซอพะ    | 9 ม.6 ต.แม่ตั้น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่    | 39   | 3                 | 3    | 6   | 5           | 2,000 | 3                | 200                            |     |
| 2   | นาย ชูยแล มะพอ          | 12 ม.6 ต.แม่ตั้น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่   | 52   | 4                 | 2    | 6   | 2           | 600   | 3                | 20                             |     |
| 3   | นาย พะตะดา มะเซอพะ      | 13 ม.6 ต.แม่ตั้น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่   | 49   | 3                 | 2    | 5   | 2           | 750   | 3                | 20                             |     |
| 4   | นาย มอเซ มะพอ           | 15 ม.6 ต.แม่ตั้น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่   | 61   | 2                 | 3    | 5   | 2           | 800   | 2                | 30                             |     |
| 5   | นาย วาโน นุดา           | 20 ม.6 ต.แม่ตั้น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่   | 35   | 3                 | 2    | 5   | 2           | 800   | 1                | 0                              |     |
| 6   | นาง วาแบ้ พอน่อ         | 26 ม.6 ต.แม่ตั้น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่   | 43   | 3                 | 3    | 6   | 3           | 1,200 | 2                | 30                             |     |
| 7   | นาย จอเซ จิซี           | 32 ม.6 ต.แม่ตั้น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่   | 33   | 3                 | 3    | 6   | 4           | 1,500 | 3                | 100                            |     |
| 8   | น.ส. เกศรา มะเซอพะ      | 32 ม.6 ต.แม่ตั้น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่   | 21   | 3                 | 3    | 6   | 1           | 400   | 1                | 0                              |     |
| 9   | นาย หนุจอ โคะเจ         | 49 ม.6 ต.แม่ตั้น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่   | 48   | 3                 | 4    | 7   | 3           | 1,000 | 2                | 30                             |     |
| 10  | นาย พงษ์ศักดิ์ มะเซอร์  | 49 ม.6 ต.แม่ตั้น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่   | 70   | 4                 | 4    | 8   | 2           | 500   | 3                | 20                             |     |
| 11  | นาย ต่าดี มะเซอร์       | 59 ม.6 ต.แม่ตั้น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่   | 47   | 3                 | 2    | 5   | 1           | 350   | 3                | 10                             |     |
| 12  | นาย ป่อวา อุดทสิงคาร    | 86 ม.6 ต.แม่ตั้น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่   | 41   | 2                 | 2    | 4   | 3           | 1,000 | 2                | 30                             |     |
| 13  | น.ส. มีคา มะเซอพะ       | 103 ม.6 ต.แม่ตั้น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่  | 23   | 3                 | 2    | 5   | 2           | 650   | 1                | 0                              |     |
| 14  | นาง มีคา มะเซอพะ        | 104 ม.6 ต.แม่ตั้น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่  | 35   | 3                 | 2    | 5   | 2           | 800   | 2                | 20                             |     |
| 15  | นาย ดีว่า มะฮี          | 115 ม.6 ต.แม่ตั้น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่  | 62   | 2                 | 1    | 3   | 1           | 350   | 2                | 10                             |     |
| 16  | นาย เลอวา ท่ออี         | 117 ม.6 ต.แม่ตั้น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่  | 48   | 3                 | 1    | 4   | 2           | 800   | 3                | 100                            |     |
| 17  | นาย ปูเซ ท่ออี          | 117 ม.6 ต.แม่ตั้น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่  | 17   | 2                 | 2    | 4   | 2           | 700   | 2                | 10                             |     |
| 18  | นาย ดีจือ วาโพ          | 123 ม.6 ต.แม่ตั้น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่  | 35   | 2                 | 3    | 5   | 1           | 350   | 2                | 10                             |     |
| 19  | นาย เขยบ่อ เบระพะ       | 153 ม.6 ต.แม่ตั้น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่  | 42   | 2                 | 3    | 5   | 3           | 1,100 | 2                | 30                             |     |
| 20  | นาย สรายุทธ เบระพะ      | 153 ม.6 ต.แม่ตั้น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่  | 38   | 2                 | 3    | 5   | 1           | 350   | 1                | 0                              |     |
| 21  | นาย ชัยยา ริพอ          | 200 ม.6 ต.แม่ตั้น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่  | 26   | 3                 | 3    | 6   | 3           | 1,000 | 3                | 20                             |     |
| 22  | นาง หนานล่าดี โคะเจ     | 213 ม.6 ต.แม่ตั้น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่  | 32   | 3                 | 2    | 5   | 2           | 800   | 2                | 20                             |     |
| 23  | นาย สมชาติ มะเซอพะ      | 224 ม.6 ต.แม่ตั้น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่  | 22   | 1                 | 1    | 2   | 1           | 350   | 1                | 0                              |     |
| 24  | น.ส. เจ้ที วิเวกไพรรพนา | 364 ม.6 ต.แม่ตั้น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่  | 24   | 2                 | 2    | 4   | 2           | 750   | 1                | 0                              |     |
| 25  | นาย แดง จิซี            | 17/1 ม.6 ต.แม่ตั้น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ | 58   | 3                 | 4    | 7   | 4           | 2,000 | 2                | 50                             |     |
| 26  | นาย ดีโพเจ มะเซอพะ      | 14/2 ม.6 ต.แม่ตั้น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ | 49   | 3                 | 2    | 5   | 3           | 1,000 | 3                | 80                             |     |
| 27  | นาย เซง่า โพซี          | 18/5 ม.6 ต.แม่ตั้น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ | 49   | 1                 | 1    | 2   | 1           | 500   | 1                | 0                              |     |
| 28  | นาย สมชาย พอน่อ         | 89/1 ม.6 ต.แม่ตั้น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ | 35   | 2                 | 2    | 4   | 2           | 650   | 3                | 50                             |     |
| 29  | น.ส. มีโชติ นุดา        | 89/1 ม.6 ต.แม่ตั้น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ | 21   | 2                 | 3    | 5   | 1           | 350   | 1                | 0                              |     |
| รวม |                         |   |      |                   | 75   | 70  | 145         | 63    | 23,400           |                                | 890 |

ภาคผนวกที่ 3




แบบแปลนโรงแปรรูปกาแฟระดับชุมชนห้วยอมบ้านปิพอ






โครงการ : การก่อสร้างโรงสี หนัก ลานตาก และโรงจัดเก็บเมล็ดกาแฟอาราบิก้าระดับชุมชน  
 สถานที่ : โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืนขุนตืดน้อย

โครงการ : การก่อสร้างโรงสี หัก ลานตาก และโรงจัดเก็บเมล็ดกาแฟอาราบิก้าระดับชุมชน  
 สถานที่ : โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืนบนดินน้อย




แบบแปลน  
 แคร่ ดาดฟ้าเฟรมในโรงตากกาแฟไม้อัดไม้ขนาด กว้าง 1 นิ้ว ยาว 1.5 เมตร  
 ห่างกัน 1 นิ้ว เป็นแถวยาว 25.00 เมตร



ไม้ไฟผ่าซีกยึดติดด้วยตะปู

โครงการ : การก่อสร้างโรงสี หมัก ลานตาก และโรงจัดเก็บเมล็ดกาแฟอาราบิก้าระดับชุมชน  
 สถานที่ : โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืนขุนดินน้อย

โครงการ : การก่อสร้างโรงสี หมัก ลานตาก และโรงจัดเก็บเมล็ดกาแฟอาราบิก้าระดับชุมชน  
 สถานที่ : โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืนขุนดินน้อย





ประมวลภาพ การศึกษาการวิจัยและส่งเสริมงานกาแฟ  
 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงเชียงราย สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1.  
 กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อ.แม่สรวย จังหวัดเชียงราย  
 ในวันที่ 4 กันยายน 2557



นายประสงค์ มั่นสลุง  
 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงเชียงราย  
 กล่าวต้อนรับและเป็นวิทยากรบรรยาย



นายพัฒนา มงคลวาท เจ้าหน้าที่ หัวหน้าศูนย์ โครงการขยายผล  
 โครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืนบ้านขุนต้นน้อย  
 มอบของที่ระลึกแก่ นายประสงค์ มั่นสลุง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยฯ



นายเสงี่ยม ไผ่ล้อม นักวิชาการเกษตร  
 บรรยายความรู้เรื่องงานวิจัยราสนิมในแปลงกาแฟ



นายเสงี่ยม ไผ่ล้อม นักวิชาการเกษตร  
 บรรยายความรู้เรื่องงานวิจัยกาแฟในศูนย์



กับดักไฟโรโมนล่อแมลงในแปลงกาแฟ



การวิจัยปลูกกาแฟภายใต้ร่มเงากับไม้ผลชนิดต่างๆ

ประมวลภาพ การศึกษาการดำเนินงานส่งเสริมกาแฟของ  
 โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ บ้านปางขอนและ  
 ศึกษากระบวนการจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปางขอน ในระดับแปลงและในระดับโรงงาน  
 บ้านปางขอน ต.ห้วยชมพู อ.เมือง จ.เชียงราย  
 ในวันที่ 5 กันยายน 2557



นายเสรี ศรีธิเลิศ : ผู้อำนวยการโครงการฯ บรรยายการดำเนินงานของศูนย์ฯ



การศึกษากระบวนการจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปางขอน ในระดับแปลง



การศึกษากระบวนการจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปางขอน (ในระดับโรงงาน)



การศึกษากระบวนการจัดการกลุ่มของเยาวชนโรงเรียนปางขอน